

## Werk

**Titel:** Herbarium Amboinense, plurimas conpleteens arbores, frutices, herbas, plantas ter...

**Jahr:** 1741

**Kollektion:** Zoologica

**Werk Id:** PPN369546628

**PURL:** [http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369546628|LOG\\_0041](http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369546628|LOG_0041)

**OPAC:** <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369546628>

## Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

## Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen  
Georg-August-Universität Göttingen  
Platz der Göttinger Sieben 1  
37073 Göttingen  
Germany  
Email: [gdz@sub.uni-goettingen.de](mailto:gdz@sub.uni-goettingen.de)

## EXPLICATIO

### Tabule Decima Quarta.

Quæ exhibet LAURUM fructu monstroso & spongioso, cortice aromatico Caryophyllo; CULITLAWAN a Rumphio dictam.

A. Fructum denotat spongiosum ac tumidum.

## OBSERVATIO.

Arbor hæc proxime convenit cum *Cinnamomo*, *Lauro*, & similibus, sed fructu abortivo & fungoso ab iis differt, flores cæterum, foliatura, immo & tota forma ipsi simillima est. Unde & L A U R U M fructu abortivo, cortice Caryophyllo hanc vocavi.

Hic porro cortex descriptus occurrit in *Valent. Indiæ litteræ Epist. XXIV. p. 450. & seq.* ut & in *Ephem. Germ. Acad. nat. curios dec. 2. ann. 3. pag. 53.* ubi & ejus delineatio, & sub nomine *Coelit-lawan-arboris* describitur, in *Valent. Amboinæ Descript. pag. 210. No. XXXII.*

In *Valent. bistor. simpl. reform. p. 172.* interrogatur, an hic cortex idem sit, eademque ex arbore collectus, ex qua *CASSIA CARYOPHYLLATA*, ubi dubitat auctor, quum prior multo sit crassior cortice *Cassia Caryophyllata* quod & ego in medio relinquo, quum *Rumphius* hujus nullam faciat mentionem. Cæterum *Cassia Caryophyllata* synonyma & descriptio, ejusque virtutes occurrit in *S. Dale Pharm. in 4to. pag. 323.* ut in *Cl. Paul. Herman. mater. med. part. I. Cap. 2. &c.*

## CAPUT VIGESIMUM TERTIUM.

### Sindoc.

**I**N Borneo & Java aliud occurrit cortex Sindoc vocatus, quem vulgus cum Culitlawan confundit: Sed puto diversum esse corticem ex diversa arbore, licet arboris formam nemo mihi indicare potuerit. Atque hic cortex maxime a Culitlawan differt; est enim solidior, durior, & magis fuscus, externe glaber, & quasi rasputus. Sapor primo quidem accedit ad Culitlawan, sed dein amarities subsequitur cum adstrictione, quæ tanta in Culitlawan non occurrit, nec in Sindoc detegitur mucosum illud, quod in Culitlawan latet.

**Nomen.** Nullo alio hactenus nomine nisi Sindoc innotuit.

**Locus.** Crescit in Borneo, circa Succadanam, & in Sumatra circa Palimbang.

**Usus.** Usurpatur contra vermes abdominis, item ad ictus & morbus venenatorum animalium, prius autem vulnera sunt irritanda & pungenda duris Tamaryni filis, ut ater exstillet sanguis, ac dein contritus Sindoc his inponendus est, porro tam interne quam externe usurpatur instar Culit-lawan.

## OBSERVATIO.

**SINDOC** a *Valent.* in *Amboinæ descript. p. 217.* quoque commemoratur & describitur.

## UYTLEGGINGE

### Van de veertiende Plaat,

Dewelke vertoont een LAUWRIER-BOOM met een monstrosa en spongiosa vrucht met een speceryachtige en kruidnagelachtige baft; CULITLAWAN van Rumphius genaamt. A. Toont aan de opgezwollen spongiosa vrucht.

## AANMERKINGE.

Deze boom komt het naast aan de *Caneelen Laurier-boom*, en diergelyke, doch verschilt daar van door het misgewas van de swellende vrucht, anderzins zyn de bloemen, bladen, en ook de gansche gedaante aan de voornoemde zeer gelyk, waarom ik ze ook genaamt heb *Laurus* of *Laurier* met een miswassende en swellende vrucht, en met een Nagel-en Speceryachtige schorffie.

Deze schorffie wort verder beschreven in *Valent. Ind. Litterat. XXIV. Brief. p. 50.* en de volgende, als mede in de *Ephem. Germ. Acad. natur. curios. dec. 2. ann. 3. pag. 53.* en onder den naam van *Cœlit-lawan-boom*. by *Valent.* in de beschryving van *Amboina p. 210. No. XXXVII.*

In *Valent. bistor. simpl. reform. pag. 172.* wert gevraagt, of deze baft dezelfde is, en uit een en dezelfde boom vergadert wert, waar van de *CASSIA CARYOPHYLLATA* komt, waar aan de Schryver twyfelt, om dat de Culitlawan dikker is dan die van de *Cassia Caryophyllata*, het geen ik onbeslist laate, wyl *Rumphius* hier van niets melt. Verders zyn de benamin-gen, Schryvers, en de kragten van de *Cassia Caryophyllata* vinden by *Sam. Dale* in zyn *Pharmac.* in *4to pag. 323.* als mede in de *Mater. Medic.* van de vermaarde *Paul. Herman.* eerste deel, *Capittel 2. &c.*

## XXIII. HOOFTSTUK.

### Sindoc.

**O**P Borneo, en Java, valt nog een ander baft, Sindoc genaamt, die de gemeene man met Culitlawan confundeert: Maar ik oordeele dat het een verscheide baft, en van een byzonderen boom is, boewel my de gedaante des booms tot nog toe niemand heeft kunnen beduiden: En zekerlyk deze baft verschilt ook merkelyk van de Culitlawan; Want by is dichter, bruinder, en vaster, van buiten effen, en als geschaft. De smaak trekt in 't eerst wel klaarlyk na Culitlawan, maar men wert daar op straks een bitterbeit gewaar, met een adstrictie, dewelke zo groot in geen Culitlawan gevonden wert, en in de Sindoc vint men ook de flymerigheit niet, die in de Culit-lawan is.

**Naam.** Hy is tot nog toe met geen ander naam, dan Sindoc bekend.

**Plaats.** Hy valt op Borneo, omtrent Succadana, en op Sumatra, omtrent Palimbang.

**Gebruik.** Hy wert gebruikt tegens de wormen des buiks, als mede tegens de steken, en beeten van venynige gediertens, doch men moet de wonden eerst stoken of prikkelen, met de barde draaden van Tameryn, op dat bet swarte bloet daar uitloope, en dan de gevreeven Sindoc daar op leggen: voor het overige by wert meest zo inwendig als uitwendig gebruikt, als de Culit-lawan.

## AANMERKINGE.

De Sindoc wert by *Valent.* in de *Beschryving van Amboina p. 217.* vermeld en beschreven.