

Werk

Titel: Herbarium Amboinense, plurimas conpleteens arbores, frutices, herbas, plantas ter...

Jahr: 1743

Kollektion: Zoologica

Werk Id: PPN369546733

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369546733|LOG_0035

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369546733>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

cum nostra convenit, excepto quod arboris folia rugosa sint instar pellis Lamii pisces, quod in isto horto non notatur; fructus itidem nostra arboris alio crescent modo, uti in textu videre est; quam ingentes autem haec arbores sint, ex hoc relatu Lector percipere potest, princeps enim Colicolanæ Nobilissimo Dno. Rheedio narravit, sese ex unica tali arbore totum fabricasse gentile templum: Silvestris vero circinnata albaque Thekæ species in isto horto memorata mihi ignota est.

beschryvinge met de onze overeenkomst, behalven dat de bladeren aan 't onze zo ruig zyn als een Hayevel, 't welk men in gemelde Hortus niet leeft; ook groeien de vruchten aan de onze op een andere manier, gelyk in den text te zien is. Anders boe groote boomen dit worden, kan den Lezer daar uit afnemen, dat een Prins van Colicolan aan den Ed. Heer Hendrik van Reede verbaalt heeft, dat by uit eenen boom een geheelen Heydenze Tempel gemaakt heeft. De wilde gekrulde en witte zoorte van Theka in gemelden Hortus aangebaalt, zyn my onbekent.

Tabula Decima Octava

Ramum exhibet Jati floribus fructibusque onustæ.

OBSERVATIO.

In Valent. Amb. descript. pag. 219. describitur, ut & in Hort. Malab. part. IV. ubi vide notas, & Bontium lib 6. cap. 16. Hanc arborem Pluknet. in Almag. p. 362. Terebintho indicæ adsimulat, ut id patet ex ejus Mantiff. p. 178.

CAPUT DECIMUM QUARTUM.

Samama.

Hec cum precedente Dawan altissima est inter Amboinæ arbores silvestres, ejusque truncum vix bini tres viri complecti possunt, qui rectus est, ac prope radices parum vel non alatus, haec autem terram mox ac profunde penetrant. Cortex vero est scaber, crassus, ex nigro viridis seu fumeus, externe profunde laciniatus, interne crassis constans fibris, latus, ac ruber, saporis adstringentis, rami sese late extendunt, in paucos & rectos laterales divisæ ramos, quibus etiam folia rara insident, ita ut extensam admodum, sed apertam & tenuem, gerat haec arbor comam.

Folia post illa Jati maxima sunt, quæ in ipsis observantur arboribus silvestribus, cumque illis Jati maxime convenient, ita ut Samama spuria ejus species haberi posset, si fructus non contrarium indicaret, in ramorum summo folia haec locata sunt, ubi quinquagona quodammodo, mollia, herbacea, & lanuginosa observantur bina sibi opposita, quatuor simul obliquam efformant crucem, vix autem ultra triavel quatuor paria in uno observantur ramo, forma flabelli, binos pedes longa, sesqui-spithamam lata, vetusta vero pedem longa, tresque palmas lata sunt, in inferiore parte haec sensim usque ad ramum angustantur, ita ut nullum gerant pedunculum nisi nervum medium magnum, qui digitum crassus est, costæ vero laterales plerumque parallelæ sunt, superius rubrae, uti & nervus medius, inferius vero viridis coloris, ad ortum vero majorum foliorum bina foliola lateralia excrescunt mollia ac plerumque viridibus ramis adcumbentia, ad ramorum vero summum capitulum excrescit viride pentagonum, quod sensim in folia explicatur.

Cum haec quoque arbor in marem ac feminam dividatur, ejus discrimen ex colore venarum ac foliis dignoscitur, qui in mare ruber, in femina albus est. Haec etiam arbor, uti Jati, nulos producit fructus floresque nisi adulta sit. Flores ejus huc usque ignoti sunt, diciturque irregularis esse formæ, fructus vero mox ex vesicula excrescere, qui sub arbore decidui inveniuntur: Fructus itaque sine floribus progermant, solitarii semper crassi ac digitum longo petiolo insidentes in ramulorum extremo, qui capitula sunt sphærica, primo magnitudine Limonis Nipis, sensim vero excrescunt ad magnitudinem Limonis Itam, formata ex meris prismatis, quæ instar setorum Echini convoluti internum ambiunt nucleus adeo conjuncta, ut unum constituere videantur corpus. Prismata haec exteriore sua parte crassissima sunt, interne sensim angustata, suntque mollia, herbacea, ac facile decidentia, si digitis fricentur.

De achtende Plaat

Vertoont een Tak van het Kiatenkout, met zyn bloemen en vruchten.

AANMERKING.

In de beschryving van Valent. op pag 219. wert ze mede ter loops beschreven, en in het vierde Deel van de Hortus Malab. alwaar verders de aanmerkingen ziet, en Bonitum in 't zesde Boek Kapitt. 16. Deze Boom brengt Pluknet tot de Indische Tarpentynboom in zyn Almag. p. 362. voorgestelt, zo als zulks blykt uit zyn Mantiff. op pag 178.


XIV. HOOFDSTUK.

Samama-Boom.

Dit is met de voorgaande Dawan de hoogste woutboom in Amboina, den zeiven in akte nog overtreffende, vermits zynen stam wel 2. of 3. mannen moeten omvademen, regt over eynd, met geene of weinige vlerken aan de wortel, die regt en diep in de aarde gaan. De schorsse is grof, dik, swart-groen, of rookagtig, van buiten diep gefleurt, van binnen grofdraadig, taay, en rood, 't zamentrekken van smaak, de takken breiden haer verre uit, dog maar in weinige en regte zyde-takken, daar aan ook weinige bladeren staan, zo dat by wel een breede, maar ydele kruyn heeft.

De bladeren zyn na die van Jati de grootste, die men aan eenige woutbomen ziet, en hebben met de Jati groote gelykenisse, zo dat men de Samama voor een baftaartflag daar van houden zoude, zo de vrucht niet anders getuigde, zy staan ook meest aan 't eynde, daar dezelve wat vyfkantig, week, kruydachtig, en wolachtig zyn, 2. en 2. tegens malkanderen, en maaken een schuyns kruis, niet boven 3. a 4. paren aan een tak, in de gedaante van een wayer, 2. voeten lang, anderhalve span breed, aan de oude een voet lang, en drie handen breed, na agteren allenskens toefmallende, tot tegens den tak aan, zo dat men geen anderore steel daar aan ziet, dan de grote middel-zenuwe, die wel een vinger dik is, de dwers ribben lopen met parallel, boven rood, gelyk ook de middel-zenuwe, en onder groen, ter zyden by den oorspronck van deze groote staan 2. andere kleendere blaadjes, slap, en gemeenlyk tegens de groene takken aanleggende, en voor aan 't eynde der takken staat een vyfhoekige groene knop of kolve, dewelke zig metter tyt in bladeren openet.

Dewyl deze boom mede in manneken en wyfken verdeelt wordt, zo kan men het onderscheid aan de couleur der aden in 't blad zien, dewelke in 't manneken rood, en aan 't wyfje wit zyn. Deze boom brengt mede, gelyk de Jati, gene vruchten ofte bloemen voort, eer by tot zyne volle grootte gekomen is. De bloemen zyn nog onbekent, en men zegt, datze geen eygentlyke gedaante hebben, maar dat de vruchten straks uit een hoosje ofte blaasje voortkomen, dewelke men onder den boom afgevallen vint. De vruchten dan komen voort zonder bloeizel, altyd een alleen, en op een dikken en vinger langen steel, aan 't wytterste der ryskens, zynde koegel-ronde bollen, eerst in de grootte van een Limoen Nipis, maar metter tyd zo groot als een Limoen Itam, straks in haer begin uit enkelde hoekige pinnetjes gemaakt, die als borstels van een t'zamen gerolleden Egel rondom de binnenste kort staan, zo digt aan malkander, datze een lichaam schynen. Deze pinnetjes zyn aan 't buitenste eyndt dikst, en na binnen toessmallende, week, kruydachtig, en ligt afvallende, als men ze met de vingers vryft.





Capita hæc alia præterea gerunt mollia & exigua filaments, quæ totum efficiunt globum ruffum, & ad tactum lanuginosum, neutiquam vero pungentem, florumque loco inserviunt, quæ frustra decidunt, qua in re hic fructus convenit cum illo Bancal & Mannelorum: In deciduis fructibus observari nequit, quanam in parte petiolo juncti fuerint, nisi macula quædam effet glabra.

Post prismata decidua, verus in conspectum venit fructus, magnitudine minoris Pruni, ruffus vel pullus, qui carne constat fungosa & herbacea instar Soccum Capas: Folia decidua rubescunt instar cancri coeti, quod etiam in pluribus observatur silvestribus foliis. Lignum flavescit, ac parum ad ruffum adcedit color, nec maris vel feminæ multum differt, Sickio seu vulgari Bayeno ligno quam maxime simile, sed crassioribus constat fibris, mollius est, minusque durabile, nec in igne stridet, uti Sicki lignum.

Anni tempus. In initio pluviosorum mensium hæc arbor sua dimittit folia, atque in Augusto nova regenerat: Fructus ab avibus quibusdam, ac præfertim a vespertilionibus comeduntur, inque hortis seruntur, ubi quam citissime crescent in altissimas arbores, quæ lœte vigent, & ab Amboinenibus prope suas ædes locantur ob folia, quæ ipsi in usu sunt.

Nomen. Latine *Samama*, quo nomine Amboinice quoque vocatur, nullum vero aliud mihi ejus innotuit nomen.

Locus. In cunctis crescit Amboinæ insulis, tam in montibus quam in planis locis, sed ubique densas format silvas.

Urus. Ex ejus ligno afferes potissimum secantur, qui ad vulgares adhibentur ædes, atque a nostris lignariis *Baye* afferes vocantur, æque ac illi, qui ex Sicki ligno formantur, a quo vix distingui hoc potest lignum, Samamæ vero multo magis pallide flavescit, pilosius est, ac crassioribus constat fibris illo Sicki, nec ita bona nota ac durabile est. A Sicki maris vero ligno melius dignosci potest, quum hoc multo magis rubescat, & igni inpositum strideat. Oportet vero lignarios hæc bene novisse ligna, nec Samamæ lignum ad publica splendidaque adhibere ædificia, præfertim talia, quæ multa ablauuntur & depurantur aqua, quum tam cito putrefaciat, tenuibus vero septis infervire potest, atque in locis siccis si deponatur, satis durabile est, lignarii etiam amant hanc secare arborem in afferes, quum elegantes recti & crassi ex eo formari possint, nec difficile sit sectu vel elaboratu lignum, taliaque semper præferunt, magis ad commodum quam utile attendentes.

Arboris cortex a quibusdam Tiffadoribus recenti infunditur Sagueri potui, sed defectu alias Oebat, qui per ipsum ruber & adstringens est, sed non amarus; idem quoque ad Oebat Papeda adhibetur, si prius in aqua coquatur, qua Papeda præparatur. Trunci cortex cum illa Bintangor Laut, & Metrosideri coquitur in decoctum, quod propinatur contra fluorem album seminarum, quem expellit & deterget, ejusque materia terrestris simul confortat & adstringit: Amboinenses hujus foliis utur pro mappis & orbibus præfertim in publicis conviviis, in quibus tota mensa hisce foliis ut & illis Soccii strata est, unde & has arbores suis adponunt ædibus, quum adeo commodum præbeant supellectilem.

In Rumphii Appendix hæc adduntur.

Arbor in Hort. Malab. part. 3. Fig. 33. Katoe Tsjaka, Belgice Morgenster vocata, æque ad hanc Samamam, quam ad utrasque Banckalæ species libr. 5. descriptas referri potest. Portugallice *Faqua Falsa* vocatur.

Tabula Decima Nona

Ramum exhibet arboris, quæ Samama vocatur.

Ubi Litt. A. ejus fructum majori repræsentat forma.

O B S E R V A T I O.

Samama a Valent. pag. 221. obiter etiam describitur, & in Tab. sub No. LVI. exhibetur. & Katou Tsjaka *H. Malab.* a Plukn. in *Alm* pag. 203. vocatur Arbor Indica floribus & fructu in globum adgregatis.

Op baare hoofden dragenze nog andere kleene en week draatjes, die den gebeelen appel ros maken, in't aantasten wolgatig, dog geenzints stekende en zyn, in plaats van bloeizel, 't welk vergeefs afvalt, waar in deze vrucht overeenkomt met die van Bancal en Mannelen; in de afgevallen kan men niet bemerken, waar den steel gestaan heeft, of't moeste aan een plek zyn, die men altyd kaal ziet.

Na 't afvallen van de pennetjes, bekomt men eerst de regte vrucht, in de grootte van een kleene pruynt, ros, of vaal van coleur, binnen met een voos en kruydachtig vleesch, als Soccum Capas. De afgevallen bladeren werden rood, als een gekookte kreeft, gelyk vele andere bosch-bladeren doen. Het bout is geelachtig, een weinig na den rassen trekende, aan 't manneken en wyfken niet veel verschilende, het Sickje ofte gemeen Bayen-bout zeer gelyk, dog grofdradiger, weaker, en min durabel, in 't vuur niet knerzende gelyk Sicki-bout.

Sayzoen. In 't begin van de regen-Mousson werpt dezen boom zyn bladeren af, en in Augustus gewint by wedderom jong loof. De vruchten werden door eenige vogels, voornamelijk de Vleer-muyzen gegeten, en in de boven gezaayt, daar ze dan zeer weeldrig en haastig opschieten tot hooge boomen, die de Amboinezen by baare buyzen dulden, om 't gerief, datze van de bladeren hebben.

Naam. In 't Latyn Samama, gelyk 't ook in 't Amboinsch biet, zynde my geen andere naam bekent.

Plaats. Hy waft in alle de Amboinsche Eilanden, zo wel in 't gebergte, als op de vlakte, over al in de digte boschen.

Gebruik. Dit bout wert meest gebruikt om planken daar van te zagen, die men tot de gebouwen gebruikt, en onze timmerlieden Baye-planken noemen, zo wel als die van Sicki, van diewelke men ze ook qualyk kan onderscheiden, dog die van Samama zyn bleek geelder, bayriger, en grofdradiger, dan die van Sicki, ook verre zo goet en durabel met. Van Sicki 't manneken zyn ze nog lichter te onderscheiden, vermits 't zelve veel rooder is, en in 't vuur zeer knerft. De timmerlieden behoorden dan dese houten ter degen te leren kennen, en 't Samama-bout aan geene publieke of grote gebouwen te gebruiken, insonderheid daar men veel met water spoelt, om dat 't zo ligt vergaat, maar tot ligte schotten en in plaatzen daar 't droog staat, kan 't nog eenigzints duuren, zynde de boudzagers daarom zo graag, deze boomen tot planken te zagen, om datze schoon, regt, en dik zyn, niet swaar om te handelen, en de zaage ligt aanneemen, gelyke diergekyke houten meer nemen, daarze meer op de gemakkelykheid, dan op de deugden van 't bout zien.

De schorffe des booms wert van zommige Tiffadoors in de versche Sagueer gedaan, doch maar by gebrek van ander Oebat, diewelke daar van rood, en t'zamentrekende, maar geenzints bitter wert. De zelfde werd ook tot Oebat Papeda gebruikt, als menze te vooren in water kookt, waar mede men de Papeda toebereyd. De schorffe des stams, met die van Bintangor Laut, en die van Tzer-bout, werden tot decoctie gebruikt, die men maakt tegens de witte vloet der vrouwen, want het zet sterckelyk af de kalkachtige materie, en stoft met eene. De Amboinezen gebruiken dese bladeren tot baare tafelborden en servetten, insonderheid op publicke maaltyden, daar men de geheele tafel bedekt ziet met dese bladeren, als ook met die van Soccum, en daarom leydenze deze boomen by baare buyzen, om datze zo een gerieflyken huisraad daar van hebben.

In het Aanhangsel van Rumphius wert dit 'er by gedaan.

Den boom in Horto Malab. part. 3. Fig. 33. Katoe Tsjaka, in 't Duitsch Morgenster genaamt, kan men zo wel tot deze Samama als tot de beyde Banckals in 't 5 boek beschreven, brengen. In 't Portugees Jaqua Falsa.

De negentiende Plaat

Vertoont een Tak van een Boom, die de Samama genaamt wert.

Alwaar Lett. A. deszelfs vrucht in grooter gedaante aanwyft.

A A N M E R K I N G.

De Samama-Boom wert by Valent. p. 221. mede ter loops beschreven, en op de Plaat onder No. LVI. verbeeldt. en de Katou Tsjaka van de Hortus Malab. wert van Plukn. in zyn Almag op pag. 203. genaamt Oost-Indische Boom met bloemen en vruchten in een bol by een vergadert.