

Werk

Titel: Herbarium Amboinense, plurimas conplectens arbores, frutices, herbas, plantas ter...

Jahr: 1743

Kollektion: Zoologica

Werk Id: PPN369546733

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369546733> | LOG_0069

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

CAPUT TRIGESIMUM XXXII. HOOFDSTUK.
SECUNDUM.*Ulet.**Ulet - Boom.*

Ulet est arbor forma & magnitudine magno Limonio similis, cujus truncus quoque est angulosus, & cinereo obductus cortice, instar illius Limonis & Cofassii, qui fauciatu lentum emittit succum instar Papedæ pultis, qui vero mox exsiccat in aromaticam substantiam.

Folia brevibus insident petiolis simplicia & irregularia circa ramos illis Citrii similia, quæ in junioribus arboribus firmum gerunt apicem, ad oras profunde dentata sunt, inque spinosos apices desinentia instar Rusci, sunt porro glabra, firma, & subtus flavescencia, ubi & intermedia costarum interstitia venulis cancellatis pertexta sunt uti in Varinga, quinque sexve pollices longa, binos lata, quæ in vetustioribus arboribus minora sunt, nec vestigia spinosarum orarum gerunt, ac solummodo in firmum & acutum apicem desinunt.

Mense Majo parvos brevesque excrecunt juli, ex quibus albi progerminant flosculi, quos pusilli insequuntur fructus simplices, baccis minoris Varingæ similes, seu paulo magis oblongi, primo virides, dein nigri, intus nucleum gerentes mollem, edules vero sunt tam crudi quam cocti instar Catjang. Recens arboris lignum vitellinum gerit colorem, ad oras supra memoratum viscum exsudans, siccum vero flavum est fere instar Buxi, tenuibusque constat fibris, estque solidum, grave, fuscis ac nigricantibus maculis, punctis, ac venulis hinc inde variegatum, in aliis vero locis non ita. Sæpe etiam excavatum est, cariosum, atque emortuis corruptum plagis, præcipue circa ejus cor in vetustis arboribus, raræ enim occurrunt incorruptæ, quodque mirandum videtur, licet lignum hoc adeo sit durum ac solidum, nequaquam tamen durabile est, ac facile cossos generat, atque cariosum est ab abundanti forte succo, quo refertum est ac lente exsiccat.

Expertus sum lignum hoc crescente luna cæsum non tantum post aliquod menses cossos generare, sed in ipso recenter cæso hoc accidisse, Optimum vero cædendi hoc lignum tempus est decrecente luna, quumque fructus maturi sunt, tumque arbor ad dimidium cædenda est, talique modo per aliquod tempus sibi relinquenda, ut ejus succus exstillet.

Nomen. In Amboina nota est hæc arbor nomine Ulet, Ulete & Ayulet. In Boerone Ulit, in Ternata Lemo Lemo.

Locus. In Amboina ignota est, nec crescit nisi una alterave in Hitoes ora majori numero occurrit in parva Cerama seu Huamobela, ubique non longe a litore in locis saxosis. In Boerone & Gelolo quoque crescit.

Ufus. Hoc lignum ad tigna raro adhibetur, quum vix recta ex ipso formari possint segmenta & tam cito putrescat, Ceramenses tamen & Ternatani illud solebant adhibere ad ædium postes, si dicto cæsum sit modo; sic enim non cito cossos generat, diu solidum est, durum, grave, ac durabile, unde & hoc lignum intra dimidii anni spatium in usum non est vocandum, tum quoque torniones ex hoc cubilia formant, apertum etiam est ad securium manubria, ut & ad anchoras ligneas parvorum navigiorum ob ejus pondus.

Ulet is een boom van gedaante en hoogte de groote Limoen-boom gelyk, de stam mede wat boekig, met een evene graauwe schorsse, gelyk die van Lemon en Cofassu, welke gequetst zynde een taaye vochtigheid uitgeeft, gelyk Papeda, die strax opdroogt in een kruydachtige substantie.

De bladeren staan op korte steeltjes, enkel en zonder order, rondom de takken, die van Citroenen gelyk, aan de jonge boomen met een styve spitze, aan de kanten grof getant, en in stekelige spitzen eindigende, gelyk de Ruscus; voorts glad, styf, en van onderen geel-groen, alwaar men de tusschen-plaatsjes van de ribben doorweven ziet met kleine adertjes, ruytsgewys gelyk aan de Waringen, vyf en zes duymen lang, twee breed; aan de oude boomen zynze kleender, zonder litteeken, van de steekelige kanten, alleenlyk met een styve en scherpe spitze.

In May gewint by kleine korte kattedens, daar aan kleine witte bloemen voortkomen, daar op volgen kleine vruchten, enkel hangende, de bescien van de kleine Waringen gelykende, of wat langwerpiger, eerst groen, daar na swart, van binnen met een zachte korf, die men eeten kan, zo wel raauw, dog meest gekookt, als Catjang. Het versche hout is doorn-geel, en aan de kanten 't bovenstaande slym uitgevende, maar besterft bleek-geel, bykans als Bux-boom, fyndradig, digt en swaar, met bruyne of swartachtige plekjes, puntjes en adertjes hier en daar gespikkelt, op zommige plaatzen niet. Het is dikwils ook hol, vergaan, en met dootsche vlekken geschendt, byzonder omtrent het hert aan de oude boomen, want men vind ze weinig die gaaf zyn. Ook dat te verwonderen is, hoewel dit hout zo hard en dik schynt, is 't nogtans niet durabel, maar gewind zeer ligt wormen, en vermolft, misschien door de veele vochtigheid, die daar in steekt, en langzaam opdroogt.

Ik heb ervaren, dat dit hout by wassende maan gekapt, niet alleenlyk na eenige maanden wormstekig word, maar dat men ook in 't versche gekapte wormen gevonden heeft; de beste tyd om te kappen is by afnemende maan, en als de vruchten ryp zyn, en dan moet men den boom maar half doorkappen, en also een tyd lang laten staan, dat de vochtigheid ter degen uittieffert.

Naam Hy is in Amboina bekend met den naam van Ulet, Ulete, en Ayulet. Op Boero Ulit. In Ternaten Lemo Lemo.

Plaats. Op Amboina is het onbekent, behalven weinige op de Kust van Hitoe: In meerder quantiteyt is hy op kleen Ceram of Huamohel, over al niet verre van strand, daar 't wat steenig is. Hy wast mede op Boero en Gelolo.

Gebruik. Dit hout werd tot timmeren weinig gebruikt, om dat men weinig regts daar van hebben kan, en zo ligt vergaat: Echter de Cerammers en Ternatani plegen 't tot stylen van buyzen te nemen, als 't op voorsz. maniere gekapt werd, want als de worm niet ten eersten daar in komt, zo blyft 't daar na gaaf, swaar, en durabel, daarom men dit hout binnen een half jaar tot geen werk gebruyken zal, als dan maken de Drayers ook bed-stoelen daar van; zo is 't ook zeer bequaam tot steelen van bylen, als mede tot boude ankers van haare kleine lichte Vaartuygen, wegens zyne swaarte.

Tabula Trigesima Quarta

De vier- en dertigste Plaat

Ramum exhibet arboris, quæ Ulet, & Lemo Lemo incolis vocatur.

A. Junioris arboris ramulum repræsentat, cujus folia dentata sunt.

Vertoont een Tak van de Ulet-Boom, die ook Lemo Lemo by de Inlanders genaamt wert.

A. Wyft aan een Takje van een jonge Boom, welkers bladen nog getant zyn.





