

Werk

Titel: Herbarium Amboinense, plurimas conplectens arbores, frutices, herbas, plantas ter...

Jahr: 1743

Kollektion: Zoologica

Werk Id: PPN369546733

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369546733> | LOG_0154

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369546733>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

RUMPHII ADPENDIX tribus subsequentibus Capitibus porro auctus est.

Het Byvoegzel van Rumphius is verders met de drie volgende Hoofdstukken vermeerderd.

CAPUT SEXAGESIMUM NONUM.

LXIX. HOOFDSTUK.

Umbraculum maris. Brappat Tudong.

De Zee-schermb-Boom.

Superfunt quædam minus notæ *Mangii* species, quas ad antecessores referre potueram, quum vero ab iis multum differant, separatim illas hic subungere & describere malui.

Umbraculum Maris, varietas est *Mangii Corniculati*, supra cap. 64. descripti, cujus binas observavi species; prima harum mihi dicitur *Ceramensis*, altera *Amboinensis*.

Primo *Ceramensis* truncum gerit haud multum crure crassiore, nec viro altiore; ejus rami sese dividunt in plures nodosos & breves ramulos, qui densam formant comam. Folia nunc & plurimum foliaria sunt, nunc vero obposita, vulgaris *Brappat* formæ, superius nempe subrotunda, crassa, scabra, ac vix notabilibus venis distincta lutescentibus & parum protuberantibus, sunt vero tres & quatuor pollices longa, binos digitos lata.

Flores sunt uti *Mangii Fruticantis*, ex petalis parvis albisque constructi, incurvis & rugosis instar illorum *Bonga Lacca*. Fructus incurvæ sunt filiquæ instar *Acinacis* vel *Falcis*, illis *Mangii corniculati* omnino similes, sed magis incurvæ, & apice sursum elevatæ, digitum articulum circiter longæ, calamus crassæ, externe pallide virentes, interne repletæ viridi penitus medulla, filiquarum formam habente, quæ sicca est, & in bina segmenta divisibilis: Arboris cortex nigricat, multisque elevatis punctis notatus; lignum est album & molle uti reliquorum *Brappat*, quam diu nempe vegetum est.

Si hæc arbores copiosæ & plures sibi adstant, non late sese extendunt, sed foliaria ingentem formant comam, instar *Umbellæ* formatam, quæ *Tudong* vocatur, quamque mulieres supra caput gerunt.

Crescit hæc arbor talibus in litoribus, quæ saxosa sunt, & maris reditu aqua obducta, quum hæc arbor coma sua aquæ supernatet, & ipsi tanquam *Umbraculum* inservit: Si vetusta sit, ejus lignum durissimum est & gravissimum, in aqua fundum petens, coloris ex fulco rufi, in medio autem nigricans, sed raro occurrit: Hinc patet non multum differre hanc arborem a *Mangio corniculato* supra descripto, tam quoad folia quam fructus, atque differentia potissimum hac in re sita est, quod *Umbraculum* hoc maris arbor sit foliaria, atque hinc extra classem reliquorum *Mangiorum* secludenda, in tali porro crescit plano litore, quod aqua continuo marina conspergitur. Supra memoratum durum lignum raro invenitur, & ex *Caybobben* opinione tantum in foliaria ista occurrit arbuscula, quæ vetusta est, & in aqua marina diu decubuit.

Secundo *Amboinensis* species truncum gerit non ultra quatuor pedes altum, comamque itidem habet extensam instar *Pajong*.

Folia ejus maxime a præcedenti differunt, minima enim pollicem, & maxima binos transversales digitos longa sunt, unum vero lata, subrotunda, & parum bifida, glabra, nec notabiles gerentia costas. Fructus ejus itidem non ita incurvi sunt, vix pollicem longi, in longum desinentes apicem, lutei, ac facile decidui.

Nomen. Latine *Umbraculum maris*, Malabarice *Tudong Laut*, vel *Brappat Tudong*, & *Pajong Laut*. *Caybobben* in magna *Cerama* illam vocant *Papari*, alii vero *Watta Tube Tube*.

Locus. In magna occurrit *Cerama* circa *Caybobbo*, uti & in *Leytimoræ* plaga *Zephyrea* in litore *Ruttum*, & in litore *Halong* circa *Lateri*.

Ufus. Ab incolis noxia habetur hæc arbor, cujus & nullas gustant partes: Ejus cortex contusus, & aquæ injectus pisces enecat instar aliorum *Bori*. Ex fusco nigroque ligno manubria telorum, aliorumque instru-

DAar zyn nog eenige min bekende soorten van *Mangi* *Mangi*, dewelke ik wel onder de voorgaande badde konnen brengen, dog dewylze nog al wat van dezelve verschillen, zo heb ik ze liever hier agter in't byzonder willen beschryven.

Umbraculum Maris, is een verandering van *Mangium Corniculatum*, boven Kapittel 64. beschreven, waar van ik twee soorten aangemerkt hebbe. De eerste noem ik de *Ceramze*, en de tweede de *Amboinsche*.

Eerstelyk: de *Ceramse* heeft een stam niet veel dikker dan een dye, en niet hooger dan een man. De takken verdeelen hun in veele korte en knoestige zyde-takjes, makende een digte kruyn. De bladeren staan zommige enkeld gelyk de meeste zyn, zommige tegens malkander, van gemeene *Brappats* satzoen, te weten voren rond toelopende, dik, styf, met pas kennelyke ribbekens, dewelke geel uytsteeken, drie en vier duymen lang, en twee vingers breed zyn.

Het bloeizel is gelyk als aan 't *Mangium Fruticans*, van kleene witte blaadjes gemaakt, die wat gefronst zyn, als die van *Bonga Lacca*. De vruchten zyn kromme bouwen, als *Sikkels*, die van *Mangium Corniculatum* gantsch gelyk, dog krommer, en met de spits opwaarts gekeert, omtrent een lidt van een vinger lang, en een scharf dik, buyten bleek-groen, binnen gevult met een gras-groen bert, gefatzoeneert na de bouwen, droog, en in tweeën deelbaar. De schorsse is swart, en met veele opgeworpene puntjes rug. Het hout is wit en week, gelyk aan ander *Brappat*, zo lang het in't groeyen is.

Als deze boomen veele by malkander staan, zo berydenze haer niet wyd uyt, maar alleen staande, maakenze een breedten kruyn, gefatzoeneert als een stroo- en schermboed, genaamt *Tudong*, als de *Vrouwen* op het hoofd dragen.

Zy groeyen op zodanige stranden, dewelke steenachtig zyn, en met het hooge water bedekt werden, wanneer dezen boom met zyn kruyn op het water dryft als den voornoemden schermboed. In den ouderdom wert het hout zeer bard en swaar, in 't water zinkende, bruyn-ros van couleur, maar na de midden swartachtig, en wert zelden gevonden. Hier uyt blykt dan, dat het niet veel verschilt van het bovenstaande *Corniculatum*, zo aan bladeren als aan vruchten, bestaande het onderscheyd meest hier in, dat dit *Umbraculum Maris* een eenzamen boom is, en 't moet buyten den rang van andere *Mangi* *Mangi* gemeenelyk op een zodanige vlakke strand staan, die geduurig met zee-water besproeyt is. Het bovenstaande harde hout wert zelden gevonden, en na 't oordeel der *Caybobbers*, alleenlyk aan dat eenzame boompje, wanneer het zelve oud wert, en in zee-water blyft leggen.

Ten Tweeden: De *Amboinsche* soorte heeft een stam niet boven vier voeten hoog, en is mede uytgebreyd van kruyn, als een *Pajong*.

De bladeren verschillen merkelyk van het bovenstaande, want de kleinste zyn een duym, en de grootste twee dwers-vingers lang, en een vinger breed, van voren rond en een weinig geklooft, glad, en zonder kennelyke ribben. De vruchten zyn ook wat anders, te weten niet zeer krom, schaars een duym lang, met een lange spits, geel, en ligt afvallende.

Naam. In 't Latyn *Umbraculum Maris*. Op Malabaars *Tudong Laut* of *Brappat Tudong* en *Pajong Laut*. Die van *Caybobbo* op groot *Ceram*, noemen hem *Papari*, andere *Watta Tube Tube*.

Plaats. Men vind hem op groot *Ceram* omtrent *Caybobbo*, als mede op *Leytimors* zuydzyde op het strand van *Ruttum*; en op het strand van *Halong* omtrent *Lateri*.

Gebruik. Hy wert by de *Inlanders* voor een schade-lyken boom gebouden, waar van niets geproeft wert. De schorsse gestampt en op 't water gestrooyt, doet de visschen sterven, gelyk andere *Bori*. Uyt het swart-bruyn hout





strumentorum formari possunt: Javani tale eligunt & expetunt lignum, ex quo telorum suorum manubria formant, si eleganter nempe sit venosum. Fuscum hoc lignum ad trunci fissuras quoque reperitur, quum emortuus sit, uti illud in *Arbore Excæcante* seu *Matta Hoeri* obcurrit.

bout kan men begten maken tot Parrangs en andere gereetschappen. De Javanen zoeken zulk hout om kris-begten daar van te maken, als het mooy geaderd is. Het bruyne hout vind men ook in de scheuren des stams, wanneer dezelve gestorven is, gelyk aan den *Arbor Excæcans* of *Matta Hoeri* geschiebt.

Tabula Octogesima Secunda

Ramum exhibet *Umbraculi maris*, quod *Brappat Tudong* incolis vocatur.

De twee- en tachtigste Plaat

Vertoont een Tak van de *Zeescherm-Boom*, die *Tudong Brappat* by de Inlanders genaamt wert.

CAPUT SEPTUAGESIMUM.

Mangium floridum. *Mangi Mangi Bonga.*

HEc quoque *Brappat* species est, cujus folia item sunt cruciata, binos tresve pollices longa, unum lata, subrotunda seu obtusa, crassa, firma, glabra, & costis destituta, excepto nervo medio, qui infra acute protuberat, & ibi flavescit. Ramulorum summum terminatur in spatham ex binis foliolis sibi oppositis & adcumbentibus formatam.

Flores primo acuta sunt capitula, in orbem posita, & floris formam exhibentia, hæc sese aperientia in caliculo plurima exhibent fusca stamina, quibus deciduis, caliculus sese aperit in stellulam planam ex quinque radiis compositam. atque in hac verus locatur fructus coniformis formam exhibens, vix pollicem longus, ex fusco & viridi variegatus, qui florem item repræsentat, unde ab Amboinensibus suum obtinuit nomen: Rami sibi etiam directe obponuntur, sæpe etiam quaterni sunt: Lignum satis durum est, sed non magnum format truncum.

Nomen. Latine *Mangium floridum*. Malaice *Mangi Mangi Bonga*, juxta Amboinense *Watta Coeban* seu *Cumban*, quum ejus fructus florem referant.

Locus. In *Halong* litore obcurrit.

Tabula Octogesima Tertia

Ramum exhibet *Mangii floridi*.

LXX. HOOFDSTUK.

De Bloem-dragende Mangi-Boom.

DIt is mede een zoorte van *Brappat*, waar aan de bladeren ook mede in 't kruys staan, 2. en 3. duymen lang, een breed, van voren rond of stomp, dik, styf, glad, zonder eenige ribben, behalven de middelzenuwe, beneden scherp uytbuylende, en aldaar geel-groen. Het uytterste der ryskens eyndigt in een spadeld van twee blaadjes tegens malkander geplakt.

De bloemen zyn eerst spitze knopjes, dewelke in een kring staan, in gedaante van een bloem; deze haar openende, vertonen in een bekertje veele bruyne draden, dewelke uytgevallen zynde, opent zig het bekertje in een plat voetje of sterretje, van 5. stralen gemaakt, en daar in staat de regte vrucht als een kegeltje, schaars een duym lang, uyt den bruynen en groenen gemengt, vertonende al wederom een bloem, waar van het by de Amboinezen den naam heeft. De takken staan ook regt tegens malkander, ook zomtyds vier by malkander. Het hout is redelyk hard, dog zet geen grooten stam.

Naam. In 't Latyn *Mangium floridum*. Op Maleys *Mangi Mangi Bonga*, na 't Amboinsch *Watta Coeban* of *Cumban*, om dat zyne vruchten na een bloemgelyken.

Plaats. Men vind het op den strand van *Halong*.

De drie- en tachtigste Plaat

Vertoont een Tak van de *Bloem-dragende Mangi-Boom*.

