

## Werk

**Titel:** Herbarium Amboinense, plurimas conpleteens arbores, frutices, herbas, plantas ter...

**Jahr:** 1743

**Kollektion:** Zoologica

**Werk Id:** PPN369546733

**PURL:** [http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369546733|LOG\\_0162](http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369546733|LOG_0162)

**OPAC:** <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369546733>

## Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

## Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen  
Georg-August-Universität Göttingen  
Platz der Göttinger Sieben 1  
37073 Göttingen  
Germany  
Email: [gdz@sub.uni-goettingen.de](mailto:gdz@sub.uni-goettingen.de)

In Rumphii Auctuario hæc adduntur.

Arbor *Ensada*, seu uti alii scribunt, *Ensanda* a *Dapper* in *Loanda* pag. 244. descripta, atque ibi *Ficus Indica* dicta, juxta ejus descriptionem folia gerit illis *Mali Cotonei* similia, fructusque pollicis articulum longos, nulla alia videtur esse arbor nisi *Varinga nostra latifolia*, excepto quod *Loandoensis* arbor multo major sit, quum millia hominum, immo plures sub ejus umbra latere possint. Peculiare est in *Dapperi* *Madagascar* pag. 32. nomen indigenum *Varinga Nounouk*, & fructus *Voa Nounouk* cum *Amboinensi* ita convenire, uti plura nomina istius insulae cum *Amboinensis* quadrant.

### Tabula Octogesima Quarta

Ramum exhibit *Varinga latifoliae*.

Ubi Litt. A. fructum iusta magnitudine repræsentat.

### OBSERVATIO.

Hæc est *Ficus arbor Americana*, *Arbuti* foliis non serratis, fructu Pisi magnitudine, funiculis e ramis ad terram demissis prolixa, *Plukn. Almag.* p. 144. & *Phytogr. Tab. 178. Fig. 4.* quæ ex ejus sententia forte est *Ficus arborecens Africana*, *Arbuti* foliis non serratis *Hort. Beaum.* & *KATOE ALU Hort. Mal.* p. 10. *Tab. 57.* ut & forte *Alhu ZANON.* p. 19. &c.

Hic pertinet quoque *Ficus Indica maxima*, folio oblongo, funiculis e summis ramis demissis, radices agentibus, se propagans, fructu minore sphærico sanguineo *Sloan. Cat. pl. Jam. pag. 289. & Hist. p. 140. Tab. 223* ubi fructus ex foliorum alis solitarius depingitur, unde alia ejus species videtur, ac forte pertinet nostra ad illam pag. 138. in *Hist. Jamaic.* proposita. Vide porro *Ray Hist. tom. 3. dendr. p. 15. & 16.*

*Varinga latifolia a Valent. in Amboinæ descript. pag. 223. etiam describitur.*

### CAPUT SECUNDUM.

*Varinga repens. Waringin Malatta.*

Präcedentis *Latifoliae* altera species est, quæ, quantum scio, nunquam in arborem excrescit, sed quæ flagellis suis longis aliis fœse in miscet arboribus, vel aliis incumbit herbis, cuius rami seu flagella digitum circiter crassa sunt, atque his folia incident solitaria, tres, quatuor, ac raro quinque pollices longa, binos vero lata, in inferiore parte subrotunda, quorum quædam sunt angustiora, multo crassiora, firmiora, & rugosiora quam præcedentis, in brevem durumque apicem desinentia, cæterum ejusdem formæ, atque lactescencia, ramuli autem extremiti in cornicula desinunt breviora quam prioris.

Fructus bini ac terni simul dependent ex ramulis magnitudine *Cerasorum* nigrorum, primis *Ficorum* rudimentis similes, sed superius plani & umbilicati, primo lutei, dein intense rubri ac fere fusci, nullis apicibus notati: Si penitus sint maturi, plerumque solitarii dependent ex ramis, & ad tactum molles sunt, intus autem repleti sunt granulis, nullam exhibentes cavitatem, saporis fatui dulcis, edules tamen quadammodo sunt, & proxime ad *Ficorum* saporem adcedunt, sed sunt parum aciduli, paucumque spissum ac flavescens lac emitunt.

Cunctas hæc arbores adscendit ac præsertim *Lingoas*, sed ipsiis non firmiter adhaeret, at longis suis flagellis ex ipsarum ramis dependet; ubi vero humiles arborum ramos adtingere nequit, per terram prorepit, licet ortum ex truncis quarundam arborum ducat, ut id in densis & magnis observatur silvis, unde & arbores ipsas non strangulat.

Nomen.

Dit heeft Rumphius in zyn vermeerdering daar by gedaan.

Den boom *Ensada*, of, gelyk andere schryven, *Ensanda*, beschreeven by *Dapper* in *de Loanda* pag. 244. en aldaar Indiaansche *Vyge-boom* genaamt, volgens zyn beschryving met bladeren als den *Quepeer-boom*, en vruchten als een lid van een duym, schijnt anders niet te zyn als onze grootbladige *Varinge*, behalven dat den *Loandozen* boom veel groter moet zyn, om dat er duyzent en meer menschen onder kunnen schuylen; bet is aanmerkelyk, dat in *Dapper* zyn *Madagascar* pag. 32. den *Inlandzen* naam van deeze *Varinga-boom* *Nounouk*, en de vrucht *Voa Nounouk*, met de *Amboinsche* zo overeenkomt, gelyk met meer naamen op het zelve Eyland geschiet, die met de *Amboinsche* naamen gemeenschap hebben.

### De vier- en tachtigste Plaat

Vertoont een Tak van de breedbladige *Varinge-Boom*.

Alwaar Lett. A. deszelfs vrucht in zyn natuurlyke gedaante aanwyft.

### AANMERKING.

Dit is de Americaansche *Vyge-Boom* met het bladt van de *Arbutus*, dog niet gezaagt, en een vrucht in de grootte van een boon, met touwtjes uyt de takken, in de aarde zig vastmakende en voorttelende van *Plukn.* in zyn *Almag.* p. 144 en in de *Phytogr. Tab. 178. Fig. 4.* welke volgens zyn gevoelen mogelyk is de Africaansche *Vyge-Boom*, met het bladt van de *Arbutus*, dog niet gezaagt, van de *Hortus Beaum.* en de *Katoe Alu* van de *Hortus Malab* tiende deel *Tab. 57.* en mogelyk de *Alhu* van *Zanonius* pag. 19. &c.

Hier toe behoort mede de zeer grote Oost-Indische *Vygeboom*, met een langwerpig blaet, en zig vermeerderende door touwtjes, uyt de opperste takken in de aarde neerschietende, met een kleyne ronde bloedrode vrucht, van *Sloan.* in zyn *Catal. pl. Jam. p. 189.* en in de *Histor. p. 140. Tab. 223.* dog alwaar een enkelde vrucht uyt den oorspronk der bladeren enkelt is afgescheft, so dat dit mogelyk een andere soort s, en, onzæ mogelyk behoort tot die geene die in zyn *Historie* op pag. 138 voorkomt. Ziet verders *Ray* in zyn *Histor.* derde deel van de *Dendrologie* op pag. 15 en 16.

De grootbladige *Waringin-boom* wert van *Valent.* in de beschryving van *Amboin* op pag. 223. meede beschreven.

### II. HOOFDSTUK.

De kruypende *Waringe-Boom*.

De voorgaande breedbladige heeft een tweede soorte, die (myns wetens) nooit een boom werd, maar met baare lange takken door andere bomen zig been slingerd, of op de lage ruft, synde de takken of lange ranken omrent een vinger dik. De bladeren staan enkeld, drie, vier, en zelden vyf duymen lang, twee dito's breed, achter rond toegebild, sommige wat smalder, veel dikker, stijver, en ruyger dan de voorgaande, met een korte en harde spits, anderzins van 't zelfde maaksel, ook melkachtig. De uytterste ryskens hebben korter boortjes dan 't voorgaande.

De vruchten hangen twee a drie by malkanderen aan de takjes, in de grootte van krikjes, de eerste knoppen van *Vygen* gelyk, doch voor wat plat, en met een kuyltje, eerst geel, daar na hoog-rood, en bykans bruyn, zonder puntjes. Als zy gebeel ryp zyn, hangen meest enkeld, en zyn wat week in 't aantasten, binnen zynze vol kleyne greintjes, en in de midden schier zonder holligheid, van jmaak laf-zoet, dog eenigzins bequaam om te eeten, de vygen na by komende, met een kleyne rynsheid, weinige dikke en geelachtige melk uitgevende.

't Klimt alderhande bomen op, inzonderheid de *Lingo*-bomen, dog begt zig daar niet vast aan, maar hängt met lange ranken van de takken af; daar 't geen laaggetakte boom kan bereyken, moet het langs de aarde kruipen, hoewel 't zyn oorspronk uyt de stammen eeniger boomen heeft, gelyk men in de digte en groote boschagien vind: weshalven 't ook onschuldig blijft aan 't verwurgen der boomen.

Naam.













*Nomen.* Latine *Varinga repens.* Malaice *Waringin Malatta*, h. e. *Varinga repens*, licet enim arbores consendant, non tamen ipsi sese nechtit: Balaice *Sappa Lalawa*, h. e. *Vespertilionum pabulum*, quum hi ipsius fructus maxime expertant, atque ubi ipsorum nucleos projiciunt, hi progerminant, novosque producent frutices.

*Locus.* In Amboina crescit tam in levibus silvis & collibus, tam ex aliis dependens arboribus, quam in altis silvis per terram prorepens; invenitur quoque in Baley.

*Uodus.* Hominibus non magno hic frutex usui est, sed plurimum ejus fructus sunt avium cibi, præfertim vespertilionum, nihilominus tamen ipsius fructus maturi sunt dulces & edules, magis autem delectationi quam pabulo hominum inserviunt.

Decembri & Januario maturi observantur fructus ex frugiferis ramis dependentes, qui folia saepe habent non subrotunda, sed oblonga & angustata, ita ut varietas prioris videretur esse.

*Supa Varinga* quoque est folium gerens priori secundæ varietati simile, oblongius nempe, rugosum, & in durum apicem definens, fructus ejusdem sunt formæ cum priore, sed non ita edules sunt, crassissima autem est arbor ex plurimis flagellis ac ramis composta, comamque gerit amplam & regularem. Ejus radices sunt copiosæ, & nudæ plerumque supra terram elevantur, attamen firmiter ipsi inhærent. Maturi ejus fructus potissimum rubent, parumque fusci sunt; quum vero tantam cum priore habeat similitudinem, parvique sit usus, uno in capite hanc simul describere volui.

*Nomen.* In Amboina potissimum nota est hæc arbor nomine *Supa*. Hitoenses illam vocant *Nuno Mattacau*, h. e. *Varinga rubens*, a rubris ejus fructibus.

*Locus.* Plurimum crescit in insulis Uliasserenibus, ingens ejus arbor ante repugnaculum nostrum Ceyt locata est in litore nudo, cuius radices fere nudæ supra terram elevantur, unde facile cognoscitur, sed mirandum est hanc arborem vehementes maris fluxus anno 1674. supra memoratos innoxie tolerare potuisse, qui tamen magis remote in ipsa terra milliones arborum eradicator & rapuerunt, uti & ipsum propugnaculum prope illam locatum, quod in plano & humili litore situm est, uti & crassissimi muri gentes castelli Hila per eosdem fluxus proiecti sunt, certum indicium divinæ providentiae, qua in communione periculo res debilissimæ magis conservantur quam fortissimæ.

*Pelal Luhunensium*, & *Anabul* Hitoensium forte eadem est arbor quæ *Supa*, vel ejus varietas, folia gerit latifoliæ, sed latiora, firmiora, quæ rarioribus venarum cancellis donata sunt, ejus fructus parvi sunt Fici, qui coqui possunt, & edules sunt, paucum vero gerit lac, sed duriore constat ligno reliquis *Varingæ* speciebus.

### Tabula Octogesima Quinta

Ramum exhibet *Varinga rubra*.

### Tabula Octogesima Sexta

Ramum exhibet arboris, quæ *Supa* vocatur.

*Naam.* In 't Latyn *Varinga repens*. Op Maleys Waringin Malatta, dat is kruypende Waringe; want al beklimt het de bomen, zo maakt 't zig egter niet vast aan dezelve. Op 't Baleys Sappa Lalawa, dat is Vleermuyzen knauzel, om dat dezelve deze vruchten gaarn eten en waar ze de korls laten vallen, schietenze uyt, daar dan nieuwe struiken van groeyen.

*Plaats.* 't Waft in Amboina, zo in de ligte boschen en Valeyen, zo van andere boomen afhangende, als in 't hoge wout langs de aarde kruypende: Als mede op Baley.

*Gebruik.* De menschen bebben geen of weinig gebruyk van dit gewas, dies 't meest dient tot kost van vogelen, inzonderheid van de Vleermuyzen; niet te min zyne rype vruchten zyn zoet en bequaam om te eeten, dog meer tot smaak dan voedzel.

In December en January ziet men de rype vruchten, aan de vruchtdragende takken vind men somtyds de bladeren, niet rond gebild, maar toefmallende, zo dat men ze voor een verandering van de voorgaande zoude houden.

Supa is een Waringe-boom met een blad, de voorgaande tweede verandering heeft gelyk, te weten langwerperger, ryg, en met een barde spits. De vruchten zyn van dezelfde gedaante als de voorige, dog zo goed niet om te eeten, maar 't vert een zeer dikken boom, uyt vele omwincelen of armen gemaakt, met een breede ordentlyke kruyng. De wortelen zyn zeer veel, en staan meest boven de aarde, doch zyn niet te min vast, de rype vruchten blyven meest rood, of werden een weinig bruyn; om dat by zo veel gelykenis met 't voorige touw-gewasch heeft, en een boom van kleen gebruyk is, heb ik hem in een Kapittel met het zelve willen begrypen.

*Naam.* Hy is in Amboina meest bekent met de naam van Supa. De Hitozen noemen hem Nuno Mattacau, dat is roodachtige Waringe, van de rode vruchten.

*Plaats.* Hy waft meest in de Uliassersche Eylanden, een groote boom staat voor onze reduit op Ceyt aan bet kale strand, met de wortel meest bloot, van verre kenlyk, en te aanmerkelyker om dat dezen boom de geweldige bovengenoemde zee-baaren Anno 1674. onbechaagt wytgestaan heeft, die nogtans landwaart in, vele duyzende boomen weggevoert heeft; gelyk ook 't onnozele kleyne reduitje daar by staande, op een vlakte en geveel lage strand gelegen, daar nogtans aan bet sterke slot Hila alle muren van 't buytenwerk door dezelfde baren zyn omver gesmeten. een klaar bewys van de Goddelijke goedheid, die in een algemeen gevær bet swakste dikwils meer beschermt dan 't sterkste.

Pelal by de Lubunezen, en Anahul by de Hitoeëzen, is misschien het zelfde met Supa, of een verandering daar van; 't heeft bladeren als de voorschreve breedbladige, doch breder, stijver, en met een ydeler geweef van adertjes. De vruchten zyn kleyne Vyges, die men koken en eeten kan; 't heeft weinig melk, en een barder bout dan andere Varingaas.

### De vyf- en tachtigste Plaat

Vertoont een Tak van de rode Waringe-Boom.

### De zes- en tachtigste Plaat

Vertoont een Tak van de Boom *Supa* genaamt.

