

Werk

Titel: Herbarium Amboinense, plurimas conplectens arbores, frutices, herbas, plantas ter...

Jahr: 1743

Kollektion: Zoologica

Werk Id: PPN369546733

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369546733> | LOG_0234

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369546733>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

CAPUT TRIGESIMUM XXXVI. HOOFDSTUK.
S E X T U M.*Perticaria tertia. Hunut.**De Stange-Boom.*

Perticaria tertia crassum, sed non altum, gerit truncum, albo glabroque cortice obductum, quò a cæteris distinguitur, & dignoscitur arboribus, atque in binas subdividitur species, latifoliam & parvifoliam, quæ utraque unam eandemque habent formam, excepto quod magnitudine differant.

Hunut parvifolia vulgarissima est, paucos gerens sinuosos & breves ramos: Hujus folia solitaria sunt, formam habentia potissimum perticariæ primæ, sed latiora sunt, nec mollia aut lanuginosa instar illius, sed rugosa admodum & scabra, ut & petioli ac superiores ramuli, unde & quodammodo spinulosa & arenosa videntur, ad oras subtiliter ferrata sunt, ac porro ficiissima, injucundi adpectus, & sonora.

Folia hæc inæqualis sunt magnitudinis, atque inordinata ramis insident, quædam enim spithamam longa sunt, ac sex digitos lata, quædam quinque & sex pollices longa, vix quatuor lata, inferius subrotunda, ac sinuosa prope petiolum, ubi tres magni nervi concurrunt cum aliis costis transversalibus & venulis, a quibus folium rugosum est.

Flores in ample extensis racemis excrescunt, qui singularis sunt formæ, compositi enim sunt ex decem angustis aureis petalis, instar stellæ expansis, in quorum medio alia quædam minorâ petala locantur circinnata, aureum referentes auris ornamentum, quod ex mulierum auribus dependet. Fructus magnitudinem Cerasi nigri habet, substantiæ lentæ, atque in quinque ejus cellulis totidem locantur tenuia, oblonga, & incurva semina, quorum anguli acuti sunt, maturescunt autem Octobri & Novembri, floresque producunt sub finem pluviosorum mensium. Fructus vero ipsi sunt pentagoni instar *Catti-Marus*, ac si ex quinque alis seu cellulis essent compositi, coloris fumei, & leves.

Arboris lignum levissimum, mollissimum, & inutilissimum est omnium lignorum, licet crassis constet fibris, & crassum sit, ad oras silvarum crescit hæc arbor ubique, tam in planitie, quam in montibus, plurimum vero in arenosis & sterilibus locis.

Latifolia præcedenti similis est forma, ejus vero truncus altior est, atque folia plerumque spithamam longa sunt, quinque & sex pollices lata, eodem modo ferrata & venosa, multo autem rugosiora sunt, nec tantum arenosa, sed etiam pungentibus pilis hirta, præsertim petioli & rami, ita ut difficulter tractari possint, atque pruritum excitent. Fructus eandem gerunt formam cum prioribus, sed sunt oblongiores, digiti articulum longi: Ejus lignum magis albicat, mollius est, & fragilius quam præcedentis, nec durabile.

Ambæ arbores corticem gerunt glabrum & album, quo ab aliis facile dignoscuntur arboribus, qui que lentus est uti Restiaria.

Nomen. Latine *Perticaria tertia*, quum tertia sit ordine & virtute, a vulgo vocatur Malaice *Caju totarra*, uti præcedens, verum autem nomen Amboinense est *Hunut*.

Ufus. Parvifolia vulgares præbet palos, ad opera vero, quæ per aliquot tempus durabilia esse oportet, non vel raro adhibetur, latifolia nullum subministrat tignum, sed foco utile est ejus lignum.

*Tabula Centesima Vigesima*Ramum exhibet *Perticariæ*.

De derde Stange-boom heeft een dikke, dog geen bogen stam, met een witte effene schorffe bekleed, die bun onder andere kennelyk maakt, en is onderdeeld in twee soorten, grootbladig en kleinbladig, zynde van een fatzoen, behalven dat de bladeren in grootheid verschillen.

Het kleinbladige Hunut is 't gemeenste, heeft weinige, bogtige, en korte takken. De bladeren staan enkeld, van fatzoen meest als de *Perticaria Prima*, dog breeder, niet zagt of wolachtig, gelyk die, maar zeer rimpelig en ruyg, gelyk ook de stelen en voorste takken, waar door zyeenig-sints stekelig of zandig vallen in 't bandelen, aan de kanten ook syn gezaagt, voorts zeer droog, onaanzienelyk en rammelende.

De bladeren zyn van ongelyke grootte, en dat door mal-kander aan een tak, want zommige zyn een span lang, en 6. vingers breed, zommige 5. en 6. duymen lang, schaars 4. dito breed, agter met ronde billen, die aldaar een boesem maken, daar den steel ingelaten werd, en zig daar in drie groote zenuwen verdeelen, nevens andere dwers-ribben en adertjes, die 't blad ruyg maken.

Het bloeyzel hangt aan wyd uytgespreyde troffen, 't welk zyn bloemen van een zeldzaam fatzoen, want zy zyn gemaakt van 10. smalle goud-geele blaadjes, als een Sterre uytgebreyd, daar binnen staan nog eenige andere blaadjes in krulletjes, verbaeldende een goude oor-vercierfel, dat de Vrouwen in de ooren dragen. De vrucht is in de grootte van een krieke, taay van substantie, en in haar vyf vlerken leggen zo veel dunne langachtige, en wat kromme zaden, en de boeken zyn van buyten aan de kanten scherp, zy zyn ryp in October en November, en bloeyen in 't eynd van de regen-Mousson. De vruchten zyn vyfhoekig, als *Catti Marus*, en als uyt vyf vlerken ofte buydekens gemaakt, rookverwig, en ligt.

Het hout is 't weekste, lichtste, en ondeugenste onder alle houten, hoewel 't grofdradig en dik is; by wast aan de randen van 't Wout, over al, zo in de vlakke als op 't gebergte, doch meest op zandige magere plaatzen.

Het grootbladige is 't voorgaande aan gedaante meest gelyk, doch de stam wert boger; de bladeren zyn doorgaans een span lang, 5. en 6. duymen breed, op dezelfde manier zynze gezaagt en geaderd, maar veel ruyger, niet alleen zandig, maar ook met stekelige bayrtjes bezet, inzonderheid aan de steelen en takken, zo dat ze moeyelyk in 't aantasten zyn, en eenig jeuken veroorzaken. De vruchten zyn van het zelfde fatzoen, als de vorige, dog langwerpiger, een lid van een vinger lang, 't hout is nog witter, weker, en broffer als aan 't vorige, gansch niet durabel.

Beyde bomen hebben een effene witte bast, waar door ze onder andere bomen kennelyk zyn, die taay is gelyk aan den *Londt-boom*.

Naam. In 't Latyn *Perticaria tertia*, of *sparre-boom*, de derde in order en deugt; de gemene man noemt 't in 't Maleys *Caju Totarra*, gelyk de vorige, maar de eygentlyke naam is in 't Amboinsch *Hunut*.

Gebruik. Het kleinbladige geeft gemene sparren, maar aan werken die lang duren zullen, word het zelden of niet gebruykt, het grootbladige deugt gansch niet tot eenig timmerwerk, behalven tot brandhout.

*De Hondert en twintigste Plaat*Vertoont een Tak van de *Stange-Boom*.