

Werk

Titel: Herbarium Amboinense, plurimas conpleteens arbores, frutices, herbas, plantas ter...

Jahr: 1743

Kollektion: Zoologica

Werk Id: PPN369546733

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369546733|LOG_0274

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369546733>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

CAPUT QUINQUAGESIMUM
SEPTIMUM.*Ichthyocionos Litorea. Aytuy.*

Binas has subsequentes arbores *Ichthyocionos*, seu piscium necatrices voce, quum ab incolis in illum finem adhibeantur, quarum prima hoc in capite descripta litora, altera subsequens montes amat.

Ichthyocionos litorea, mediocris est arbor, arbori *Excæcanti* similis, vel paulo humilior, truncum gerens gracilem, qui nunc solitarius, nunc geminus excrecitur, comam gerens densam, quum rami ex plurimis longis flagellis constent, quibus folia per longos ordines insident alternata, quæ longiuscula sunt & angusta, ad oras subtiliter, sed non profunde, ferrata, quatuor & quinque pollices longa, unum cum dimidio lata, tenuibus ac vix notabilibus venulis pertexta, crassiuscula, glabra, glauca, ac plerumque antrorum inflexa seu sinuosa.

Ex horum alis longi progerminant juli, uti in *arbore Excæcente*, sed qui longiores sunt. Hisce flosculi insident pusilli, mucosi, ex viridi flavescentes, quorum quis ex tribus brevibus constat staminulis: Hosce insequuntur fructus rari, qui parvi sunt globuli, paulo maiores globulo sclopeti minoris, ex cinereo & viridi variegati, ac tandem terrestris coloris seu nigricantes, duri, lignosi, acsi fructus cuiusdam ossicula essent. Externe sex sulcis notati sunt, qui in durum apicem concurrunt, tres vero horum sulci profundiores sunt, ita ut totus fructus in tria segmenta dividi possit, quæ sicca sibi adcumbunt sine ulla medulla, ac nihilominus tamen sibi adhaerent, in quovis autem segmento nucleus reconditur *Pistachia* similis in cellula quadam, qui interne ex cincere & fusco colore variegatus est.

Arboris cortex ex viridi nigricat, paucumque spissum exsudat lac, si vulneretur, vel si folia abrumptur. Lignum penitus albicit, leve est, molle, & inutile tigno. Mayo & Junio floret. Ex quavis pilula seu fructu hinc progerminant arbusculæ, tertius enim nucleus plerumque emarcidus ac natus.

Nomen. Latine *Ichthyocionos Litorea*, h. e. litorea piscium necatrix. Amboinice in Hitoe *Aytohi*, *Aytuy*, & *Aypue*. Jure inter arboris *Excæcantis* species numerari posset, quæ supra libro tertio descripta est.

Locus. Raro obcurrit in Hitoe's regione, ac potissimum in litore, vel locis ipsi vicinis in planis silvis; crudi ejus fructus hinc inde in litus projecti inveniuntur, a nullo enim expetuntur animali.

Hæc arbor ad noxiæ quoque pertinet arbores latifolientes, quæ pernicioſas possident qualitates, unde & nullius est usus, excepto quod ejus fructus ad pisces enecandos adhibeantur, separant enim in flumine quodam locum parvum, ubi corbiculos quodam recentibus hisce fructibus inpletos & grosso modo contusos deponunt, aliis cineribus mixtos, quos in occlusos projiciunt locos, atque hos porro fustibus turbant & conmovent, donec aqua horum nucleorum spuma sit obducta, tum omnes pisces in illo loco occulti semi-mortui supernatant, qui innoxie tam comeduntur.

Lignum, licet sit leve & molle, durabile tamen est, nec cossos umquam generat, si modo siccum bene conservetur, forte aptius erit ad calceos ligneos seu *Tsjerippos*, illo arboris excæcantis, qua de re supra latius fuit actum, nuclei in fructibus occlusi instar *Canario-rum* dulcescunt, nec noxiæ videntur esse qualitatis, pueri enim maturos hosc aperiunt fructus, ipsorumque nucleos innoxie edunt.

Tabula Centesima Trigesima Octava

Ramum exhibet *Ichthyocionis litorea*, seu *Aytuy*.

LVII. HOOFDSTUK.

De Strandt Visch-dooder Boom.

Deze twee volgende bomen noem ik *Ichthyocionos*, of *Visch-dooders*, om dat ze de Inlanders daar toe gebruyken, waar van de eerste in dit Kapittel beschreven, de stranden, en de volgende de bergen bemind.

De strand-*Ichthyocionos* is een middelbare boom, den Arbor *Excæcans* gelyk, of wel zo laag, en rank van stam, die somtyds enkeld, somtyds dubbel is, en met een digte kruyn, want de takken zyn bekled met vele lange gerten, waar aan de bladeren in lange ryen verwijld tegen malkander staan, dewelke zyn langagtig en smal, aan de kanten fyn, doch niet diep gezaagt, 4. en 5. duymen lang, 1½ breed, met fyne en pas kennelyke adertjes doortogen, dikagtig, glad, zee-groen, en meest alle wat voorwaarts gekromt.

Uyt den schoot der zelven komen lange kattekens voort, gelyk aan den Arbor *Excæcans*, doch langer. Aan dezelve staat zeer kleen bloeyzel, zynde moschagtige bloempjes, geel-groen, en yder van 3. korte draadjes gemaakt, na dezelve wassen enige weinige vruchten, zynde ronde bollekens, wat grooter dan de *Musquets*-kogels, uit den grauwen en groenen gemengt, ten laatsten aardverwig of swartachtig, hard, boutachtig, of het een korl van een vrucht was. Van buyten zyn ze met 6. voren getekend, die in een kort spitsje zamen lopen, maar 3. derzelver gaan door, zo dat de geheele vrucht zig in drien laat deelen, welke stukken droog tegen malkander staan, zonder eenig merg daar tuschen, en niet te min aan malkanderen vastbouden, in ieder stuk leyd een korl, als een *Pistacie*, in een celletje, uyt den grauwen vaal, het binnenste vervullende.

De schorisse is uyt den groenen vuyl en swartachtig, weinig dikke melk wtgewende, als men ze quetst, of als men de bladeren afhaakt: 't bout is geheel wit, ligt, week, en ondeugt tot timmeren. Hy bloeyd in Mayo en Juny. Uyt ieder vrucht of pille komen twee jonge boompjes voort, want de derde is gemeenlyk uitgedroogt en onnut.

Naam. In 't Latyn *Ichthyocionos litorea*, dat is, Strandt Visch-dooder. Amboinsch op Hitoe *Aytohi*, *Aytuy*, en *Aypue*. Men zoude hem met rede onder de zoorten van Arbor *Excæcans* mogen rekenen, boven in 't 3. Boek beschreven.

Plaats. Hy word weinig gevonden op 't land Hitoe, en waft meest op strand, of niet verre daar af in vlakke boschen; de raauwe vruchten ziet men bier en daar op strand verstrooit, want zy werden van geen beest genuttigd.

Dezen boom bevoerd onder de forgelyke melkbomen, die een schadelyke kragt hebben, en is dierhalven van geen gebruyk, bebalven de vruchten tot het Visch-doden, want zy besluyten een kleene plaats in eenige rivier met Serien of Horten, nemen dan enige korfjes vol van deze vruchten, die nog groen of melkagtig zyn, stoten dezelve grofelyk, vermengen met asch, en stroeyen in de beslotene plaatzen, daar in zy dan verders met stokken stampen en vroeten, tot dat het water met het sibuum van deze korls bedekt is, alle de Visschen die 'er in zyn, komen half dood boven dryven, en werden echter zonder schade genuttigd.

Het bout, boewel ligt en week, is nogtans durabel, en word nooit wormstekig, als 't maar droog gebouden word, misschien is het bequaamer tot houte trappen, of *Tsjerippos*, als dat van Arbor *Excæcans*, waar van boven gezegd is. De korls, die binnen in de vruchten stecken, zyn zoot als *Canaris*, en schbyn genen schadelykeheid in zig te hebben, want de kinders kloppen de rype vruchten open, en eeten de korls daar uyt.

De honderd acht- en dertigste Plaat

Vertoont een Tak van de Strandt Visch-dooder Boom, oft de *Aytuy*-Boom.