

Werk

Titel: Herbarium Amboinense, plurimas conpleteens arbores, frutices, herbas, plantas ter...

Jahr: 1743

Kollektion: Zoologica

Werk Id: PPN369546733

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369546733|LOG_0277

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369546733>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

CAPUT QUINQUAGESIMUM LIX. H O O F D S T U K,
NON U M.

Timonius. Timon.

Timonius est arbor campestris, quæ locum semper
occupat inter caricem in apertis planisque cam-
pis, & collibus. Plerumque cruris crassitatem,
& ad summum illam viri obtinet, nec copiosos gerit
ramos vel folia, quæ sibi sunt obposita & quodam-
modo cruciata, in ramulorum extrémo posita & quasi
conlecta, quatuor & quinque pollices longa, binos
digitos lata, paucis & obliquis admodum costis dona-
ta, ab utraque parte acuminata, in medio latissima,
vulgaris formæ, seu Laurinis foliis quodammodo si-
milia, sed angustiora & acutiora.

Flores plures simul in racemulo configuntur, qui sunt flosculi oblongi fordiste albicantes, terni simul juncti, horum medius brevissimo insidet pedunculo, & crassissimus est. Fructus rotundae sunt baccæ, paulo minores illis Oxyacanthæ, ac simili coronula ornatae, suntque porro duriusculæ, pallide virentes, dein ex flavo nigricantes, intus repletæ sunt tenuibus, oblongis, & fordiste flavescensibus staminibus, quodammodo Papaveris odorem spirantibus.

Trunci cortex fungosus est, crassus, fissus, & siccus, multis in locis nigricans, acsi adustus eslet, siccus, & insipidus. Lignum est album, ac recens, satis grave, sique erigatur, copiosa ex illo extillat lympha, quæ etiam exfluit, si incidatur, siccum vero satis durabile est, si sit vetustorum truncorum.

Nomen. Latine Timonius. Nullum gerit nōmēn Malaiicense, excepto quod quidam hanc arborem vōcent *Poele Batoe* seu *Caju Belo*, nullo autem modo convēnit cum *Poele*, & vera *Caju Belo* longe alia est arbor. Amboinice *Timon* & *Aytimon* vocatur ob nigrum corticis colōrem, qualis in *Melopeponē* quodam etiam observatur. In Loehoea *Kenay* dicitur.

Locus. Crescit, ut dictum est, in apertis campis & in ventosis collibus, inter caricem ubique in Amboinensium insulis.

boinenium intulis.
Uſus. Ejus longi & recti rami paliſ inserviunt, in aqua enim marina durabiliores ſunt quam in terra, ad ædium teſta & trabes adhiberi quoque poſſunt, ſi cræſſi ipſius eligantur trunci, ſed plebeis tantum in ædibus: Trunci cortex ab exterioribus ſordibus de- puratus, loco Pinangæ maſticari potheſt cum Siri & calce, ſed magis amaricat: Sturni aliique aves ejus fructus expetunt: Quidam incolæ ejus effodiunt radices, ſecumque ducunt in itineribus marinis, in quibus multum frigoris aliaque incommoda patiuntur, ſi que non bene valeant, ſentiantque febriles horripulationes, pedumque dolores, hanc maſticant radicem cum pauxillo Caryophyllorum, Nuciſ Moſchatae, & Zingiberis, qua pasta corpus ſimil inliniunt.

Tabula Centesima & Quadragesima

Ramum exhibet Timonii.

LIX. H O O F D S T U K.

De Timon-Boom.

Timon is een veldboom, die plaats altyd onder 't sny-
gras, op opene vlakke velden, en beuvels hebben
wil. Hy is in 't gemeen een dye, en op 't boogft
een man dik, niet ryk van takken, nog loof. De blad-
ren staan tegen malkanderen, eenigzints in 't kruys, dog
by malkanderen aan 't voorste der ryskens 4. en 5. duy-
men lang, 2. vingers breed, met weinige zeer schijnze
ribben, agter en voren toege spitst, in 't midden breedst,
van een gemeen fatzoen, of de Laurier-bladeren wat ge-
lykende, doch smalder en spitser.

Het bloeyzel komt voort veele by malkander aan een trosje, zynde vuyl-witte langhalzige bloempjes, of knoppen, staan altyt 3. by malkanderen, doch 't middelste heeft het kortste voetje, en werd het dikste. De vruchten zyn ronde besien, wat kleender dan die van Hagedoorn, met diergelyke kroontjes boven op, hardachtig, bleek-groen, daar na uyt den geelen rookverwig, binnen zynze uitgevuld met dunne, langwerpige, en vuylgeele zaden, eenigzints riekende na Papaver.

De schorisse des stams is voos, dik, gescheurt, en droog, op veele plaatzen swart, als ofze gebrand was, zappig, onsmakelyk. 't Hout is wit, versch zynde redelykswaar, en als men 't over eynd zet, veel water uytgevende, 't welk het ook doet, als men daar in kapt, dog droog zynde, redelyk durabel, als het van oude stammen is.

Naam. In 't Latyn Timonius, in 't Maleyts is 't zonder naam, bebalven dat het sommige Poele Batoe, of Caju Belo noemen, doch 't heeft geen gemeenschap met 't Poele, en 't eygentlyke Caju Belo is een andere boom, in 't Amboinsch Timon en Aytimou, ^{in de savarre} schorisse, als aan een water-Meloen. Op Loeboe Kenay.

Plaats. Hy wacht, als gezegd, in opene velden, en op luchtige heuvels, in 't Sny-gras overal, in de Amboinsche Eylanden.

Gebruik. Zyne lange en regte takken zyn gebruykelyk tot palen of Belos aan de Zerien, want zy in zout water durabelder zyn dan op 't land, men kan 't ook in den buysboww tot balkjes in 't dakwerk gebruyken, als men dikke stammen aantreft, en dat alleen aan slegte buyzen. De schorste des stams van de buytenste ruygte gezuyvert, kan men in plaats van Pinang eeten, tot Siri en kalk, boewelze wat bitterachtig is. De Spreeuwen en andere Vogels eeten de vruchten geern; zommige Inlanders graven de wortelen uyt, en voeren die by bun op Zee-reyzen, daar men koude en ongemak moet uitstaan, wanneerze bun dan qualyk gevoelen, als Koortsige buyvering, en steekten in de beenen, zo knauwenze deze wortel met een weinig Nagelen, Nooten, en Gember, en besmeeren bun daar mede.

De honderd en veertigste Plaat

Vertoont een Tak van de *Timon*-Boom.







