

Werk

Titel: Herbarium Amboinense, plurimas conplectens arbores, frutices, herbas, plantas ter...

Jahr: 1750

Kollektion: Zoologica

Werk Id: PPN369547365

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN369547365> | LOG_0114

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369547365>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

CAPUT SECUNDUM.

Angræcum album duplex. Angrec poeti.

Secunda & tertia Angræci species est alba major & minor, utræque a præcedenti quoad flores maxime differentes.

Primo. *Angræcum album majus*, convolvulacea fere planta est, primo enim multis & longis radicibus sese circumvolvitur circa arborum truncos, tanquam chordulæ essent, quæ exterius fordide albescent, interne virent & lento nervo gaudent, sub planta intricatam formantes congeriem, quæ aliquando laxè dependet, & tam incompta est quam in ulla planta, folia fasciculata tria quatuorve simul proveniunt sine burris, excepto quod inferior caulis parum ventricosus sit & striatus.

Exterius seu maximum folium duodecim ac sexdecim pollices longum est, tres quatuorve digitos latum, crassum, ac firmum, ac fere nervis destitutum, excepto quod in medio fulcatum sit, superius rotundè desinens, siquæ adcurate attendatur, superior apex semper bifidus est, cuius unus angulus longior est, qui character est cunctorum Angræcorum, sed in prima specie non adeo notabilis quam in cunctis subsequentibus, ubi clarior est. Ex intricata radicum congerie juxta folia peculiaris excrescit caulis, obscure fuscis lineis notatus, crassitie pennæ, rotundus, lignosus, ac foliis destitutus, superius in quosdam laterales ramulos sese dividens, qui in amplos articulos distincti sunt, & in quorum summa parte flores progerminant, multo rariores numero, & majores quam in prima specie, peculiarem quoque habent formam, quæ difficilis descriptio & difficilior delineatio est, ac vicissim supra sese invicem locantur, quivis peculiari alba basi.

Compositus autem hic flos est ex quinque exterioribus petalis, flaccidis, & penitus albis, quorum bina lateralia maxima sunt, intra hæc altera conspicitur congeries trium minorum petalorum itidem alborum, formam habentes cochleæ seu calceoli, bina enim interiora convoluta sunt in circulo.

Supremum petalum paulo magis sese elevat, & ad oras binas longas gerit barbas instar mystacum inflexas. In centro hujus circuli alterum crassum adparet petalum, quod pistillum est bifidum, ex luteo & purpureo colore distinctum, sic quoque circulus iste non directe in centro locatur floris, sed ad unam inclinat partem, in ipso autem floris centro album locatur germen, ex quo circulus oritur, in illo bina flava inveniuntur grana semen mentientia.

Lutea ista granula per album istud germen transparent & binos referunt oculos, ac caput repræsentant, Cicadæ, flos porro inodorus est.

Fructus est ex rotundo striata filiqua, ultra tres pollices longa, ac digitum crassa, sex protuberantibus costis donata, in quibusdam vero plantis hi fructus magis trigoni sunt quam hexagoni, & in tres quoque dehiscunt partes, quarum quævis pollicem lata est, prope apicem connexa. Interna farina pallide flava est, & decidit, sed filamentis lateralibus adhærent granula quædam alba, quæ si comprimantur, lympham emittunt. Octobri ac subsequentibus conspiciuntur mensibus.

Hæc species varietatem quandam habet, cuius flos eandem quidem habet formam, interne albus, sed externe ex læte purpureo colore splendens. Altera etiam ejus est varietas, cuius flos quinque extensa gerit petala, quorum bina lateralia latissima sunt, alba penitus, excepto quod internum germen sit luteum.

Nomen. Latine *Angræcum album majus*; Malaice *Angrec poeti bésaar*, & *Bombo terbang*; Belgice *Vliegende Duive*; Baleice *Angrec colan*, h. e. *Mas*, quum præcedens femina habetur, Amboinensibus nullum huc usque obtinuit nomen, sed in Lœhœa vocatur *Wanlecu*.

Locus. In crassis itidem sed curtis crescit arboribus, quæ musco obductæ sunt, uti in Kinar & Mangis, quas tanquam funis adscendit, & e quibus intricate dependit. Nullus ejus huc usque innotuit usus.

Secundo. *Angræcum album minus* caules quoque gerit quatuor & quinque pedes longos, quorum multi ex una oriuntur radice, quæ muscosa est, & tanquam emplastrum vetustis incumbit arboribus, multisque fibrillis circa eas necitur.

Cau-

TWEEDE HOOFDSTUK.

Het dubbelvoudige witte Angrek.

De tweede en derde zoorte van Angrec zyn de witte; bestaande in groot en klein; beide van 't voorgaande in bloemen merkelyk verscbillende.

I. *Angræcum album majus* is schier het zelfde ge- was, want het slingert vooreerst met veele en lange wortelen, als chordelen rondom de stammen der bomen, buiten vuil-wit; binnen groen, met een taaje zenuwe, onder de planten een verwerden klomp makende, die zomtyds los hangt, en zoo wild als ik aan geen andere plante gezien heb, de bladeren komen ook drie en vier in bosjes by malkander, zonder beurzen, bebalven den ondersten steel, die wat buikagtig, en gestreept is.

Het buitenste of grootste blad is twaalf en sestiën duimen lang, drie en vier vingeren breed, mede dik, en styf, schier zonder zenuwen, bebalven in de middengegeut, van vooren lopen ze rond toe, en als men 'er nauw op let, zoo is de voorste spits altyd in tweeën gekloven, waar van de eene boek langer is, een kenteeken van alles Angreks. Aan de eerste zoorte zoo kennelyk niet, maar aan alle de volgende klaar te zien, uit den verwerden klomp der wortelen bezijden de bladeren komt ook een byzonderen steel op, met donkerbruine linien gespikkelt, in de dikte van een schaft, rond, boutagtig, en mede ongeblad, die zig boven in eenige zydetakken verdeelt, alle met wyde leden, aan wiens uiterste de bloemen voortkomen, veel weiniger in 't getal, en grooter dan aan de eerste zoorte, zy hebben ook een vreemd fatzoen, dat moeilyk te beschryven, en nog moeilyker af te teekenen is, zy staan egter met beurten boven malkander, ieder op een byzondere witte voet.

De bloem is gemaakt van vyf uitwendige bladeren, slap, en spier-wit, waar van de twee ter zyden de grootste zyn, binnen deze ziet men een andere vergadering van drie mede witte blaadjes, de gedaante van een Zeeboorn, of van een Schoenke eenigzints uitmakende, want de twee onderste zyn t'zamen gebogen in een cirkel.

Het bovenste blaadje verbeest zig wat meer, en heeft aan zyn eynden twee lange baarden, die gekruld staan als knevels. In de midden van deze cirkel ziet men een ander dik blaadje, als een pilaartje zig in twee hoofdekens verdelende, met geel en purper geschildert, zoo staat ook den cirkel niet regt in de midden van de bloem, maar belt na de eene zyde, regt in de midden van de bloem staat een wit beuvelke, waar uit den cirkel ontspringt, in 't zelve vindt men twee geele korrels, als of het zaad wilde zyn.

Deze geele korrels schynen door dat witte beuvelke als twee ogen, en verbeelden het hoofd van een Sprinkbaan, voorts is ze zonder reuk.

De vrugt is een uit den ronden gestreepte bouwven, ruim drie duimen lang, en een vinger dik, met ses uitsteekende ribben, dog aan zommige werden deze vrugten meer driekantig, dan seskantig, en splyten ook in drie deelen open, ieder een duim breed, by de spits aan malkanderen hangende. Het binnenste meel is bleek-geel, en valt daar uit, maar aan de zydedraden blyven eenige witte korrels hangen, en als men ze drukt, komt 'er water uit. Men vindt ze in October en de volgende maanden.

Deze zoorte heeft nog een verandering, daar de bloem wel van dezelve fatzoen is, binnen wit, maar buiten met een ligten purper schynende. Item nog een ander verandering, waar aan de bloem uit vyf uitgespreide blaadjes bestaat, waar van de twee aan de zyde zeer breed zyn, allegaar wit, bebalven dat het binnenste beuvelke geel is.

Naam. In 't Latyn *Angræcum album majus*; in 't Maleits *Angrec Poeti bésaar*; en *Bombo terbang*; in 't Duits vliegende Duive; in 't Baleits *Angrec colan*; dat is het manneken; om dat ze het voor 't wyfken houden, by de Amboinesen heeft het nog geen naam, maar op Loehoe het *Wanlecu*.

Plaats. Het wast mede op dikke dog korte bomen, en die mosagtig zyn, gelyk aan Kinar en Mangas-bomen, daar het als een zeel op loopt, en zeer verwert, geen gebruik hier van is tot nog toe bekend.

II. *Angræcum album minus* heeft ook steelen, vier en vyf voeten lang, waar van veele uit eene wortel staan, derwelke mosagtig is, en als een pleister tegens de oude bomen aanzit, en met veele vazeligen daarom slingert.

N 2

Ders

Caulis subtus multifidus est, primo enim est frustulum binos pollices longum, pennam crassum, dein venter subsequitur, tres, quatuorve pollices longus, ac digitum crassus, octo dorso longitudinalibus striatus, & transversaliter binis tribusve articulis, ubi hic venter semper tenuior est, externe fuscus. Caulis denuo gracilefcit ac rotundus est, ac tot pollices longus, folia dein subsequuntur alternata, seu vicissim ordine sibi obposita, sine alis, crassissima & firma, quatuor pollices longa, sesqui lata, superne parum bifida, in medio obscurum gerentia sulcum, superiora autem dimidio minora sunt, saporis aciduli.

Reliqua caulis pars ad binorum pedum longitudinem nuda est, & in obscuros articulos distincta, atque in vertice binos tresve alios gerit cauliculos, quorum quivis binos tresve profert flores, multo minores quam in præcedenti, primo penitus albos, sed qui dein flavescent, ex quinque constantes petalis, quorum quatuor ad dimidium extensa sunt, quintum ad obpositam locatur partem, ac cassidem format, quæ binas gerit lamellas introrsum flexas instar calicis, superiores oræ fimbriatæ sunt, & extrorsum flexæ, externe flos albet, interne paucis purpureis lineis distinctus, ac loco germinis dorsum medium protuberat, quod luteum & mucosum est. Cuncta quinque petala inferius concurrunt, & acutum formant faccum instar florum Delphinii, ita ut petiolus ad latus inmittatur. Odor debilis est.

Fructus digiti articulum longus est, & pennam crassus, trigonus, ac quodvis latus tres gerit costas, interne repletus medulla lutea instar prioris. Ex radice variæ excrescunt bursulæ striatæ uti in præcedente, tempore caules emittentes. In vetustis & putridis crescit arboribus, quæ in ventosis collibus locatæ sunt, & deciduæ circa silvas *Caju peti*.

Non directe arborum ramis insidet, sed ad latera adglutinata quasi est hæc planta, & caulibus quinque vel sex pollices longis, transversaliter ex arbore ad dimidium dependit, radix aliam parasytam profert plantam, quæ quosdam præcedentis villos investit, formam gerens corniculati vermis vel erucæ, herbae, fragilis, & fatui saporis instar Polypodii. Primo progerminantes caules aliquando convoluti sunt, & quasi duplicati, apices deorsum flexos gerentes.

Nomen. Latine *Angræcum album minus*; Malaice *Angrec poti kitsjil*, & *Angrec Cassian*, h. e. *Angrec pauperum*, ob vilem ejus formam, quod nomen majori etiam datur. Belgice *Beursjens angrec*, h. e. *Angrec bursale* vocari possit ob floris formam.

Locus. In arboribus silvestribus quoque crescit instar majoris, sed non tam copiosum est, in vetustis putridis & deciduis itidem reperitur arboribus, sed utraque species haud facile transplantari possunt, quum radices nimis duræ, ac nimis ample dispersæ sint.

Hæc minor species aliam porro habet varietatem, cum *Daun sebat* mixtam habens formam. Tenuem enim gerit procumbentem caulem, deorsum ex nodis quædam fila demittentem, quibus sese figit, ac sursum alios quosdam emittit caules non ventricosos, & ad aliquam partem nudos, dein ex iis proveniunt quatuor, quinque, vel sex crassa firmaque foliola, paulo minora supra descriptis, caulis ad pedis longitudinem porro procedit culmi crassitie ad verticem, quum unum alterumve profert florem, præcedenti similem, ac quodammodo odoratum.

Tabula Quadragesima tertia

Angræcum exhibet album majus.

Tabula Quadragesima quarta

Ad Figuram primam *Angræcum* exhibet album minus, quod est Pennangu Maravara *H. Malab. part. 12. Tab. 3.* Figura secunda *Angræcum* denotat rubrum sequenti Capite descriptum.

De steel is van onderen op verscheide maal gedeelt, eerstelyk een stukje van twee duimen lang, een schaft dik, daar na volgt een buik, drie en vier duimen lang, een vinger dik, met agt ruggen in de lengte gestreept, en over davers met drie of twee leden, daar dezen buik telkens wat dunder is, van buiten bruinagtig. Dan werd den steel weder dun, en rond, ook zoo veel duimen lang, daar op volgen de bladeren, verwisselt in ryen tegen malkanderen, en zonder steelen, zeer dik en styf, en vier duimen lang, anderhalve breed, aan het bovenste spitsje een weinig gekloven, en een donkere geut in de midden, dog de bovenste zyn de helft kleinder, van smaak zuuragtig.

De resterende steel van twee voet lang, is kaal, en in donkere leden verdeeld, en op zyn top in twee of drie andere steeltjes, waar van ieder maar twee of drie bloemen draagt, die veel kleinder zyn dan aan 't voorgaande, in 't eerste gants wit, daar na werden ze geelagtig, gemaakt van vyf blaadjes, waar van de vier aan de eene helft uitgebreid staan, het vyfde staat aan de andere zyde, en formeert het belmken, hebbende twee lappen, die inwaarts gebogen zyn als een kelkje, zyn bovenste kanten zyn gefronst, en uitwaarts gebogen. Van buiten is het ook wit, binnen met weinige purpere linien, en in plaats van 't pilaartje built de middelrugge uit, die geel en smeerig is. Alle vyf loopen ze beneden te zamen, en maken een spits zakken gelyk riddersporen, zoo dat den steel ter zyden werd ingelaten, De reuk is slap.

De vrugt is een lid van een vinger lang, en een schaft dik, driesydig, en ieder zyde heeft drie ribben, van binnen uitgevuld met een geel merg, gelyk de voorgaande. Uit de wortel komen nog verscheide kleine beursjes, gestreept als vooren, en met 'er tyd bunne steelen voortbrengende. Het waft op oude en verrotte bomen, die op lugtige heuvelen staan, en omgevallen zyn, omtrent de bossen van *Caju peti*.

Het zit niet regt op de takken van de bomen, maar als ter zyden aangeplakt, en met zyn steelen, die vyf en ses duimen lang zyn, davers uit den boom, en half afhangende, de wortel heeft nog een vreemd bygewas, 't welk zommige lokken van dezelve bekleet, in de gedaante van een geboornde Worm, of Ruspe, kruidagtig, bros, lach van smaak als *Polypodium*. De eerste uitkomende steelen zyn zomtyds zamen gevouwen als dubbelt, met de spits neerwaarts gebogen.

Naam. In 't Latyn *Angræcum album minus*; in 't Maleits *Angrec poti kitsjil*; en *Angrec cassian*; dat is, Arm angrek, wegens zyne slegte gedaante, welke naam de groote zoorte ook gegeven wert. Men zoude het in 't Duits *Beursjes angrec* mogen noemen, na de gedaante van de bloem.

Plaats. Het waft mede op wilde bomen, gelyk het groote, dog werd zoo veel niet gevonden, men vindt het ook op oude verrotte en omgevallene bomen, maar geen van beiden laat zig wel verplanten, om dat de wortelen te hard, en te verre uit gespreid zyn.

Deze kleine zoorte heeft nog een verandering, makende met *Daun sebat* een gemengde fatzoen. Want het heeft een dunne liggende steel neerwaarts, uit de leden eenige draaden zendende, daar mede het zig vast maakt, en opwaarts verscheide andere steelen zonder buiken, een stukweegs bloot, daar na vier vyf of ses dikke styve blaadjes, wat kleinder dan boven beschreven, den steel loopt nog een voet lang, in de dikte van een stroobalm, op zyn top voort, brengende een of twee bloemen, de voorgaande gelyk, en eenigzints welriekende.

De drie en Veertigste Plaat

Vertoont het groote witte *Angrek*.

De vier en Veertigste Plaat

Vertoont in de eerste Figuur het kleine witte *Angrek*, het welk is de Pennangu Maravara van de *H. Malab. 12. deel Tab. 3.* De tweede Figuur wyft aan het roode *Angrek*, in het volgende Hoofdstuk beschreeven.





