

Werk

Titel: Herbarium Amboinense, plurimas conplectens arbores, frutices, herbas, plantas ter

Jahr: 1750

Kollektion: Zoologica

Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Werk Id: PPN369547365

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN369547365>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369547365>

LOG Id: LOG_0216

LOG Titel: Caput Sextum. Foenum marinum. - Sesde Hoofdstuk. Het Zee-hooi

LOG Typ: chapter

Übergeordnetes Werk

Werk Id: PPN369544501

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN369544501>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=369544501>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

CAPUT SEXTUM.

SESDE HOOFDSTUK.

*Fœnum marinum.**Het Zee-booi.*

Quinta species est cinereus & lignosus ac fragilis frutex, sesqui pedem altus, paucos incurvos & irregulares gerens ramos, plerumque ad unam inclinantes partem, prout a fluxu formantur.

Foliola habet longa ac tenuia, fragmenta florum referentia, vel instar foliolorum arboris Casuarinæ, cum Equifeto convenientia, fasciculata instar fetorum, vel sicci Fœni, ad tactum rugosa, acsi ex multis lamellis composita essent, si vero flectantur, franguntur.

Rami rugosi quoque sunt, obtusos gerentes apices abruptorum ramorum, coloris terre, substantiæ levisimæ & fragilis. Si recens ex mari sit protracta hæc planta, multo mucosius obducta est, qui in cute pruritus levis seu ardorem causat fere instar Algæ marinæ.

Peliosa sese figit radice in saxi fragilibus, in quibus nil solidi est.

Foliola peculiariter examinata magnam habent similitudinem cum tenuibus fetis cujusdam speciei Pomi marini, Bœlu babi dicti, h. e. fetum porcinum, quod ex similibus quoque curtis articulis compositum & rugosum est, sed si alicujus cutim tangant hæc seta, abruptantur, & magnum causant dolorem, qui ictibus depellendus est.

Nomen. Latine *Fœnum marinum*, & *Equisetum marinum*; Malaice *Accarbaar rompot*, h. e. *Accarbaar gramineum* seu *fœnaceum*. Quidam id quoque vocant *Daun casuari laut*, h. e. *Arbor marina casuarina*, ob similitudinem veræ arboris Casuarinæ.

Locus. Raro reperitur, potissimum vero in sinu Amboinensi, neque in aliquem usum adhibetur, nisi quod elegantissimæ arbusculæ, densam gerentes comam, aliquando pro raritate ferventur. Aliquamdiu pluvis & soli exponuntur, dein per arenam & aquam trahendæ sunt, ut mucus ardens separetur. Putoque ex ardente ipsarum natura, interne adsumptas noxias esse.

In Boreali Ceramæ plaga in freto ad orchiam aquarum multæ simul crescunt hæ arbusculæ, ad unius alteriusve spithamæ altitudinem, in multos nodosos ramulos sese dividentes, qui spinulosi sunt ob ramulos deciduos, sed superius hi terminantur in subtiles pilos, coloris plerumque flavescentis.

Tabula Octuagesima

Ad Figuram primam exhibet *Flabellum marinum Aruense*, sub finem capituli quarti descriptum, estque Keratophyton majus nigrum fibris tenuioribus elegantissime & densissime reticulatum, *Boerb. Ind. H. L. B. pag. 6.* & *Planta retiformis Besleri Tab. 24.*

Figura secunda *Cupressum fistit marinam*.

Figura tertia *Fœnum* denotat *marinum*, seu *Casuarinam*, & *Equisetum marinum*.

De vyfde zoorte is een grauwe, boutagtige, en brosse beester, anderbalwe voeten hoog, met weinige kromme en onordentelyke takken, gemeenelyk na eene zyde bellende, zoo als deze stroom leid.

Het heeft lange dunne blaadjes, als stukken vangaren, of gelyk de bladeren van de Kasuaris-boom, met het Equifet over een komende. In bosjes by malkander staande, als bosjes droog booi, in 't aantasten ruig, als of ze van veele kleine schilfertjes t'zamen gezet waren, dog als men ze buigt breekende.

De takken zyn ook ruig, vol stompen van afgebrookene takken, aardagtig van couleur, zeer ligt van substantie, en breekzaam. Vers uit Zee komende, is het met veel slym behangen, de welke op de huid een klein jeuken of brand veroorzaakt, schier als Zeekwabben.

Het bevestigt met een buidagtige wortel, op brokkelige steenen, daar aan men niets massiefs vinden kan.

De blaadjes in 't byzonder bekeken, hebben groote gelykenisse met de fyne borstels van zekeren slag Zeeappel, Boelubabi, dat is Varkensborstels genaamt, dewelke ook van diergelyke korte leden gemaakt, en ruig zyn, maariemand in de huid steekende kort afbreken, en grooten pyn veroorzaken, die men met kloppen verdryven moet.

Naam. In 't Latyn *Fœnum marinum*, en *Equisetum marinum*; in 't Maleits *Accarbaar rompot*, dat is gras of hooiagtig *Accarbaar*. Zommige noemen 't ook *Daun casuari laut*, dat is Zee-casuarisboom, na de gelykenis van den regten Casuarisboom.

Plaats. Het werd wenig gevonden, meest in den Amboinschen inham, zoo werd het ook tot niets gebruikt, behalven dat de mooiste boompjes, die dicht van loof zyn, zomtyds tot raaiten bewaard worden. Men moet ze een goeden tyd in regen en zonne leggen, daar na door zand en water trekken, om den brandigen slym af te schuuren. Ik oordeel uit zyn brandigen aart, dat het binnes lyfs gebruikt, schadelijk zoude zyn.

Op de Noord-kust van Ceram, op de reyen van omtrent een vadem waters, groejen veele struikjes dicht by malkander, omtrent een of twee spannen hoog, en zig in veele geknopte takjes verdeelende, dewelke steekelig zyn wegens de afgevalle takjes, maar boven eindigen ze in fyne haartjes, en breeken niet ligt, van couleur doorgaans bleek-geel.

De Tagtigste Plaat

Vertoont in de eerste Figuur de Arueese Zeevajer, aan het einde van het vierde Hoofdstuk beschreeven, en is de grooter, zwarte Keratophyton, met dunder vezels, zeer net en dik als een net gevlogten, van *Boerb. Index H. L. Bat. pag. 6.* en de netsgewyze Plant van *Besleri Tab. 24.*

De tweede Figuur vertoont de Zee-Cupres. De derde Figuur betekent het Zee-booi, ofte de Zee Casuarina, en Zee Paarde-staart.






Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 2.

