

Werk

Titel: Erucarum ortus, alimentum et paradoxa metamorphosis
Autor: Merian, Maria Sibylla
Verlag: Oosterwyk
Ort: Amstelædami
Jahr: 1717
Kollektion: Zoologica
Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Werk Id: PPN476830389
PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN476830389>
OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=476830389>

LOG Id: LOG_0009
LOG Titel: II. Tulipa purpurea
LOG Typ: chapter

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

I. *Morus cum fructu.*

Titulare folium contextam frondiferis è mori ramis floribusque ac fructibus conspicuis, lauream repræsentat, cuius foliis proprio tanquam pabulo bombyces aluntur; hi vermes ex ovulis per hyemis cursum à curiosioribus sedulò conservatis prodeunt, tempore verno per solis calorem excluduntur, extunc illis mori folia in alimentum exhibentur, sollicitè cavendo, ne vel minimū sint humida, eos aliàs necatura. Octo circiter aut decem dierum, cineritio obscuro, cutis: (quod ter quaterve accidere solet:) brevi mutandæ prognostico, colore imbuuntur: color eorum in totum ferè albicans est, ast ubi totaliter acreverunt, clarescunt, ac quodammodo pellucidi fiunt, incessanter huc illuc capite nutantes ex ore Sericum texere incipiunt, amatores itaque hæc signa conspicientes cucullo illos imponere consverunt, unde sibimet ipsis ovalis figuræ carcerem parant; hacce texturæ albicante, albi quoque exstiterunt vermium pediculi, flavi verò fuere, si flavo tincta colore textura fuerit, hoc peracto vermis in aureliam transmutatur, hæc ei figura viginti dierum spatio inmanet inde verò phalæna albicans propullulat, quæ pelliculam hanc perrodit, & ab eâ se se extricat, fuscum quandam liquorem excernens, Ex utroque sexu constituitur hic vermis, masculus corporis, femella, tenuioris est, factò coitu in chartam, hunc in finem eis apposita ovula sua arctè collocant, ac ita novem decemve diebus sine escâ & sine potu vivunt, ac tandem intereunt. Ovula prius colore flava grani milii magnitudinem æquantia, paulò post cineritio colore tinguntur, ac ita in vernum usque tempus, uti superius asseruimus, conservantur.

II. *Tulipa purpurea.*

HÆcce tulipa, jaspis etiam marmorea audiens, insidentis sibi erucæ in mensis maii finem usque pabulum est, tuncque in aureliam cinereum commutatur elapsis autem diebus quindecim exit inde phalæna alis superioribus rubello, inferioribus

ribus unà cum corpore, cinereo colore tinctis instructa.

Subtus caule vermis latet, qui animalculis exilibus: (pediculi) dictis, tanquam pabulo vescitur, sub finem mensis maii in bullam convertitur, effluxis quatuordecim diebus inde, flavis nigrisque striis cum oculis rubicundis variegata, musca procedit.

III. *Sambucus Cærulea.*

VIrides erucas, folio inferiùs adhærenti, similes hac in arbore deprehendi, & ejusdem foliis enutrivi in diem usque mensis Maii duodecimam, ubi texturam albam conficienes in aureliam fuscam commutabantur, circa finem mensis è lucido fusca phalæna, qualis flori imposita cernitur, educebatur.

Hæcce flori insidens eruca viridis secundâ die Maii in aureliam fuscam defigurabatur, & vigesimâ septimâ Octobris inde fuscis albisque maculis aspersa phalæna prodiit, qualis in flore superiùs exhibetur.

IV. *Cerasus nigra dulcis florens.*

HOc genus vermium, Bruchus, à popularibus audiens, eò quod frumenti radicem depascantur, corpore constant albicanti, nudoque vermiculorum in caseo deprehensorum adinstar, capite flavo ochræ colore tincto; hos in mense Octobre minutissimos adhuc in terrâ reperi & in annum subsequentem reservavi, in mense Aprili eâ erant magnitudine, quam infra referunt, defigurantur in Scarabæos (Moolenaars) dictos, forma superiùs in folio quodam depicta cernitur, novos pomorum surculos hi depascuntur, quo circâ eos hac in arbore collocavi.

V. *Hyacinthus Orientalis.*

Pilosâ hæcce, nigricansque eruca, qualis infra delineatur, variis floribus ac herbis pascitur, celeriter incedit, tacta globuli adinstar in sece covolvitur, & aliquo temporis spatio immobilis jacet, debitam accretionem assecuta texturam conficit,