

Werk

Titel: Jo. Christ. Fabricii systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, g

Autor: Fabricius, Johann Christian

Verlag: Korte

Ort: Flensburgi

Kollektion: Zoologica

Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Werk Id: PPN578515547

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN578515547>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=578515547>

LOG Id: LOG_0006

LOG Titel: I. Elevterata.

LOG Typ: chapter

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de



SYSTEMA ENTOMOLOGIAE INSECTORVM.

I. ELEVTERATA

Os palpis quatuor aut sex.

Maxilla inferior nuda, libera.

1. LVCANVS. *Penicilli duo sub labio pal-*
pigeri.

Antennae pectinato fissiles.

1. L. maxillis exsertis: apice quadridentatis.

Alces.

Petiv. Gaz. ph. tab. 47. fig. 15.

Habitat in Asia.

Caput magnum atrum utrinque sinuatum, depresso
fronte retusa. Maxillae exsertae capite longiores,
apice compressae, quadridentatae et in medio in-
terno dente validissimo armatae.

Corpus L. Cervo majus, nigrum, glabrum. Thorax
utrinque bidentatus.

2. L. maxillis exsertis unidentatis apice bifurcatis, labio
deflexo ruga transversali elevata.

Lucanus Cervus scutellatus maxillis exsertis apice bifur-
catis latere unidentatis. *Linn. Syst. Nat. II. 559. I.*
Fn. Sv. 405.

A

Platy-

2 I. ELEVTERATA. Lucanus.

Platycerus fuscus cornibus dubbus mobilibus apice bifurcatis, latere unidentatis, intus ramo denticulisque instructus. *Geoff. Inf. 1. 61. 1.*

Scarabaeus maximus platyceros, Taurus nonnullis, aliis Cervus volans dictus. *Raj. Inf. 74. 2.*

Cervus volans. *Monff. Inf. 148.*

Scarabaeus Cervus. *Roeſ. Inf. 2.* *Scar. 1. tab. 4. 5.*

Taurus volans Olear. Mſc. tab. 16. fig. 5.

3. *Platycerus fuscus; elytris laevibus, capite laevi.*

Geoff. Inf. 1. 60. 2. *Foemina Roeſ. Inf. 2. tab. 5. fig. 8.*

Habitat in ligno quercino putrescente Europaē.

Foeminam multo minorē maxillis haud exsertis pro distincta specie assūmit Geoffroy.

Hanc speciem pro Cocco veterum habet Roeſell.

Cornua officinalia sunt maxillae maris.

Larva obesa albida capite pedibusque ferrugineis.

Elaphus. **3.** *L. maxillis exsertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo conico.*

Habitat in Virginia. *Muf. Brit. Simillimus L. Ceruo, at paulo minor.* Dens lateralis pone medium inseritus. Capitis margo posticus valde elevatus, emarginatus.

Capreolus. **4.** *L. maxillis exsertis apice tantum bifurcatis, labio ruga transversa elevata interrupto.*

Lucanus Capreolus scutellatus: maxillis exsertis apice tantum furcatis. *Linn. Syst. Nat. 11. 560. 2.* *Amoen. Ac. VI. 391. 4.* *M. L. V. 30.*

Habitat in America boreali. *Simillimus L. Cervo, at minor.* Dens maxillarum lateralis deest.

Dama. **5.** *L. maxillis exsertis intus bidentatis longitudine capitis.*
Habitat in Virginia.

Pro foemina L. Capreoli habet *Linn. Muf. L. V.* an recte? Corpus totum piceum. Maxillae arcuatae longitudine capitis apice integrae, in medio denticulis duobus armatae, postico minutissimo. Labium rotundatum. Pedes ferruginei.

*parallelo-
pedius.* **6.** *L. depresso maxillis dente laterali elevato.* *Linn.*
Syst. Nat. 11. 561. 6.

Platyceros niger elytris laevibus capitis puncto duplice prominente. *Geoff. Inf. 1. 62. 3.*

Scara-

I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

3

Scarabacus parallelepipedus *Pondoppidan.* *Atlas danic.*

i. 666. Tab. 29. fig. 1.

Schaeff. elem. tab. 101. fig. 1.

Habitat in Daniae, Germaniae, Galliae sylvis.

Alter sexus maxillis minoribus punctoque dupliciti
capitis prominente.

7. L. exscutellatus antennis arcuatis, corpore oblongo
depresso, vertice spina recumbente, thorace abdo-
mineque remotis. *Linn. Syst. Nat.* ii. 560. 4. M.
L. V. 33. *interrup-*
ptus.

Dermetes Brown. Iamaic. 429. tab. 44. fig. 7.

Petiv. G. zoph. tab. 27. fig. 7.

Habitat in America.

8. L. coerulescens maxillis lunatis, thorace marginato; *scaraboi-*
Linn. Syst. Nat. ii. 561. 7. *Fn. Sv.* 407. *des.*

Platycerus violaceo-coeruleus elytris laevibus *G. off.*
Inf. i. 63. 4.

Lucanus caraboides Scop. Carn. 2.

Carabus coerulescens Vddmann. Dif. 40.

Platyceros Schaeff. Ic. tab. 6. fig. 8.

Habitat in Europae locis suffocatis.

Variat colore viridi et coeruleo.

2. SCARABAEVS. *Palpi* quatuor filiformes.

Labium emarginatum: api-
cibus elongatis palpi-
geris.

Antennae lamellatae.

* *Scutellati thorace cornuto.*

1. Sc. scutellatus, thoraeis cornu incurvo maximo: sub- *Hercules.*
tus barbato unidentato, capitis recurvato *Linn. Syst.*
Nat. ii. 541. 1. *Mus. Lud.* VI. 3.

Scarabaeus maximus indicus nitens piceus *Roeß. Inf.* 2.

Scarab. i. tab. A. fig. 1. et Inf. 4. tab. 5. fig. 3.

Taurus volans f. Eruma *Morg. Bras.* 247. fig. 3.

A 2

Rhino.

I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

Rhinoceros americanus cinereus rostro nigro nitente.

Periv. Gazoph. tab. 70. fig. 1.

Grew. Mus. 162.

Edw. Aui. tab. 334.

Drury. Inf. 1. tab. 30. fig. 1. 2.

Aub. Miscell. tab. 41. fig. 2.

Habitat in America.

Thoracis cornu longissimum subtus barbatum apice nudum, emarginatum.

Variat elytris piceis et glaucis nigro punctatis.

Plures associati amplectuntur cornibus ramum

Mammeae Americanae, circumvolando corticem perforant, succum exstillance hauriunt, inebritantur et capiuntur, teste *Grem.* Vix tamen verisimile videtur, quum thoracis cornu subtus barbatum.

Gideon. 2. Sc. scutellatus thoracis cornu incurvo maximo apice bifido, capitis recurvato bifido supra unidentato.

Linn. Syst. Nat. II. 541. 2.

Rhinoceros Swammerd. Bibl. tab. 30. fig. 2.

Rhinoceros minor cornibus duobus furcatis. Roes. Inf. 2.

Scarab. 1. tab. A. fig. 5.

Aub. Miscell. tab. 40. fig. 3.

Edw. Aui. tab. 40.

Gron. Zoophy. 413.

Habitat in Indiis.

Oromedon. 3. Sc. scutellatus thoracis cornu brevi emarginato, capitis recurvato bifido.

Scarabaeus Oromedon *Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 5.*

Aub. Miscell. 1. tab. 40. fig. 4.

Habitat in Indiis.

Statura nasicornis totus glaber piceus. Capitis clypeus dentatus. Antennarum basis pilis parvis obvallata. Capitis cornu breve compressum apice bifidum laciinis aequalibus. Cornu thoracis breve emarginatum. Pedes dentati.

Aegeon. 4. Sc. scutellatus rufus, thoracis cornu brevi incurvo, subtus barbato, capitis recurvo subulato.

Scarabaeus Aegeon *Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 5.*

Habitat in Indiis.

Parvus

Parvus in hac familia. Caput nigrum clypeo emarginato. Cornu magnum recurvum subulatum. Thorax elytris angustior ferrugineus macula utrinque margineque tenuissime nigris. Cornu breve incurvum subtus, canaliculatum barbatum, elytra ferruginea, scutello, futura margineque nigris.

5. Sc. scutellatus thoracis cornu incurvo: basi crassissima, *Chorinae-*
apice bifido, capitis longiori recurvo bifido. *us.*

Habitat in Brasilia *Muf. Dom. Tunstall.*

Affinis Sc. Pan. Capitis Clypeus utrinque unidentatus. Cornu elongatum recurvum inerme apice bifidum. Thorax lateribus rugosus in medio nitens glaber elevatus, desinens in cornu incurvum, breve apice bifidum. Elytra stria, unica, ad futuram lateribus scabris margine reflexo.

An varietas S. Pan?

6. Sc. scutellatus, thorace cornu bidentato, capite *dichotomo*-
cornu dichotomo, elytris rufis. *Linn. Mant. I. 529. mus.*

Aub. Miscell. tab. 40. fig. 5.

Voigt. Scarab. 107. tab. 14. fig. 107.

Habitat in Indiis.

Magnus rufus.

7. Sc. scutellatus rufus, thorace cornu elevato, capite *claviger*.
cornu subulato recurvo. *Linn. Mant. I. 529.*

Aub. Miscell. I. tab. 40. I.

Voigt. Scarab. 108. tab. 14. fig. 108.

Habitat in Indiis.

8. Sc. scutellatus thoracis cornu incurvo: basi crassissima, *Pan.*
apice bifido, capitis recurvo unidentato.

Habitat in Indiis. *Dom. Drury. Statura praetedentium niger. Clypeus utrinque unidentatus, cornu recurvo, magno medio interiori dente valido notato. Thorax lateribus scaber, medio glaber, elevatus crassissimus, desinens in cornu incurvum apice bifidum. Elytra glabra stria unica ad futuram.*

6 I. ELEVTERATA. Scarabaeus,

bilobus, 9. Sc. scutellatus thorace prominente bilobo, capitis cornu simplici, elytris striatis.

Scarabaeus bilobus scutellatus thorace prominente bilobo, capitis cornu simplici, elytris striatis. *Linn.*

Syst. Nat. II. 544. 12.

Earp. Au. 105. tab. 105. fig. e.

Gronou. G. zoph. 414. tab. 14. fig. 1, 2.

Aub. miscell. tab. 15. fig. 3.

Habitat in Europa australi.

Simillimus S. Jafoni at paullo minor. Clypeus rotundatus, sexdentatus. Capitis cornu recurvum, dente parvo intus notatum. Thorax lateribus scaber dorso plano, desinit apice in cornu crassissimum valde planum late emarginatum, laciniis rotundatis, obtusis. Foueola marginalis utrinque excavata. Elytra picea punctato striata. Tibiae posticae bidentatae.

Jafoni, 10. Sc. scutellatus thoracis cornu crassissimo; apice emarginato, capitis unidentato bifido.

Rhinoceros Swammerd. Bibl. tab. 30. fig. 5.

Habitat in China. *Mus. Brit.* Oblongus ater glaber.

Capitis cornu recurvum intus canaliculatum apice bifidum.

Thorax lateribus rugis elevatis exasperatus in medio protrahitur in cornu crassissimum, apice late emarginatum, laciniis validis distantibus, incurvis. Elytra ad futuram unistriata.

Affinis S. bilobo, at capitis cornu bifidum.

validus, 11. Sc. scutellatus, thorace antice retuso, cornu conico brevissimo, capite bituberculato.

Habitat in Brasilia *Dom. Banks.*

Magnitudo S. Rhinocerotis. Capitis clypeus obtusus, truncatus, in medio tuberculis duobus erectis acutis. Thorax antice rugosus retusus, cornu brevissimo conico, postice glaber. Elytra glabra picea.

truncatus, 12. Sc. scutellatus, thorace retuso cornu brevi truncato, capite mutico.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Banks.*

Statura et magnitudo S. nasicornis, supra niger subtus piceus. Caput truncatum muticum. Thorax retu-

I. ELEVTERATA. Scarabaeus. 7

retusus glaber laevis antice cornu brevi, erecto,
truncato. Elytra glabra. Femora crassissima.

13. Sc. scutellatus thorace antice retuso, cornu brevi in- *Eurytus.*
cumbente emarginato, capite mutico.

Habitat in America *Mus. Dr. Hunter.*

Medius capitinis clypeus integer linea media transver-
sali elevata. Thorax rotundatus glaber, antice re-
tusus cornu incumbente brevi emarginato. Elytra
laevia, stria unica ad futuram.

14. Sc. scutellatus glaber thorace bicorni, capitis cornu *Aetaeon,*
unidentato: apice bifido, elytris laevibus. *Linn. Syst.*
Nat. II. 541. 3. Mus. Lud. VI. 4.

Aub. Miscell. tab. 15. fig. infer.

Rhinoceros maximus tricornis *Roef. Ins. 2.* Scarab. I.
tab. A. fig. 2.

Enema *Marggr. Bras. 246.*

Rhinoceros *Swamm. Bibl. tab. A. fig. 2.*

Grew. Mus. p. 161.

Periverii Gaz. tab. 15. fig. 12.

Habitat in America, Brasilia.

15. Sc. scutellatus thorace bicorni, capitis cornu apice *Simson.*
bifido, labio denticulato.

Scarabaeus Simson scutellatus thorace bicorni, capitis
cornu apice tantum bifurcato, labio denticulato.

Linn. Syst. Nat. II. 542. 4. Mus. Lud. V. 5.

Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

Affinis videtur S. Aetaeoni.

Synonyma a *Linnaeo* citata nullo modo hue per-
tinent, Certe figura *Sloanei* ad Charonem
spectat.

16. Sc. scutellatus villosus thorace, gibbo bicorni, capitis *Elephas.*
cornu unidentato apiceque bifido. *Olear. Mus.*
tab. 16. fig. 2.

Habitat in Guineæ. *Mus. Brit.*

Magnitudo et summa affinitas cum S. Aetaeone. Totus
nigricans, at pilis ferrugineo griseis undique tectus,
Capitis cornu porrectum, glabrum laeve, atrum,
basí interno demte valido, incurvo, villoso armatum.
Thorax in medio gibbus utrinque cornu valide
porrecto, Elytra vase punctata.

8 I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

- Boss.* 17. Sc. scutellatus thorace retuso excavato bidentato, capitis cornu recurvo simplici.
Habitat ad Sierra Leon. *Dom. Drury.*
Statura et magnitudo S. Rhinoceroticis. Capitis Clypeus emarginatus cornu magno recurvo. Thorax niger glaber antice excavato retusus bidentatus, pilis ferrugineis erectis. Elytra picea linea punctata unica ad futuram.
- Tityus.* 18. Sc. scutellatus glaucus thorace tricorni: lateralibus brevissimis subulatis, medio subtus barbato, capitis cornu recurvo.
Scarabaeus Tityus scutellatus thorace tricorni: intermedio maximo simplicissimo, capitis cornu recurvato simplicissimo *Linn. Syst. Nat. II. 542. 5. Amoen. Acad. 6. 391. 1.*
Scarabaeus thorace tricorni laevi: Intermedio maximo incurvo subtus barbato: capitis cornu maximo recurvo. *Gron. Zool. tab. 14. fig. 8.*
Aub. miscell. 1. tab. 40. fig. 2.
Habitat in America.
Variat colore elytrorum nigro griseo maculato et griseo nigro maculato.
- Centaurus.* 19. Sc. scutellatus niger thorace tricorni lateralibus brevissimis subulatis, capitis recurvo unidentato.
Habitat in India Orientali. *Mus. Brit.*
Magnitudo S. Tityi, totus niger, glaber. Capitis cornu recurvum, compressum versus apicem interne dente valido armatum. Apex ipse integer. Thorax niger cornubus tribus intermedio longissimo glabro apice emarginato, lateralibus brevissimis. Elytra picea, stria unica ad futuram.
- Atlas.* 20. Sc. scutellatus thorace tricorni, intermedio brevissimo, capitis cornu recurvo.
Scarabaeus Atlas scutellatus thorace tricorni: antico brevissimo, capitis cornu adscendente. *Linn. Syst. Nat. II. 542. 6. Mus. Lud. Vlr. 6.*
Etr. Av. 105. tab. 105. fig. 1.
Rhinoceros Swammerd. Bibl. tab. 30. fig. 3.
Margraf. Bras. 247. fig. 1.
Olear. Mus. tab. 16. fig. 3.

Habi-

Habitat in America.

Thoracis cornua lateralia elongata, incurva; intermedio vel anteriori brevissimo conico. Cornu capitis elongatum recurvum intus tridentatum, dente antico validiori.

21. Sc. scutellatus, thorace excavato tricorni: lateralibus compressis unidentatis, capitis recurvo simplici. *Geryon.*

Scarabaeus Geryon: *Drury. Inf. 2. tab. 30. fig. 6.*

Habitat in Indiis.

Statura singularis, magnitudo S. nasicornis. Capitis clypeus integer cornu magno scabro, recurvo. Thorax valde excavatus tricornis niger. Cornua lateralia compressa lata, antice dente valido armata. Cornu medium erectum, subulatum, basi postice dilatum, scutellum tegens, emarginatum. Elytra picea, stria ad futuram. Femora crassissima. Tibiae anticae dentatae, posticae quatuor terminantur lobo semicirculari, ciliato, laminisque duabus longioribus.

22. Sc. scutellatus thorace tricorni intermedio longiori simplici, capite submutico, elytris unistriatis. *Linn.*

Syst. Nat. 11. 542. 7. Mus. Lud Vlr. 7.

Scarabaeus tricornis capite mutico. *Roeß. Inf. 2.*
Scarab. 1. Tab. A. fig. 6.

Nasicornis Taurocerus Marianus castanei coloris. *Petiverii Gaz. tab. 24. fig. 10.*

Aub. Miscell. tab. 15. fig. 1.

Habitat in America. Dentes duo breves interdum in fronte maris.

23. Sc. scutellatus thorace tricorni intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris laevissimis. *Antaeus.*

Scarabaeus Antaeus *Drury. Inf. Tom. 1. tab. 34. fig. 3.*

Habitat in America.

Simillimus statura et Magnitudine Charoni, at cornua omnia simplicia et elytra stria omnino nulla exarata Ab. S. Aloeo et magnitudine et statura omnino differt. Foemina inermis.

24. Sc. scutellatus thorace tricorni intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris punctatis. *Syphax.*

Habitat in America. *Mus. Banks.*

10 I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

Nimis affinis S. Antaeo, à quo tamen differt cornibus lateralibus minoribus elytrisque punctatis.

Maimon. 25. Sc. scutellatus thorace tricorni: cornibus aequalibus brevissimis, elytris laevis.

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis praecedenti, at minor, et cornua brevissima. Thorax utrinque retusus. Caput muticum.

Typhocus. 26. Sc. scutellatus thorace tricorni: intermedio minori, lateralibus porrectis longitudine capitis mutici. *Linn. Syst. Nat. II. 543. 9. Mus. Lud. Vlr. 8.*

Copris niger, elytris striatis, thorace antrosum tricorni. *Geoff. Inf. I. 72. tab. I. fig. 3.*

Scarabaeus ovinus 2. *Raj. Inf. 103.*

Scarabaeus thorace cornuto. *Friseb. Inf. 4. pag. 16. tab. 8.*

Taurocerus Monfet. *Inf. 152. fig. 2.*

Habitat sub stercore bovino in terra cuniculos fodens et nidulans profunde.

Variat cornibus capite aequalibus et duplo longioribus.

Titanus. 27. Sc. scutellatus thorace tricorni: intermedio longiori, apice bifido; lateralibus subarcuatis acutis, capite mutico.

Scarabaeus Simson. *Drury. Inf. I. tab. 36. fig. 3. 4.*

Scarabaeus major niger tricornis. *Sloan. Jam. II. pag. 205. tab. 237. fig. 4. 5.*

Habitat in America. *Mus. Brit. Statura et magnitudo S. nasicornis, totus ater. Caput omnino muticum, Thorax valde retusus tricornis, cornibus lateralibus subarcuatis, intermedio multo majori, recurvo, apice parum dilatato, bifido, laciis distantibus, aequalibus. Elytra ad futuram unistriata, Subtus abdomen pilis rufis hirtum.*

Aenobar. 28. Sc. scutellatus thorace tricorni: medio longiori emarginato: lateralibus obtusis, capite bituberculato.

Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*

Statura S. Titani at minor. Clypeus obtusus in medio tuberculis duobus obtusis parvis. Thorax ater nitens utrinque puncto ferrugineo, Cornua tria, antiquo recurvo longiori emarginato, posticis brevibus obtusis et potius tuberculatis, Elytra nigra, Abdomen pilosum,

I. ELEVTERATA. Scarabaeus. II

29. Sc. scutellatus thorace prominentia triplici, capitis *nasicornis*: cornu recurvo, elytris laeibus,

Scarabaeus nasicornis scutellatus thorace prominentia triplici, capitis cornu incurvato, antennis heptaphyllis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 544. 15. *Fn. Sv.* 378.

Scarabaeus capite unicorni recurvo, thorace gibbo, ab domine hirsuto. *Geoff. Inf.* 1. 68. 1.

Scarabaeus nasicornis. *Kirsch. Inf.* 3. pag. 6. tab. 3. fig. 4. *Oearii Mus.* 27. tab. 16. fig. 4.

Rhinoceros Roef. *Inf.* 2. Scarab. 1. tab. 6. 7. *Drury. Inf.* 1. tab. 34. fig. 7. 8.

Scarabaeus excavatus. *Foster. Cent. Inf.* 1.

Habitat in Europae vaporariis simetis,

Larva grisea capite, pedibus spiraculisque rufis, delectatur simo sed acidulo et subadstringenti.

Inventor speciei *Clusius*, qui illam *Mouffet*o communicavit.

30. Sc. scutellatus thorace retuso prominentia triplici: *Sylvanus*, intermedia obsoleta, capitis cornu recurvo.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo S. nasicornis niger. Capitis clypeus vix emarginatus cornuque medio recurvo. Thorax valde petitus prominentia triplici, anteriore minutissima, Elytra punctato striata fere picea.

31. Sc. scutellatus thorace trituberculato, capitis cornu *Lazarus*, brevi emarginato.

Habitat in New Jork Americae. *Dr. Yeats.*

Parvus statura S. mobilicornis. Capitis clypeus margine elevato, emarginatus utrinque sinuatus. Cornu parvum erectum emarginatum. Thorax fuscus, canaliculatus tuberculis tribus, medio transverso, Elytra striata rufa.

32. Sc. scutellatus thorace quadridentato, capitis cornu *mobilicor-* *nis*, recurvo mobili.

Habitat Herfordiae Anglorum. *D. Drury.*

Parvus statura S. testacei. Antennae lamellatae, clava ferruginea. Capitis cornu compressum, recurvum thorace brevius basi articulo mobili. Thorax punctatus, elevatus, canaliculatus, lateribus utrinque dente compresso elevato recurvo apice flexuoso. Pone

hunc

hunc fovea parva orbiculata excavata. In medio dentes duo reliqui erecti brevissimi. Scutellum rotundatum. Elytra striata subferruginea. Pedes et abdomen pubescentia ferruginea.

cylindri- 33. Sc. scutellatus thorace antice truncato quinquedentato, capite antice cornu erecto, corpore cylindrico.

Linn. Syst. Nat. II. 544. II. Fn. Sv. 380.

Habitat in Pruni Cerasi truncis Europae septentrionalis.

* * *Scutellati thorace inermi, capite cornuto.*

Rhinoce- 34. Sc. scutellatus thorace retuso subbituberculato, capite cornu simplici, clypeo bifido, elytris punctatis. *Linn. Syst. Nat. II. 544. 14. Mus. L. VI. 10.*

Rhinoceros Laconensis nigricans capite vaginisque punctulatis. *Petiver. Gazoph. tab. 44. fig. 9. et tab. 100. fig. 3.*

Rhinoceros cornu unico. *Roes. Ins. 2. Scarab. I. tab. A. fig. 7.*

Barril. Icon. tab. 163.

Habitat in Asia.

Barba- 35. Sc. scutellatus thorace inermi: antice scabro, capitis cornu recurvo brevi.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo S. Rhinocerotis, at latior. Capitis Clypeus antice elongatus, subemarginatus, cornu recurvo subulato longitudine capitis. Oculi testacei. Thorax rotundatus antice scaber, postice glaber. Elytra picea punctato striata. Abdomen piceum. Tibiae anticae quadridentatae.

Satyrus. 36. Sc. scutellatus thorace inermi: antice truncato, capitis cornu recurvo, capite longiori.

Habitat in America septentrionali *Dom. Banks.* Major S. nasicorni. Clypeus emarginatus dentibus acutis divergentibus. Cornu capite triplo longius. Thorax antice valde truncatus, glaber, laevis, ater. Elytra striata. Subtus ferrugineus, hirtus. Tibiae omnes dentatae.

Foemina clypeo tuberculato, thorace plano.

37. Sc. scutellatus thorace inermi: antice retuso, capitis *iamaic-*
cornu recurvo, elytris substriatis. *cenfis.*

Scarabaeus iamaicensis. *Drury. Inf.* 1. tab. 34. fig. 1. 2.

Habitat in Indiis. *Muf. Brit.*

Capitis clypeus emarginatus in medio cornu por-
recto recurvo & fere recumbente. Thorax rotun-
datus antice valde retusus. Elytra obsolete
punctata striataque.

Foemina mutica.

38. Sc. scutellatus thorace inermi: antice excavato, capi- *Silenus.*
tis cornu recurvo, elytris laevissimis.

Habitat in Gallo provincia.

Statura et summa affinitas S. nasicornis, at duplo minor,
totus piceus. Capitis cornu parvum subulatum
valde recurvum. Thorax antice valde excavatus.
Elytra laevia.

39. Sc. scutellatus, thorace inermi rotundato, capitis *Syrichtus.*
cornu recurvo.

Habitat in America. *Muf. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at thorax rotundatus, nec retusus,
nec excavatus.

40. Sc. scutellatus depresso thorace fossula exarato, *didymus.*
capite tricuspidi, elytris striatis. *Linn. Syst. Nat.* II.

545. 19. *Muf. Lud. Vlr.* 14.

Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 7.

Habitat in America.

Magnitudo L. Cervi statuaque ejus depresso ab hoc
genere distinguere videntur.

Alter sexus in antico thoracis mucrone parvo elevato
armatus.

41. Sc. scutellatus thorace inermi, clypeo bifurco. *goliatus*

Scarabaeus goliatus scutellatus thorace inermi, capite
rostro bifurco. *Linn. Mant.* 530.

Drury. Inf. 1. tab.

Habitat in Afria. *Muf. Dr. Hunter.*

42. Sc. scutellatus thorace inermi scabro, capite linea *Hircus.*
transversa carinata, clypeo bidentato.

Habitat Tranquebariae. *Koenig.* Magnitudo et statura
S. Nasicornis. Capitis clypeus emarginatus dentibus
duobus

duobus elevatis erectis. In medio linea transversa valde elevata carinata. Thorax scaber. Elytra substriata. Corpus nigrum subtus tomento ferrugineo tectum.

- farctus.* 43. Sc. scutellatus brunneus capite subbicorni, elytris punctato striatis: apice nigris.

Habitat in Pensylvania. *Mus. Brit.*

Statura et magnitudo S. vernalis. Capitis clypeus ferrugineus quasi e squamis tribus imbricatis compositus, inferiori emarginata, reliquis duobus dente elevato, acuto, brevi, posteriori paulo majori armatis. Thorax gibbus, ciliatus, ferrugineus margine postico nigro. Antice ruga transversalis, abbreviata. Scutellum nigrum. Elytra punctato striata, brunnea, apice nigra, macula parva brunnea.

- piceus.* 44. Sc. scutellatus piceus thorace inermi glabro, capite subbicorni, elytris striatis.

Habitat in Indiis. *Dom. Drury.*

Parvus statura S. Fossoris. Clypeus apice emarginatus et in medio cornibus duobus brevissimis approximatis. Thorax glaber laevis. Elytra punctato striata;

- Sphinx.* 45. Sc. scutellatus thorace inermi quadripunctato, capite tuberculato, tarsis anticus nullis.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

Medium Caput virescens tuberculis quatuor elevatis, transversalibus. Thorax aeneus, puncto utrinque unico et duobus dorsalibus ad marginem posticum impressis. Elytra obscura nigra striata. Femora compressa dentata. Tibiae anticae arcuatae dentatae acutæ, absque tarsis, reliquæ clavatae.

- subterra-neus.* 46. Sc. scutellatus thorace inermi, capite tuberculis tribus, elytris striis crenatis. *Linn. Syst. Nat. II. 548. 28. Fn. Sv. 382.*

Habitat in Europæ stercore.

Affinis Sc. Fossori, at minor.

- Fosfor.* 47. Sc. scutellatus thorace inermi retuso, capite tuberculis tribus: medio subcornuto. *Linn. Syst. Nat. II. 548. 31. Fn. Sv. 384.*

Scarabaeus totus niger spinulis tribus capitis transversim positis *Geoff. Hist.* I. 82. 20.

Habitat in Europae fabulosis, stercoratis.

Magnitudine variat.

48. **Sc.** scutellatus thorace inermi, capite tuberculis tribus *terrestris* aequalibus, elytris substriatis.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis Sc. Fossori at triplo minor. Tubercula capitis minora; breviora, obtusiora. Elytra striata.

49. **Sc.** scutellatus thorace inermi, capite mucronibus tribus, corpore violaceo, abdomine testaceo. *Linn.* *Syst. Nat.* II. 548. 304.

Habitat in Mauritania.

Oblongus viride coeruleus: abdomine villoso lutescente.

50. **Sc.** scutellatus testaceus capite bituberculato, elytris *testaceus*, punctato striatis.

Habitat in Anglia. *Dr. Lee.*

Statura S. vernalis at triplo minor, totus pallide testaceus. Tubercula duo parva in fronte. Thorax convexus punctis vagis plurimis adspersus. Elytra striata striis punctatis. Subtus hirtus.

51. **Sc.** scutellatus ater thorace inermi, capite tuberculato, *fimetarius*, elytris rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 548. 32. *Fn. Sv.* 385. *rius.*

Scarabaeus capite thoraceque nigro antennis elytrisque rubris. *Geoff. Hist.* I. 81. 18.

Scarabaeus fimetarius *Scopoli Ent.* 20.

Scarabaeus pillularius nonus. *Raj. Inf.* 106. n. 9.

Scarabaeus equinus medius coleoptris nigris, collaris nigro. *Frisch. Inf.* 4. pag. 35. tab. 19. fig. 3.

Habitat frequens in Europae stercoribus.

Tubercula capitis tria.

51. **Sc.** scutellatus thorace subinermi, capite tubculo unico, elytris nigris, abdomine rufo. *bicolor.*

Habitat in Germania *D. de Haffort*: corpus parvum ovatum gibbum. Caput nigrum, ore antennisque rufis. Clypeus subrotundus, integer, in medio tuberculo elevato, reflexo. Thorax ater, glaber, punctatus;

status; In medio canaliculatus, utrinque puncto parvo prominulo. Elytra atra striata. Subtus uti et pedes rufi.

- erraticus.* 53. Sc. scutellatus thorace inermi laevi, capite tuberculo unico, elytris fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 548. 29. *Fn. Sv.* 383.

Habitat in Europae stercoribus, viis.

- conspurcatus.* 54. Sc. scutellatus thorace inermi marginibus lateralibus albidis, capite tuberculato, elytris griseis maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 549. 34. *Fn. Sv.* 387.

Scarabaeus capite thoraceque nigro glabro, elytris griseis, pedibus pallidis. *Geoff. Inf.* I. 82. 19.

Scarabaeus pillularius decimus. *Raj. Inf.* 108.

Habitat cum congeneribus.

Affinis *fordido*, at minor.

- fordidus.* 55. Sc. scutellatus capite tuberculato, thorace nigro marginie pallido, puncto nigro, elytris griseis.

Habitat in Anglia.

Statura S. conspurcati, at paulo maior. Clypeus rotundatus, integer, niger macula utrinque pallida tuberculisque tribus, intermedio subcornuto. Thorax laevis, glaber, ater, margine omni pallido: punctum utrinque nigrum in margine pallido. Elytra striata grisea futura obscuriori. Subtus nigro griseoque variegatus pedibus pallidis.

- granarius.* 56. Sc. scutellatus niger thorace inermi, clypeo tuberculo solitario, elytris postice testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 547. 23.

B. Scarabaeus haemorrhoidalis scutellatus thorace inermi, capite tuberculato, elytris apice rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 548. 33. *Fn. Sv.* 386.

Habitat in Europae suffocatis. Elytra postice ultra dimidium testacea.

- mariannus.* 57. Sc. scutellatus capite tuberculato, elytris laevibus glaucis fusco punctatis. *Linn. Syst. Nat.* 549. 35.

Habitat in America.

Magnitudo S. Aloei. Abdomen et femora ferruginea.

An foemina inermis Sc. Herculis?

*** *Sect-*

*** *Scutellati, mutici capite et thorace inermi.*

58. Sc. scutellatus, clypei centro prominulo, elytris antice *scaber.*
scabris.

Scarabaeus scaber scutellatus muticus thorace elytrisque
antice scabris. *Linn. Syst. Nat. II. 549. 37. Mus. Lud.*
Vlr. 17.

Habitat in Indiis.

Elytra apice glauca. Clypeus in medio prominet.

59. Sc. scutellatus muticus pedibus anticis arcuatis longis-
simis. *Linn. Syst. Nat. II. 549. 39. Mus. Lud. Vlr. 18.* *longima-*
Aub. Miscell. tab. 41. fig. I. *nus.*

Habitat in India.

Femora antice dente valido armata.

60. Sc. scutellatus muticus ater, clypeo rhombeo: vertice *stercorar-*
prominulo elytris sulcatis. *Linn. Syst. Nat. II. 551. 42.* *rius.*
Fn. Sv. 388.

Scarabaeus ater dorso glabro, elytris sulcatis, capitis
clypeo rhomboide centro prominulo. *Geoff. Ins. I.*
pag. 75. n. 9.

Scarabaeus magnus niger vulgatissimus, antennis arti-
culatis. *Raj. Ins. p. 74. n. 1.*

Scarabaeus magnus e purpura niger, tibiis omnium
pedum ferratis. *List. Scar. Engl. 380. n. 4.*

Scarabaeus stercorarius niger major. *Frisch. Ins. 4. pag. 13.*
tab. 6.

Scarabaeus stercorarius vel fimanus *Merret.* pin.
pag. 201.

Habitat in Europa sub stercore.

Ab Aegyptiis sole consecratur, qui semper marem
credebant absque copula ova ponentem.

Vesperi circumvolitat ingenti cum susurro, serenum
diem annuntians. Infestatur acaris, Ichneumone.

Varietatem vidimus elytris obscure rufis.

61. Sc. scutellatus muticus elytris glabris laevissimis, cly-
peo rhombeo, vertice prominulo. *Linn. Syst. Nat. II.* *vernalis.*
551. 43. Fn. Sv. 389.

Scarabaeus coerulescens, dorso elytrisque glabris lae-
vissimisque capitis clypeo rhomboide, centro pro-
minulo. *Geoff. Hist. 77. 10.*

Scarabaeus vernalis. Scopoli Ent. 27.

Habitat sub stercore Europae.

Praecedenti simillimus, et forte ejus varietas.

invencus. 62. Sc. scutellatus muticus thorace antice impresso mucronato.

Habitat in America. *Dom. Banks.*

Statura et magnitudo Sc. stercorarii. Capitis clypeus rotundatus, subemarginatus, stria media transversa, elevata. Thorax rotundatus, punctatus, ater antice puncto parvo impresso, et sub hoc prominet mucro brevissimus. Elytra picea crenato striata. Subtus piceus, hirtus.

splendidus. 63. Sc. scutellatus muticus viridi nitens, elytris striatis. Habitat in America. *D. Drury.*

Statura S. stercorarii, at triplo minor totus viridi nitens, immaculatus. Capitis clypeus emarginatus. Thorax rotundatus, laevis puncto lateralí utrinque impresso. Scutellum triangulare antice subelevatum. Elytra crenato striata. Tibiae dentatae.

Cephus. 64. Sc. scutellatus rufus elytrorum sutura apicibusque nigris.

Habitat - - - - *Muf. Dom. Banks.*

Statura exacte Sc. vernalis. Caput fuscum antennarum clava valida verticeque prominulo transverso. Thorax rotundatus, ciliatus, rufus, postice rotundatus margine puncto lateralí nigris. Scutellum nigrum. Elytra striata rufa, sutura apicibusque nigris.

Laborator 65. Sc. scutellatus muticus ater, thorace punctato, elytris striatis, clypeo emarginato.

Habitat in stercore bovino Brasiliæ. *D. Banks.*

Statura exacte Sc. aratoris, at duplo maior totus ater. Clypeus emarginatus. Thorax vase punctatus. Elytra striata. Pedes nigri.

Arator. 66. Sc. scutellatus muticus niger: thorace laevi, elytris punctato striatis.

Habitat ad Cap. B. S.

Statura et magnitudo S. Fossoris. Capitis clypeus integer subscaber. Antennae ferrugineae. Thorax glaber, laevis. Elytra striato punctata. Femora antica ferruginea.

67. Sc. scutellatus muticus laevis niger ano barbato. *barbatus.*
 Habitat in India. *Mus. Tortianum.*
 Statura S. Fosforis, totus laevis glaber nitens. Ultimum abdominis segmentum ultra elytra prominet, pilis longioribus ferrugineis barbatum.
68. Sc. scutellatus muticus ater: thorace glabro nitido, *rufipes.*
elytris striatis.
 Scarabaeus rufipes muticus ater, antennis pallidis, elytris laevibus. *Linn. Syst. Nat. II. 559. 85. Fn. Sv. 403.*
 Habitat in stercore.
 Varietas duplo minor pedibus nigris vix differt.
69. Sc. scutellatus muticus ater, elytris griseis nigro *luridus.*
striatis.
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
 Caput et thorax atra, nitida, mutica. Elytra striata grisea lineolis maculisque nigris.
70. Sc. scutellatus muticus oblongus niger, elytris maculis *4 macula-*
duabus rubris Linn. Syst. Nat. II. 558. 84. Fn. Sv. 398. ius.
 Habitat in Anglia.
 Magnitudo et statura omnino S. subterranei. Thorax glaber, nitens, immaculatus. Elytra obsolete striata maculis duabus rubris.
71. Sc. scutellatus muticus niger, elytris plaga rufescente. *plagiatus.*
Linn. Syst. Nat. II. 539. 85.
 Habitat Upsaliae.
 Affinis Sc. subterraneo.
72. Sc. scutellatus muticus niger elytris sulcatis piceis fer- *testudina-*
rugineo punctatis. *rius.*
 Habitat in Anglia. *D. Solander.*
 Parvus statura Sc. sulcati. Capitis clypeus rotundatus, emarginatus vix tuberculatus. Thorax scaber ater. Elytra profunde sulcata picea punctis ferrugineis per paria distributis adspersa. Pedes picei.
73. Sc. scutellatus muticus ater, elytris testaceis futura *merdarius*
nigra.
 Habitat in Europae stercore.
 Latera thoracis subtestacea. Affinis Sc. quisquilio, at
 futura elytrorum nigra.

20 I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

- quisqui-* 74. Sc. scutellatus muticus ater elytris lividis.
lius. Scarabaeus quisquilius exscutellatus ater glaber, elytris
 lividis testaceis. *Linn. Syst. Nat. II. 558. 83. Fn. Sv. 397.*
 Scarabaeus minimus. *Scopoli Ent. 29.*
 Habitat in Europae stercore.
 Scutellum parvum nigrum.
- porcatus.* 75. Sc. scutellatus muticus fuscus, elytris porcatis.
 Habitat in stercore Lipsiae.
 Statura et magnitudo S. asperi totus obscurè fuscus.
 Elytra porcata vel profunde sulcata sulcis transversim
 striatis.
- Stercora-* 76. Sc. scutellatus muticus ater laevis, clytris striato
tor. crenatis, clypeo emarginato.
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et magnitudo S. subterranei. Clypeus niger
 laevis antice emarginatus. Thorax laevis muticus
 ater, margine antico tenuissime pallescidente. Elytra
 atra sulcata sulcis crenulatis.
- asper.* 77. Sc. scutellatus muticus capite thoraceque transversim
 sulcati, elytris striatis.
 Habitat in plantis putridis Europae.
 Magnitudo et statura Sc. testudinarii. Capitis clypeus
 emarginatus. Pedes rufescentes.
- unipuncta-* 78. Sc. scutellatus muticus ater coleoptris flavescentibus
tus. puncto communi nigro.
 Coccinella unipunctata coleoptris flavescentibus puncto
 communi nigro. *Linn. Syst. Nat. II. 579. 6. Fn. Sv. 470.*
 Habitat in Europa.
 Tempore sereno per aëra volitat.
- * * * * *Exscutellati thorace cornuto.*
- Zacchus.* 79. Sc. exscutellatus thorace prominente bilobo, capitis
 cornu recurvo simplici.
 Habitat ad Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*
 S. Molosso minor niger. Capitis clypeus rotundatus,
 margine reflexo apice emarginato. Cornu elonga-
 tum erectum apice recurvum. Thorax subpunctatus
 utrinque retusus dorso prominente bilobo. Lineolae
 duae elevatae utrinque ad marginem.

Foemina

Foemina capitis cornu brevissimo truncato thoracisque tuberculo antico transverso elevato.

80. Sc. exscutellatus thoracis cornu plano: subtus dentato capitis truncato tridentato. *Oedipus.*

Habitat at Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo praecedentis. Clypeus rotundatus emarginatus. Capitis cornu compressum erectum, breve, apice truncatum denticulis tribus, intermedio paulo longiore. Thorax postice rotundatus, lateribus puncto impresso. Cornu brevissimum, planum fere fornicatum, apice rotundatum, subtus unidentatum. Elytra substriata.

81. Sc. exscutellatus thorace bicorni, cornubus brevissimis, capitis cornu erecto subulato. *Pithecius.*

Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

Magnitudo S. stercorarii totus ferrugineus. Capitis Clypeus rotundatus integer cornu erecto, subulato, simplicissimo. Thorax rotundatus in medio cornubus duobus erectis brevissimis. Elytra striata.

82. Sc. exscutellatus thorace antice bicorni, postice elevato tricorni, capitis cornu compresso ferrato. *Rosalius.*

Habitat in America. *Dom. Baker.*

83. Sc. exscutellatus, thorace tridentato, capitis cornu recurvo, elytris striatis. *Silenus.*

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Parvus capitis clypeus rotundatus emarginatus in medio cornu porrecto, acuto, recurvo. Thorax glaber dentibus tribus intermedio majori transverso. Elytra crenato striata.

84. Sc. exscutellatus thorace tricorni, clypeo sinuato bicorni. *Midas.*

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo Molossi. Capitis clypeus porrectus, rugosus, in medio fovea lata excavatus, margine sinibus tribus erosus, denteque utrinque lateraliter valido recurvo armatus. Cornua duo brevia, erecta, subulata in anteriore clypei parte denticulata.

22 I. ELEVTERATA. Scarabaeus.

que duo in medio. Thorax punctatus, antice retusus pilisque ferrugineis vestitus, tricornis cornibus depresso, planis, lateralibus, crenatis acutiusculis, intermedio latiori emarginato. Elytra striata.

Homa-dryas. 85. Sc. exscutellatus thorace tricorni: intermedio plano, acuto bidentato, clypeo reflexo bicorni.

Habitat ad Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*

Statura S. Midas, at paulo major. Clypeus reflexus rotundatus subinteger, in medio elevatus cornubus duobus erectis brevibus obtusis. Thorax antice retusus utrinque fovea magna impressus. Cornua tria brevia plana, acuta intermedio majori bidentato. Elytra striata basi denticulis tribus elevatis brevibus.

lunaris. 86. Sc. exscutellatus thorace tricorni: intermedio obtuso bifido, capitis cornu erecto, clypeo emarginato. *Linn. Syst. Nat. II. 543. 10. Fn. Sv. 379.*

Copris capitidis clypeo lunulato, margine elevato corniculo denticulato. *Genff. Inf. I. 88. I.*

Scarabaeus lunaris. *Scap. Ent. 22.*

Scarabaeus ovinus tertius f. capite operculato. *Raj. Inf. pag. 103.*

Scarabaeus nasicornis medius. *Frisch. Inf. 4. pag. 25. tab. 7.*

Habitat in Europae stercoreatis.

Clypeus in utroque sexu cornutus, at foemina thorace mutico.

Rhada-misius. 87. Sc. exscutellatus thorace late foveolato antice cornu recurvo, capite inermi, elytris rufis sutura punctisque duobus nigris.

Habitat Tranquebariae *Koenig.* Parvus. Capitis clypeus rotundatus integer aeneus antice albicans argenteo nitens. Thorax magnus elytris longior dorso valde excavato, margine foveae elevato et antice cornu parvo recurvo. Color aeneus, lateribus pallidis puncto parvo aeneo. Elytra striata rufa sutura punctisque duobus nigris. Subtus nigricans margine pallescente. Pedes nigri femoribus pallidis.

88. Sc. exscutellatus thorace prominentia triplici, capite *Belzebul.*
tricorni: intermedio majori.

Habitat in America. *Drury.*

Statura S. Carolini, at duplo minor. Capitis clypeus rotundatus, vix emarginatus. Capitis cornu breve, simplex, basi corniculis duobus minoribus armatum. Thorax antice prominentiis tribus, intermedio multo latiore. Elytra striata. Tibiae intermediae elevatae, dentatae.

89. Sc. exscutellatus thorace quadricorni, intermediis *Faunus.*
brevisimis, capitis cornu recurvo, ferrato.

Habitat Cayennae. *D. Mauduit.*

Statura S. Molossi. Capitis clypeus rotundatus, integer. Cornu longitudine fere thoracis recurvum, intus obtuse serratum. Thorax elevatus, gibbus lateribus valde retusis, postice loco scutelli rotundatus punctis duobus parvis impressis. Cornua quatuor lateralibus longioribus subarcuatis, crassis, compressis, apice truncatis; intermediis brevisimis, conicis. Elytra sulcata. Pedes omnes dentati.

Foemina similis, at cornibus minoribus lateralibus haud truncatis, sed acutis, conicis.

***** *Exscutellati, thorace inermi, capite cornuto.*

90. Sc. exscutellatus thorace prominentia duplici, capite *Bonafus.*
tricorni, lateralibus majoribus, arcuatis.

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Statura S. Vaccae. Capitis clypeus aeneus antice rotundatus margine elevato, postice cornubus tribus, intermedio brevissimo erecto subulato, lateralibus longioribus arcuatis. Thorax aeneus antice subcanaliculatus prominentia duplici, postice rotundatus. Elytra obscura. Subtus niger pedibus fuscis.

91. Sc. exscutellatus thorace antice mucronato, capite *Bison.*
cornibus duobus lunaribus. *Linn. Syst. Nat. II.*
547. 27.

Habitat in Hispania.

Totus ater. Thorax antice prominent mucrone exerto,
obtuso, postice puncta duo impressa.

Foemina thoracis margine antico carinato elevato mucroneque capitis parvo distincta.

Sagitta. 92. Sc. exscutellatus, thorace antice mucronato, capitis cornu solitario, erecto.

Habitat ad Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*

Statura S. Nuchicornis. Capitis clypeus rotundatus, integer niger, cornu erecto valido clypei longitudine. Antennarum clava pallida. Thorax laevis niger margine pallescente, antice mucronatus in spinam prominentem validam. Elytra striata grisea. Pedes antici atri macula baseos aurea, reliqui variegati.

Bucephala. 93. Sc. exscutellatus thorace retuso, quadridentato, capitis clypeo angulato unicorni.

Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

Statura S. Molossi, at duplo major. Totus ater. Capitis clypeus porrectus, cornu brevi recurvo. Thorax scaber antice retusus quadridentatus dentibus lateribus sublongioribus. Elytra striata.

Molossus. 94. Sc. exscutellatus thorace retuso bidentato utrinque impresso clypeo unicorni lunato integro, elytris laevibus. *Linn. Syst. Nat. II. 543. 8. Mus. Lud. Vlr. II. Amoen. Acad. VI. 391.*

Drury. Ins. Tom. I. tab. 32. fig. 2.

Habitat in China, officinalis.

Lancifer. 95. Sc. exscutellatus violaceus capite cornu angulato, thorace dentato, elytris sulcatis.

Scarabaeus lancifer exscutellatus violaceus, capite cornu angulato, thorace inaequali, elytris sulcatis. *Linn. Syst. Nat. II. 544. 13.*

Lancifer violaceus. *Voet. colioper. 2. tab. I. fig. I. 2.*

Taurus, *Margr. brasili. 247.*

Habitat in Indiis.

Statura S. Mimas, at multo major totus violaceus.

Paniscus. 96. Sc. exscutellatus thorace retuso, elevato, capitis cornu recurvo, clypeo fillo.

Scarabaeus valgus thorace mutico capite cornuto femoribus secundi paris remotis. *Linn. Syst. Nat. II. 546. 20.*

Mus. Lud. Vlr. 15. 2.

Scara-

Scarabaeus Marianus. Pet. Gaz. tab. 27. fig. 8.

Habitat in America. Mus. Brit.

Statura S. Molossi, at paulo minor, totus ater. Capitis clypeus rotundatus prominens apice fissus, cornuque medio porrecto, recurvo. Thorax antice valde retusus, in medio elevatus, margine acuto subdentato. Elytra striata.

97. Sc. exscutellatus capitis cornu erecto brevissimo, *carolinus*.
clypeo integro, elytris sulcatis.

Scarabaeus carolinus exscutellatus, thorace retuso capite ovali integro unicorni, elytris striatis. Linn.
Syst. Nat. II. 545. 16.

Scarabaeus carolinus, Drury. Ins. I. tab. 35. fig. 2.

Habitat in America.

Simillimus praecedenti, at capitum cornu multo minus. Clypeus integer. Elytra profunde sulcata, quorum sulci quatuor interiores postice profundiores, tomento cinereo repleti. Subtus pilis ferrugineis adspersus.

98. Sc. exscutellatus thorace inermi punctis quatuor impressis, capitum cornu recurvo bidentato. Tarsis anticis nullis. *Sphinx*.

Scarabaeus spinipes, Drury. Ins. I. tab. 35. fig. 8.

Habitat in America.

Statura et magnitudo Sc. Bisonis totus depresso niger aeneo nitens. Clypeus rotundatus integer in medio cornu recurvo brevi acuto basi utrinque unidentato. Thorax glaber, laevis basi rotundatus in medio utrinque puncto unico et postice duobus approximatis impressis. Scutellum minimum. Elytra striata. Pedes antici constant duabus tantum articulis, femore crasso, compresso, et tibia porrecta, arcuata, dentata apice acuta. Pedes secundi parisi femoribus incrassatis tibiis clavatis dentatis, tarsis brevissimis. Foemina capitum clypeo tuberculato,

99. Sc. exscutellatus thorace inermi retuso angulato, capite obsolete bicorni, elytris inauratis striatis *Mimetus*.
Syst. Nat. II. 545. 17. M. L. V. 9.

Copris viridis splendens Voit. coleopt. 4. tab. I. fig. 4.

Scarabaeus inaequalis, farctus, viridi nitens capite bicorni *Roeſ. Inf. 2.* *Scarab. 1. tab. B. fig. 1.*

Habitat in America meridionali. Clypeus integer.

Taurus. 100. Sc. exscutellatus thorace inermi, occipite cornibus binis reclinatis arcuatis *Linn. Syst. Nat. II. 547. 26.*

Scarabaeus illyricus, *Scopoli Ent. 25.*

Scarabaeus ovinus 2. *Raj. Inf. 103. n. 2.*

Copris niger capite pone bicorni, corniculis tenuibus arcuatis longitudine thoracis, thorace utrinque sinuato. *Geoff. Inf. 1. 92.*

Scarabaeus Taurus capite cornibus duobus lunatis lateribus. *Schreb. Inf. fig. 6. 7.*

Habitat in Germania, Gallia.

Vacca. 101. Sc. exscutellatus, thorace inermi retuso, occipite spina erecta gemina. *Linn. Syst. Nat. II. 547. 25.*

Copris obscure aeneus, capite pone bicorni, thorace antice prominente, elytris rufis nigro maculatis. *Geoff. Inf. 1. 90. n. 5.*

Habitat in arvis Brandenburgicis.

Carnifex. 102. Sc. exscutellatus thorace inermi angulato, capitis cornu erecto, corpore aeneo.

Scarabaeus Carnifex exscutellatus thorace inermi plano angulato, capitis cornu reflexo, corpore aeneo. *Linn. Syst. Nat. II. 546. 22.*

Scarabaeus Carnifex. *Drury. Inf. 1. tab. 35. fig. 3. 45.*

Habitat in America.

Synonyma pleraque, a *Linnaeo* numerata, falsa.

bifpanus. 103. Sc. exscutellatus thorace inermi, clypeo cornuto emarginato, elytris striatis. *Linn. Syst. Nat. II. 546. 21. M. L. V. 12.*

Rhinoceros lusitanicus niger splendens vaginis striatis.

Petiv. Gazoph. tab. 8. fig. 4.

Roeſ. Inf. 2. tab. B. fig. 2.

Habitat in Europa Australi.

nuchicor. 104. Sc. exscutellatus thorace rotundato inermi, occipite spina erecta armato. *Linn. Syst. Nat. II. 547. 24. Fn. 381. nis.*

Copris fusco niger, capite clypeato angulato, pene curvato, elytris ferrugineo nebulosis, brevibus striatis.

Geoff. Inf. 1. 89. 3.

Scara-

Scarabaeus ovinus 3 l. capite operto. *Raj. Inf.*

103. n. 2.

Scarabaeus capite thoraceque atro opaco, elytris cineris nigro nebulosis. *Linn. Iter. Gotl.* 41.

Roef. Inf. 2, *Scarab.* 1. tab. A. fig. 4.

Habitat in Europae stercore.

Mas muticus, faemina a tergo cornuta.

105. Sc. exscutellatus thorace inermi griseo nigro punctato, capitibus cornu eretto brevissimo. *verticicornis.*

Habitat in Anglia, *Mus. Dom. Tunstall.*

Statura et summa affinitas S. nuchicornis, at minor.

Capitis clypeus rotundatus aeneus cornu brevissimo recurvo. Thorax rotundatus inermis griseus punctis duobus anticus et unico ad latera nigris. Elytra laevia grisea. Pedes pallidi.

106. Sc. exscutellatus ater capitibus tuberculo unico, elytris striatis. *Sulcator.*

Habitat Cajennae. *D. Maller.*

Statura exæte oblonga S. Fosforis, at paulo major.

Clypeus rotundatus in medio tuberculo unico subspinoso. Thorax gibbus, laevis ater puncto baseos impressio. Elytra atra, striata.

107. Sc. exscutellatus ater, thorace inermi capite bituberculato, elytris maculis duabus rubris. *4 pustulatus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. D. Banks.*

Statura omnino S. Schreberi, at duplo minor, ater, nitens. Clypeus rotundatus: basi tuberculis duobus approximatis et fere connexis. Thorax gibbus rotundatus ater, nitens, laevis. Elytra abdomine breviora, striata, atra: macula baseos apicisque rubra. Pedes nigri.

108. Sc. exscutellatus niger thorace inermi crenato, clypeo tuberculato quadridentato. *cristatus.*

Habitat in Aegypto, *D. Forskahl.*

Statura S. laticollis, at paulo minor, Clypeus anticus quadridentatus, et in medio tuberculo elevato ferrugineo. Thorax inermis rotundatus marginibus crenatis. Elytra laevia. Pedes ciliati.

109. Sc.

facer. 109. Sc. exscutellatus clypeo sexdentato, thorace inermi crenulato, tibiis posticis ciliatis, elytris laevibus. *Linn. Syst. Nat. II. 545. 18. M. L. V. 13. Amoen. acad. 6. tab. 3. fig. 170.*

Scarabaeus laevis, thorace inermi capite antice sex-dentato. *Osbeck. It. 51.*

Scarabaeus pilularius niger, clypeo antice serrato, elytris nebuloso maculatis submollibus planisululis. *Loefl. It. 20.*

Habitat in Europa australi.

* * * * * *Exscutellati, mutici.*

laticollis. 110. Sc. exscutellatus muticus niger, clypeo sexdentato, elytris sulcatis. *Linn. Syst. Nat. II. 549. 38.*

Copris niger, capite clypeato, margine serrato, thorace lato laevi, elytris striatis, *Geoff. Hist. Ins. I. 89. 2.*

Scarabaeus pillularius. *Raj. pag. 105. 4.*

Habitat in China, Europa australi.

Nimis affinis videtur S. sacro.

festivus. 111. Sc. exscutellatus muticus thorace nigro maculato, elytris rubro aeneis, sterno porrecto. *Linn. Syst. Nat. II. 552. 52.*

Roef. Ins. II. Scar. I. tab. B. fig. 8.

Habitat in America.

Color supra ruber nitidus capite thoracisque margine antico nigris.

gibbosus. 112. Sc. exscutellatus muticus clypeo quadridentato, elytris basi gibbere notatis,

Habitat in America.

Paulo major S. stercoreario obscure niger minime nitidus. Capitis clypeus rotundatus apice quadridentatus palpis antennarumque clava ferrugineis. Thorax laevis, glaber, obscurus, antice excisus pro capite, lateribus angulatis, postice rotundatus absque scutello. Elytra ab domine breviora, laevia obscura, basi ad suturam gibbere elevato notata. Femora antica nigra, basi punto ferruginaeo. Pedes postici sublongiores incurvi.

113. Sc.

113. Sc. exscutellatus muticus clypeo quadridentato, ely- novae Hol.
tris fulcatis. landiae.
Habitat in nova Hollandia. *Mus. D. Banks.*
Magnitudo S. ovati totus ater. Thorax subpunctatus,
elytra fulcata.
114. Sc. exscutellatus muticus clypeo bidendato, thorace Koenigii.
scabro, elytris variolosis.
Habitat Tranquebariae, *Koenig.*
Statura S. Schaefferi totus niger. Clypeus scaber antice
bidentatus. Thorax rotundatus scaber, postice fo-
veola parva in medio excavatus. Elytra vario-
losa five striata punctisque majoribus impressis va-
gis excavata.
115. Sc. exscutellatus muticus nigro cupreus, clypeo cupreus.
emarginato, thorace gibbo.
Habitat in Africa. *D. Yeats.*
Major S. laticollis totus niger colore cupreo tinctus,
glaber, laevis. Clypeus rotundatus emarginatus.
Thorax valde gibbus antice punctis duobus parvis
impressus, postice rotundatus.
116. Sc. exscutellatus muticus niger opacus, clypeo emar- flagella-
ginato, elytris scabris. tus.
Habitat ad Cap. B. S.
Statura et magnitudo S. Schaefferi. Capitis clypeus
rotundatus antice late emarginatus. Thorax gib-
bus, rotundatus, laevis. Elytra punctis elevatis
majoribus in lineas digestis scabra. Pedes medio-
res mutici.
117. Sc. exscutellatus muticus thorace rotundato, clypeo Schaefferi.
emarginato, elytris triangulis, femoribus posticis
elongatis dentatis. *Linn. Syst. Nat. II. 550. 41.*
Scarabaeus longipes, *Scopoli Ent. 84.*
Copris niger pedibus longis, femorum posteriorum
basi denticulata, elytris postice gibbis. *Geoff. Ins.*
I. 92. 9.
Habitat in Germaniae stercoribus.
118. Sc. exscutellatus muticus niger, opacus laevis, sub- pilularius.
tus aeneus, thorace postice rotundato. *Linn. Syst.*
Nat. II. 550. 40. M. L. V. 19.

Pilula-

Pilularius, *Plin. nat.* II. 34.

Habitat in Europa australi globulos e stercore conficiens volvens. Totus niger, elytra laevia.

Squalidus. 119. Sc. exscutellatus muticus ater, clypeo emarginato, elytris striatis.

Habitat in stercore bovino Brasiliae. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo S. Schreberi. Caput et thorax atra, laevia, nitida, clypeo emarginato lobis rotundatis. Elytra obscuriora striata.

Schreberi. 120. Sc. exscutellatus muticus ater, glaber, elytris maculis duabus rubris. *Linn. Syst. II. 551. 45.*

Copris niger nitidus, thorace antice gibbo duplice elytro singulo macula duplice rubra. *Geoff. Inf. I. 91. n. 7.*

Habitat Halae Saxonum.

pustula. 121. Sc. exscutellatus muticus ater, elytrorum basi macula rufa.

Habitat in nova Hollandia, *Mus. D. Banks.*

Statura exacte et nimia affinitas S. 4 pustulati, at paulo minor, caput muticum et macula unica ad basin elytrorum.

triangularis. 122. Sc. exscutellatus muticus niger thoracis margine femoribusque pallidis, clypeo emarginato.

Scarabaeus triangularis, *Drury. Inf. I. tab. 36. fig. 7.*
Habitat Surinam.

Statura omnino S. nuchicornis totus laevis.

cinctus. 123. Sc. exscutellatus muticus niger elytrorum margine pallido, clypeo emarginato.

Habitat in China, *D. Drury.* S. nuchorni paullo longior. Thorax ater laevis, nitens. Elytra crenato striata nigra margine pallido, qui tamen color basin elytrorum haud attingit.

ovatus. 124. Sc. exscutellatus muticus niger, thorace rotundato subaeneo, elytris abbreviatis. *Linn. Syst. Nat. II. 551. 46.*

Habitat in stercore bovino Halae, Angliae.

Statura omnino S. nuchicornis, at quadruplo minor.

3. TROX. *Palpi quatuor capitati.**Maxilla bifida.**Antennae lamellatae.*

1. T. thorace elytrisque rugosis, thorace integerrimo. *sabulosus.*

Scarabaeus sabulosus scutellatus muticus niger opacus
tuberculis rugosis, antennis basi pilosis. Linn. Syst.

Nat. II. 551. 48. Fn. Sv. 390.

Scarabaeus rugosus, Scop. Ent. Curn. 23.

Habitat in collibus fabulosis Europae.

2. T. griseus thorace marginato margine postice dentato, *suberosus.*
elytris striatis.

Habitat in Brasilia, *Mus. Dom. Banks.*

- Statura praecedentis, at major. Thorax carinatus mar-
ginatus postice dente unico armatus. Elytra minus
rugosa, quam in praecedente.

3. T. nigricans, thorace postice utrinque emarginato, *spinicor-*
nis.

Habitat - - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*

Statura T. fabulosi, at minor. Antennae lamellatae
primo articulo spina valida fere longitudine stipitis
armato. Clypeus rotundatus integer. Thorax
scaber angulis posticis emarginatis. Elytra punctis
elevatis vix striata. Pedes nigri.

4. MELOLONTA. *Maxilla brevis cornea:*
*apice multidentata.**Antennae lamellatae.*

1. M. testacea albo maculata, scutello macula duplice *Fullo.*
alba, antennis heptaphyllis.

Scarabaeus Fullo scutellatus muticus, antennis hepta-
phyllis, corpore nigro pilis albis, scutello macula
duplici alba. Linn. Syst. Nat. II. 553. 57. Fn. Sv. 394.
Scop. Ent. carn. 12.

Scarabaeus antennarum lamellis maximis corpore ni-
gro, squamis albis varie maculato, Geoff. Inf. I. 69. 2.

Scarabaeus Fullo, Raj. Inf. 93. 9.

Scara-

Scarabaeus albo maculatus Julii. *Frisch. Inf.* II. pag. 22.
tab. I. fig. 1.

Scarabaeus primae classis variegatus, *Roel. Inf.* 4. tab. 30.
Ephem. Nat. Cur. Dec. 2. *Ann. 6. Obs.* 239.
Aub. miscell. tab. 16. fig. med.
Habitat in Europae sylvis, arenosis.

vulgaris. 2. *M. testaceus thorace villoso, cauda inflexa, incisuris abdominis albis.*

Scarabaeus Melolontha scutellatus muticus testaceus thorace villoso, cauda inflexa incisuris abdominis albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 554. 60. *Fn. Sv.* 392.
Geoff. Inf. I. 70. *Scopoli. carn.* 16.

Scarabaeus arboreus vulgaris major, *Rij. Inf.* 104. 1.

Scarabaeus maximus rufus uropygio deorsum inflexo,
Lift. Sc. Angl. 379.

Scarabaeus major arboreus castaneus, *Petiv. Gaz.* pag.
29. tab. 19. fig. 2.

Melolontha vulgaris, *Roel. Inf.* II. *Scarab.* I. tab. I.

Larva grisea capite pedibusque testaceis devorat radices plantarum. *Scarabaeus folia arborum, vesperi volitans tilia intacta.*

Devoratur a vespertilione murino, autumnales morbos copiosior praenuntiat, oleum infusum cimicifugum reddit. *Scopoli.*

Variat thorace rufo et nigro, et utraque varietas alternat annuatim. *Roel.*

occidentalis. 3. *M. testacea thorace pubescente, elytris lineis quatuor niveis.*

Scarabaeus occidentalis scutellatus muticus testaceus, thorace pubescente, elytris lineis quatuor niveis parallelis. *Linn. Syst. Nat.* II. 555. 62.

Drury Inf. 2. tab. 32. fig. 2.

Habitat in Hispania.

Simillima *M. vulgari.*

fervida. 4. *M. glabra testacea, clypeo emarginato.*

Habitat in America septentrionali.

Nimis affinis praecedenti, at minus villosa totaque testacea.

5. *M.*

5. M. testacea, thorace villoso, elytris luteo-pallidis: *solstitialis*.
 lineis tribus pallidioribus.
- Scarabaeus *solstitialis* scutellatus muticus testaceus,
 thorace villoso, elytris luteo-pallidis: lineis tribus
 albis parallelis. *Linn. Syst. Nat. II. 554. 61. Geoff. Inf.*
 I. 74. 7. *Fn. Sy. 393. Scop. Car. 3.*
 Scarabaeus secundus arboreus. *Ruf. Inf. 105. 2.*
 Scarabacus alter ex flavo subcinereus. *Lifl. Star. 301. 2.*
 Scarabaeus lanuginosus arboreus. *Moffet. Inf. pag.*
 160. *fig. 3.*
 Scarabaeus pectinatus minor villosus. *Petiv. Gaz.*
 pag. 36. tab. 22. *fig. 9.*
 Scarabaeus Junii s. *solstitialis*. *Frisch. Inf. 9. pag. 30.*
 tab. 15. *fig. 3.*
 Habitat in arboretis, praecedenti senior, ad solsti-
 tium aestivum frequentissima.
6. M. villosa testacea, abdomine albicante. *ruficornis.*
 Habitat in Germania. *D. de Hettorf.*
 Statura omnino praecedentis, cuius forte varietas.
 Caput nigricans antennis rufis. Thorax et pectus
 villis densis albis tecta. Elytra testacea immaculata.
 Abdomen albidum, ano nigricante. Pedes nigri.
7. M. subitus lanata, capite thoraceque aureis, elytris
 luteis. *lanigera.*
 Scarabaeus *lanigerus* scutellatus muticus, subitus lana-
 tus, capite thoraceque auratis, elytris luteis. *Linn.*
Syst. Nat. II. 555. 65. Mus. L. U. 20.
Drury Inf. I. tab. 34. fig. 6.
 Habitat in India.
 Statura M. punctatae. Clypeus truncatus, obtusus.
 Sternum antice acutum.
8. M. testacea elytris punctis tribus fuscis distantibus. *punctata.*
 Scarabaeus *punctatus* scutellatus muticus testaceus, ely-
 tris punctis tribus subfuscis obsoletis, distantibus.
Linn. Syst. Nat. II. 557. 76. Mus. L. V. 23.
Gronov. Gazoph. 438.
Drury Inf. I. tab. 34. fig. 5.
 Habitat in America.
 Vngues arcuati acutissimi.

glabrata. 9. M. testacea nitida, sterno antice porrecto, obtuso.
Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

Statura omnino M. punctatae: supra glaberrima testacea,
at viridi aeneo colore tincta, nitidissima. Clypeus
late emarginatus. In capite et thorace maculae
duae obscuriores. Scutellum triangulum. Subtus
aenea, sterno antice porrecto obtuso, testaceo.

viridis. 10. M. glabra supra viridis, subtus aurea.

Habitat in Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo M. punctatae. Color supra viri-
dis nitens immaculatus, subtus aureus, sternum
haud porrectum.

aenea. 11. M. glabra aenea, abdominis lateribus albis, elytris
acuminatis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. D. Banks.*

Statura et magnitudo praecedentis. Color supra ae-
neus nitidus immaculatus, subtus magis coerulescens,
pectoris abdominalisque marginibus piloso albis.
Scutellum rotundatum. Elytra apice ad futuram
acuminata. Sternum porrectum acutum. Femora
linea punctorum impressorum.

futuralis. 12. M. viridis, elytrorum sutura flavescente.

Habitat in nova Zelandia, *Mus. Dom. Banks.*

Corpus statura et magnitudine M. punctatae. Caput
viride, immaculatum, margine elevato. Thorax
glaber viridis marginibus parum flavescentibus:
postico obtuse angulato. Elytra glabra viridia, sub-
striata sutura flavescente. Pectus et abdomen pilis
albis testa: sterno porrecto, acuto. Pedes virides,
tarvis ferrugineis.

bicolor. 13. M. glabra supra viridis, subtus testacea, pedibus
apice aureis.

Habitat ad Cap. B. S. *Mus. D. Banks.*

Statura praecedentis, at duplo minor: supra tota viri-
dis, glabra, obscura, immaculata: subtus obscure
testacea, aeneo colore tincta: Femora pallidiora.
Tibiae et tarvi aurei.

14. M. glabra testacea, capite, thoracis elytrorumque *dorsalis.*
dorso nigris.

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Statura omnino M. solstitialis at glabra, et paulo minor.

Caput atrum. Thorax itidem ater lateribus testaceis
puncto atro. Elytra testacea linea lata dorsali atra.
Pedes testacei tibiis posticis nigris.

15. M. glabra picea antennis pedibusque testaceis. *glacialis.*

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnitudine et statura M. dorsalis, piceum,
obscurum, glabrum. Labium superius emarginatum.
Maxilla tridentata. Pedes testacei, postici obscurores.

16. M. thorace nigro: margine pallido, elytris griseis *lurida.*
nigro punctatis.

Habitat ir - - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*

Statura praecedentium, at minor. Caput nigrum
clypeo subintegro. Thorax niger margine laterali
pallido. Elytra grisea macula oblonga ad marginem
exteriorem baseos: punctis duobus ad futuram et
unico versus apicem nigris. Pedes nigri.

17. M. glabra aenea elytris striatis; sutura lineisque *striata.*
quatuor cupreis.

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. D. Banks.*

Statura oblonga praecedentis, at minor. Caput et
thorax aenea, glabra nitida. Scutellum obtusum
aeneum. Elytra paulo obscuriora fulcis decem
striata. Sutura lineaque quatuor, quae postice
per paria coëunt, cuprea. Corpus subtus, uti et
pedes, atrum.

18. M. glabra testacea capite obscuriore, elytris striatis. *testacea.*
Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino M. brunneae, at paullo major. Cor-
pus totum testaceum, capite tamen magis nigricante,
et punctum nigrum ad apices femorum. Labium
emarginatum. Elytra striata.

19. M. glabra testacea, capite elytrorumque sutura nigris. *pallida.*
Habitat in Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*

Major M. brunnea. Caput rotundatum nigrum, ore
pallidiore. Thorax glaber laevis, testaceus. Elytra

substriata pallidiora sutura in primis ad scutellum nigra. Pedes pallidi apice nigri.

- brunnea.* 20. M. glabra testacea elytris striatis, thorace utrinque puncto notato.

Scarabaeus brunneus scutellatus muticus testaceus, elytris striatis, thorace utrinque puncto notato. *Linn. Syst. Nat. II. 556. 72.*

Scarabaeus fulvus oculis nigris thorace glabro. *Geoff. Ins. I. 83. 22.*

Habitat in Europae arboreis. Larvae devorant radices, declaratae folia.

- melanocephala.* 21. M. glabra rufescens, capite nigro, elytris pallidis.

Habitat in Brasilia, *Mus. D. Banks.*

Statura et magnitudo M. brunneae. Clypeus rotundatus reflexus ater, orbita oculorum albida. Thorax rufescens, glaber, nitidus. Scutellum rufum. Elytra laevia pallida. Subtus uti et pedes rufescens.

- rufa.* 22. M. glabra rufescens elytris testaceis, clypeo quinquequedentato.

Habitat ad Cap. B. S. *Mus. D. Banks.*

Statura et magnitudo omnino M. brunneae. Clypeus margo reflexus dentibus quinque obtusissimis. Caput et thorax obscure rufescens. Elytra testacea laevia. Subtus pilis albidis hirta.

- festiva.* 23. M. supra glabra viridis thorace linea dorsali, elytris sutura nigris.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Minor M. brunnea. Caput viride nitens clypeo emarginato. Antennae ferrugineae clava nigra. Thorax viridis, glaber, nitens linea dorsali fusca. Elytra viridia nitida striis novem exarata, sutura longitudinali fusca. Corpus subtus testaceum albo pisum. Sternum porrectum subcornutum.

- laeta.* 24. M. supra glabra aurea thoracis linea dorsali scutello sanguineis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. D. Banks.*

Nimis praecedenti affinis, et forte ejus mera varietas: differt tamen colore aureo nitido, thoracis linea et scutello sanguineis elytrorumque sutura concolore.

25. M. nigro aenea elytris testaceis.

*Frischii.*Scarabaeus Iulii s. vitis. *Frisch. Inf.* 4. p. 29. tab. 14.Habitat in vite, rosa Germaniae, Brasiliae. *Dom.**Banks.*

Simillima M. horticolae, at duplo major. Caput et thorax obscure aenea, glabra, nitida. Scutellum rotundatum aeneum. Elytra testacea futura virescente.

Variat elytris thorace concoloribus.

26. M. viridis, thoracis lateribus flavis.

*Vitis.*Habitat in Americae Europae vite. *Muf. D. Hunter.*

Nimis praecedenti affinis. Corpus viride, thoracis lateribus flavis. Pedes nigri.

27. M. testacea thorace maculis duabus nigris, pedibus rufis.

*errans.*Habitat - - - - - *Muf. Dom. Tunstall.*

Statura frequentis. Caput testaceum, oculis nigris.

Clypeus integer. Thorax rotundatus testaceus maculis duabus oblongis dorsalibus nigris. Elytra testacea, substriata. Pedes rufi.

28. M. capite thoraceque coeruleo pilosis, elytris testaceis, pedibus nigris.

*horticola.*Scarabaeus horticola scutellatus muticus capite thoraceque coeruleo - subpilosus, clytris griseis, pedibus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 554. 59. *Fn. Sv.* 391.Scarabaeus capite thoraceque coeruleo - pilosis, elytris rufis. *Geoff. Inf.* I. 75. 8.

Scarabaeus ex nigro virescens, pennarum thecis rufis.

Lister. Scar. 380. 3.Scarabaeus frisius. *Linn. It. Scar.* II. 321.Habitat in Europae hortis, Pomoram devastat intacta pyro communi, *Linn.* Si mali sativi ac sylvestris folia depasci contingat, tunc chylus in intestinis contentus croceus ad picturam adhiberi potest. *Lister.*29. M. capite thoraceque coeruleo pilosis, clytris lividis, *agricola.*
clypeo apice reflexo.Scarabaeus agricola scutellatus muticus, thorace villoso, clytris lividis, limbo fasciaque nigris. *Linn. Syst.**Nat.* II. 553. 58.

Scarabaeus cyathiger. Scopol. Ent. carn. 6.

Scarabaeus agricola. Pod. Inf. 21.

Habitat in spicis fecalibus Germaniae.

Variat elytris nigro maculatis et immaculatis. Clypeus semper apice reflexus.

ruricola. 30. M. atra sericea, elytris rufis margine nigro.

Scarabaeus niger elytris croceis, margine nigro. Geoff. Hist. Inf. 1. 80. 15.

Habitat in Anglia. D. Lee.

Statura M. horticolae. Clypeus rotundatus, integer.

Caput, thorax et abdomen atra, holosericea, immaculata. Elytra rufo testacea undique cincto margine nigro holosericeo.

Variat interdum elytris obscuris, margine tamen semper obscuriore.

farinosa. 31. M. supra coeruleo, subtus argenteo nitens, clypeo integro.

Scarabaeus farinosus scutellatus muticus niger polline virescens, elytris abbreviatis. Linn. Syst. Nat. II. 555. 64. Fn. Sv. 399.

Scarabaeus violaceus et squamosus squamis subtus argenteis. Geoff. Inf. 1. 79. 13.

Scarabaeus coeruleus. Drury. Inf. 2. tab. 32. fig. 4.

Habitat in Europa australi.

Statura et magnitudo omnino M. argenteae. Supra tota polline coeruleo nitidissimo adspersa. Thorax latior quam in reliquis, et elytra parum abbreviata. Subtus argenteo nitens colore viridi resplendente. Aqua calida imbuta color coeruleus in vivacissimum viridem transit.

argentea. 32. M. clypeo marginato niger subtus argenteo nitens, elytris testaceis.

Scarabaeus argenteus. Scopol. n. 9.

Scarabaeus argenteus. Pod. Inf. 20.

Habitat in Angliae floribus frequens.

Descriptio Scopoli omnino convenit, at valde dubito, an haec sit species a Linnaeo pro *S. farinosa* descripta, quamvis idem synonymon Scopoli adfert, quam elytra nec nigra nec polline virescens adspersa. Pedes testacei posticis parum elongati.

elongatis. Elytra abdomine breviora postice gibba.
Affinis M. horticolae, attamen distincta species.

33. M. corpore polline virescenti-argenteo, elytris per-
dibusque testaceis. *pulveru-*
lenta.

Habitat Strasburgi.

Statura omnino M. argenteae, at duplo minor. Cly-
peus submarginatus. Thorax polline obscuriore
adspersus. Elytra testacea abdomine breviora. Sub-
tus nitida, viridi argentea, farinosa.

34. M. clypeo reflexo integro, corpore nigro glabro. *sylvicola.*

Habitat in nova Hollandia. *Muf. D. Banks.*

Statura M. ruricola, at minor. Clypeus rotundatus
margin'e reflexo integro. Caput et thorax glabra,
nigra, immaculata. Antennae fuscae. Elytra abdo-
mine breviora, laevia, nigra.

Variat interdum elytris fuscis.

35. M. flavescens pedibus rufis, thorace subspinoso. *subspina-*

Habitat in Iamaica.

Statura et magnitudo omnino M. argenteae. Anten-
nae rufae lamellis nigris. Corpus totum griseum,
immaculatum. Thorax in medio exserit dentem
brevisimum, obtusissimum. Pedes rufi plantis
nigris.

36. M. atra tomento cinereo villosa. *mutabilis.*

Habitat Tranquebariae. *Koenig.* Minor reliquis,
tota atra, at tomento cinereo subtilissimo tecta,
quo cinereo colore certo situ resplendet.

37. M. obscure aenea, elytris tomento cinereo nitidulis. *vericolor.*

Habitat ad Sierra Leon Africæ. *Muf. Dom. Banks.*

Parva statura M. mutabilis. Caput aeneum clypei
margin'e subreflexo. Thorax aeneus obscurus mi-
nime nitens. Scutellum breve, acutum. Elytra
striata obscure aenea certo situ tomento cinereo
resplendentia.

38. M. clypeo integro reflexo testacea glabra, capite atro. *monticola.*

Habitat in nova Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*

Minuta. Caput atrum, clypeo integro reflexo. An-
tennae testaceae. Corpus testaceum. Elytra abdo-
mine multo breviora nitidula.

- humura-* 39. M. atra elytris basi punctoque medio pallidis.
lis. Habitat in Europa. *Mus. Dom. Tunstall.*
 Parva. Caput atrum, clypeo reflexo truncato integro.
 Thorax ater immaculatus. Elytra substriata basi
 pallida puncto nigro. Punctum parvum pallidum
 in medio elytrorum. Pedes nigri.
- vittata.* 40. M. cyanea pilosa, elytris testaceis lineis tribus al-
 bicantibus.
Petiv. Gazoph. tab. II. fig. 12.
 Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*
 Statura M. horticolae, at magis oblonga et major.
 Clypeus truncatus. Caput, thorax et scutellum
 cyanea valde pilosa. Elytra abdomine paullo bre-
 viora testacea, lineis tribus e villis albicantibus ex-
 arata. Subtus hirta.

5. TRICHIUS. *Palpi quatuor filiformes.* *Maxilla bifida.* *Antennae lamellatae.*

- fasciatus.* 1. T. niger tomentoso-flavus elytris fasciis tribus nigris
 abbreviatis.
 Scarabaeus fasciatus scutellatus muticus niger tomen-
 toso-flavus, elytris fasciis duabus luteis, coadunatis.
Linn. Syst. Nat. II. 556. 70. Fn. Sv. 395.
 Scarabaeus niger hirsuto-flavus, elytris luteis, fasciis
 tribus nigris interruptis. *Geoff. Ins. I. 80. 16.*
Drury. Ins. I. tab. 36. fig. 2.
 Delectatur floribus umbellatarum.
- indus.* 2. T. thorace hirsuto, elytris lividis fusco maculatis.
Linn. Syst. Nat. II. 556. 71. Mus. Reg. L. V. 27.
 Habitat in India.
 Videtur hujus generis, quamvis Cetoniis valde affi-
 nis sit.
- bibens.* 3. T. capite thoraceque viridi aeneis pilosis, elytris
 testaceis viridi nitentibus.
 Habitat in America. *Mus. Dom. Tunstall.*
 Statura M. horticolae. Caput viridi-aeneum pilosum
 clypeo emarginato. Thorax viridi aeneus nitens
 pilosus.

pilosus. Elytra abbreviata testacea viridi colore nitida. Abdomen et pedes viridia pilosa.

4. T. thorace tomentoso rugis duabus longitudinalibus marginato, clytris abbreviatis. *hemipterus.*

Scarabaeus hemipterus scutellatus, muticus thorace tomentoso rugis duabus longitudinalibus marginato, clytris abbreviatis. *Linn. Syst. Nat. II. 555. 63.*

Scarabaeus ater depresso et squamosus, maculis albis variegatus, clytris abdomine brevioribus, foemina aculeo ani. *Geoff. Ins. I. 78. 12.*

Habitat in Europa.

Larvae ligno vicitant, declaratae floribus.

5. T. glaber cyaneus elytris lunulis duabus albis. *lunulatus.*

Habitat in Carolina. *Mus. Brit.*

Statura & magnitudo T. hemipteri. Capitis clypeus emarginatus. Corpus cyaneum maculis duabus lunatis albis ad marginem exteriorem elytrorum. Elytra abdomine multo breviora.

6. T. capite thoraceque aeneis villosis, elytris testaceis *piger.* albo maculatis.

Habitat in Marylandia. *Mus. Brit.*

Statura T. lunulati. Totus villosus. Clypeus emarginatus. Segmentum ultimum abdominis prominent, testaceum, macula utrinque oblonga, alba.

7. T. thorace nigro triangulo albo, clytris testaceis, *Delta.* puncto fusco.

Scarabaeus Delta scutellatus, muticus, flavus, thorace atro, triangulo flavo, elytris testaceo-flavis, nigro trimaculatis. *Forster. Cent. I. 7. 7.*

Scarabaeus Delta. *Drury. Ins. 2. tab. 30. fig. I. 2.*

Habitat in America.

Statura omnino T. pigri. Antennae ferrugineae, clava nigra. Caput porrectum atrum lineola transversa punctisque duobus verticis albis. Thorax holosericeus niger, margine omni triangulo dorsali albis. Apex trianguli postica respicit. Scutellum nigrum punctis duobus albis.

C 5 Elytra

Elytra laevissima abbreviata testacea, puncto medio fuso. Sutura fusca basi albicat. Abdomen ultimo segmento majori prominet niveum. Pedes testacei plantis nigris. Femora postica incurva crassiora.

6. CETONIA. *Maxilla apice setosa.*

Labium coriaceum emarginatum palpos tegens.

Antennae lamellatae.

micans. 1. *C. viridis nitens*, clypeo porrecto recurvo bifido, tibiis anticis serratis.

Scarabaeus micanus. Drury. Inf. tab. 32. fig. 3.

Habitat in Africa. *Dom. Drury.*

Statura omnino et magnitudo *C. chinensis*. Capitis clypeus viridis, carinatus spina parva utrinque inter oculos. Denticuli duo parvi elevati in medio, et duo alii ad apicem clypei. Carina excurrit in dentem elongatum fere longitudine capitis, compressum, recurvum, bifidum, laciis divergentibus. Thorax laevis nitidus viridis, immaculatus. Scutellum triangulare acutum. Elytra abdomine paullo breviora, acuminata nitentia. Sternum antice porrectum latum obtusum, linea longitudinali tenuissima ferruginea. Pedes antici elongati tibiis serratis et taris sub unguibus fasciculo pilorum. Ultimum abdominis segmentum prominet puncto parvo utrinque impresso.

chinensis. 2. *C. aenea clypeo emarginato subspinoso*, thorace postice lobato, elytris acuminatis.

Scarabaeus chinensis. Forster. Cent. Inf. 2. 2.

Habitat in China. *D. Banks.*

Statura et magnitudo omnino *C. nigratae*. Clypeus cylindricus, late emarginatus, apicibus subspinosis. Thorax et clytra viridi aenea immaculata, laevis. Thorax postice productus, lobatus. Scutellum parvum, conicum. Elytra acuminata. Sternum prominens, obtusum. Subtus castanea parum nigro-maculata. Fulera postica nigra, puncto rubro. Tarsi omnes nigri.

3. *C.*

5. *C. glabra* atra, clypeo emarginato subspinoso, thorace *Nigrita*.
postice lobato.

Hermann. Mus. pag. 17. n. 257.

Pet. Gaz. tab. 28. fig. 3.

Habitat Ceylonae. Mus. Brit.

Statura omnino *C. nitidae*, at triplo major, tota atra, laevis, nitida. Clypeus quadratus late emarginatus, apicibus porrectis, acutis. Thorax laevis, glaber, ater, macula laterali brunnea, obsoleta. Scutellum parvum, depresso, acutum. Pedes pieci.

4. *C. aurata*, segmento abdominis primo lateribus unidentatis, elytris albo maculatis.

aurata.

Scarabaeus auratus scutellatus, muticus, auratus, segmento abdominis primo lateribus unidentatis, clypeo planiusculo. *Linn. Syst. Nat.* II. 557. 78. *Fn. Sv.* 400. *Scop. Ent. carn.* 17.

Scarabaeus viridi aeneus, thoracis parte prona antice prominente. *Geoff. Inf.* I. 73.

Scarabaeus arboreus viridis f. *Scarabaeus auratus* dictus. *Frisch. Inf.* 12. pag. 25. tab. 3. fig. 1.

Scarabaeus major, corpore breviore, alarum elytris et thoracis tegmine colore viridi splendentibus. *Raj. Inf.* 76. 7.

Scarabaeus chlorochryflos. *Worm. Mus.* pag. 342.

Scarabaeus auratus. *Roeff. Inf.* II. *Scarab.* I. tab. 2.

Habitat in Europae lignis putrescentibus, formicarum acervis.

Larva quisquiliis, imago floribus delectatur.

Imago tacta per anum ejicit liquorem foetidissimum.

Variat magnitudine et colore, interdum totus ater.

5. *C. aurata*, abdome postice albo punctato, elytris rugosis. *nobilis.*

Scarabaeus nebulosus scutellatus, muticus, auratus, abdome postice albo punctato. *Linn. Syst. Nat.* II. 558. 81. *Fn. Sv.* 401.

Scarabaeus viridis nitens, thorace infra aequali non prominente. *Geoff. Inf.* I. 73. 6.

Scarabaeus viridi aeneus, thorace sulcato, elytris rugosis. *Vdm. Diff.* I.

Scara-

Scarabaeus auratus secundus. *Roeſ. Inf. II.* *Scarab. I.*
tab. 3. fig. 1-5.

Habitat larva in ligno putrescente, imago in floribus
praesertim umbellatis.

Larva grisea capite sanguineo, pedibus flavescenti-
bus.

Variat colore, magnitudine.

8 punctata 6. *C. nigra*, thorace utrinque puncto bascos, elytrisque
duobus flavis.

Habitat in Germania. *Dom. Schulz.*

Statura et magnitudo *C. nobilis*. Corpus atrum, puncto
flavo utrinque ad basin thoracis. Puncta duo in
elytris, interiore minutissimo. Punctum oblongum
utrinque in ultimo abdominis segmento.

nitida. 7. *C. thorace postice lobato*, capite spina recumbente,
sterno cornuto.

Scarabaeus nitidus scutellatus muticus, thorace postice
lobato, capite spina recumbente, sterno porrecto.

Linn. Syst. Nat. II. 552. 51. *Mus. Lud. Vlr. 20.*

Scarabaeus nitidus. *Drury. Inf. I.* tab. 33. fig. 5. 6.

Roeſ. II. *Scar. I.* tab. B. fig. 4.

Habitat in Carolina.

Chrysis. 8. *C. scutello elytris dimidio breviore*, sterno porrecto,
corpo viridi.

Scarabaeus Chrysis scutellatus muticus, sterno porrecto,
scutello elytris dimidio breviore. *Linn. Syst. Nat. II.*
551. 49. *Mus. Lud. Vlr. 21.* *Gronov. Zoopl. 428.*
tab. 15. fig. 8.

Habitat in America australi.

Lanius. 9. *C. exscutellata lucida nigro maculata*, sterno antice
cornuto.

Scarabaeus lanius exscutellatus muticus ruber adspersus
punctis nigris. *Linn. Syst. Nat. II.* 557. 77.

Drury. Inf. I. tab. 33. 8.

Scarabaeus rufus elytris nigro maculatis. *Roeſ. Inf. II.*
Scarab. I. tab. B. fig. 3.

Scarabaeus e rubro cinereus minor, maculis nigris nota-
tus. *Sloane Jam. II.* tab. 237. fig. 7. 8.

Habitat in America.

Statura

- Statura C. nitidae: tota livida nigro punctato inaculataque.
- Roeselii* figura omnino convenit, at nostra minus rubra.
10. C. picea, abdominis segmentis margine albis, clypeo emarginato, sterno cornuto. *triflris.*
- Habitat in America. *Mus. Dr. Hunter.*
- Minor C. Lanio. Clypeus porrectus emarginatus. Thorax niger immaculatus postice productus. Elytra picea linea una alterave elevata. Sternum breve cornutum. Abdomen piceum segmentorum marginibus albis, qui tamen color haud usque ad medium extenditur.
11. C. ferrugineo flavescens, elytris virescentibus, sterno cornuto. *smaragdula.*
- Habitat in America. *Mus. Dom. Hunter.*
- Statura C. chryseos. Caput et thorax obscure flavescencia. Thorax triangulus. Elytra virescentia. Corpus ferrugineo flavescens, ab domine obscuriore. Tibiae posticae punctis impressis.
12. C. aeneo atra, thorace inaequali, scutello sulco longitudinali. *Eremita.*
- Scarabaeus Eremita scutellatus muticus, aeneo ater, thorace inaequali, scutello sulco longitudinali. *Linn.* *Syst. Nat.* II. 556. 74. *Scopoli Ent. carn.* 15.
- Scarabaeus magnus piceus. *Roef. Inf.* II. Scarab. I. tab. 3. fig. 6.
- Habitat in truncis putridis pyri, salicis. Statura C. nobilis, at triplo major. Recens odorem spargit corii russici.
13. C. thorace lineis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis incisuris barbatis. *fascicularis.*
- Scarabaeus fascicularis scutellatus, muticus, thorace lineolis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis incisuris barbatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 557. 75. *Mus. Lud. Vlr.* 26.
- Scarabaeus fascicularis. *Drury. Inf.* I. tab. 33. fig. 2.
- Habitat in Africa.
- Subtus tota luna heluola fasciculatim tecta.

capensis. 14. *C. hirta rufa, albo punctata.*

Scarabaeus capensis scutellatus muticus, rufus, hirtus, adspersus punctis albis. *Linn. Syst. Nat. II. 556. 73.*
Mus. Lud. Vlr. 30.

Scarabaeus capensis pilosus, vaginis rubris plurimis punctulis albis adspersus. *Petriv. Gazoph. tab. 8. fig. 6.*

Scarabaeus rufus albo punctatus. *Roeſ. Inf. II. Scarab. I. tab. B. fig. 6.*

Drury. Inf. I. tab. 33. fig. 3.

Habitat in Africa.

margi- nata. 15. *C. glabra atra, thoracis elytrorumque marginibus rufis.*

Scarabaeus marginatus. *Drury. Inf. 2. tab. 32. fig. 1.*

Habitat in Indiis. *Mus. Brit. In Sierra Leon Africæ.*
Mus. Dom. Banks.

Statura C. nitidae. Clypeus emarginatus omnino inermis. Thorax niger, margine antico et lateralè rufis. Elytra glabra, atra, margine laterali et postico late rufis.

margi- nella. 16. *C. viridis, thoracis elytrorumque margine ferrugineo.*

Habitat in Sierra Leon. *Mus. Dom. Tunstall.*

Statura C. marginatae. Color supra obscure viridis, margine thoracis et elytrorum ferrugineo. Subtus viridis nitens, abdomine utrinque lineis duabus macularum albidarum. Sternum breve obtusissimum capitatum. Ultimum abdominis segmentum prominet maculis quatuor albidis.

lineola. 17. *C. nigra lineola flava à capite ad scutellum ducta.*

Scarabaeus lineola. *Linn. Syst. Nat. II. 552. 53.*

Scarabaeus parvus niger, lituris flavo brunneis. *Roeſ. Inf. II. Scarab. I. tab. B. fig. 7.*

Habitat in America.

Variat elytris albo maculatis.

fasciata. 18. *C. nigra thoracis margine elytrisque testaceis; elytris futura fasciaque dentata nigris.*

Habitat Alexandriae. *D. Forſkäbl.*

Corpus nigrum statura C. thoracicae. Thorax niger, margine antico et lateralè testaceis. Elytra testacea futura fasciaque postica dentata nigris.

19. C.

19. *C. nigra*, thorace ferrugineo, elytris nigris subpurpurascentibus. *thoracica*.

Habitat Alexandriae. *D. Forskäbl.*

Major *C. auratae*, atra. Thorax ferrugineus, basi niger.

Elytra obscura purpureo colore imprimis ad margines tincta.

20. *C. testacea* thorace lineis punctisque duobus, elytris *olivacea*. maculis quatuor transversis nigris.

Habitat in Sierra Leon Africæ. *Dom. Tunstall.*

Statura praecedentis. Caput nigrum immaculatum.

Thorax testaceus, lineis duabus latis dorsalibus et puncto utrinque parvo lateralè nigris. Scutellum testaceum margine nigro. Elytra obtusa testacea, maculis quatuor magnis transversalibus nigris, quae tamen marginem exteriorem haud attingunt. Subtus olivacea, abdominis segmentis apice nigris. Sternum breve obtusum.

21. *C. nigra*, thorace quinquelineato, elytris albo maculatis acuminatis. *picta*.

Habitat in Oriente. *Forskäbl.*

Statura et magnitudo *C. lineolae*. Caput nigrum, lineolis duabus maculaque utrinque oculari albis. Thorax niger lineis quinque albis. Scutellum triangulum nigrum linea alba, quae basin haud attingit. Elytra acuminata antice punctis albis substriata, postice maculata. Ultimum abdominis segmentum prominens album linea nigra. Subtus alba linea media atra.

22. *C. nigra*, thoracis margine ferrugineo. *limbata*.

Habitat in Aegypto. *D. Forskäbl.*

Statura praecedentium obscure nigra haud nitida. Thorax margine antico et laterali ferrugineis. Linea parva purpurascens in dorso elytrorum ad futuram.

23. *C. cyanea*, thoracis margine elytrisque testaceis. *splendida*.

Habitat in India.

Statura *C. Chryseos*. Corpus totum glabrum nitens.

Caput, thorax, scutellum et abdomen cyanea. Thoracis margo et elytra testacea. Scutellum fere longitudine dimidii elytri.

cuprea. 24. *C. cuprea* nitida, thorace scutello elytrisque viridibus.

Habitat - - - - *Mus. Dom. Tunstall.*

Magnitudo *C. auratae.* Caput cupreum clypeo truncato integro. Thorax viridis nitidus postice emarginatus. Scutellum triangulare. Elytra viridia, laevia immaculata. Subtus tota colore cupri fusi vivacissimi. Sternum breve obtusum.

africana. 25. *C. aenea* nitens, capitis spina incumbente: sterno porrecto.

Scarabaeus africanus. *Drury. Inf. 2. tab. 30. fig. 4.*

Habitat in Africa, Sierra Leon.

Statura *C. auratae.* Capitis clypeus apice reflexus, in medio spina parva incumbente armatus. Thorax aeneus, nitidus, laevissimus, immaculatus. Scutellum triangulare acutum. Elytra aenea nitida striato punctata apice obtusa. Sternum valde porrectum. Subtus concolor atomis minutissimis fuscis irrorata. Alae coerulecentes. Pedes aenei plantis nigris.

futuralis. 26. *C. thorace nigro margine rufo, elytris aeneo nitidis sutura nigra.*

Habitat in Africa. *Drury.*

Statura et magnitudo *C. africanae.* Caput deest. Thorax elevatus laevis ater nitens margine obscure rufo, puncto parvo nigro. Scutellum triangulare nigrum. Elytra aenea laevissima sutura apice colloque baseos nigris. Sternum porrectum. Abdomen piceum. Pedes picci five obscure ferruginei apicibus nigris.

fulgida. 27. *C. aenea* nitidissima, abdominis ultimo segmento prominente quadripunctato.

Habitat - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Minor praecedenti. Capitis clypeus integer. Thorax aeneus parum ferrugineo mixtus, nitidissimus. Scutellum triangulare breve. Elytra viridia nitida ferrugineo mixta postice gibba. Sternum breve apice rotundatum. Abdomen aeneum utrinque lineis duabus macularum albidarum. Ultimum segmentum prominet punctis quatuor albis. Anus rufus. Pedes testacei geniculis nigris.

28. C. atra nitida, clypeo truncato, reflexo, sterno obtuso. *gagates.*

Scarabaeus Gagates. Forster. Cent. Inf. 6. 6.

Habitat ad Sierra Leon. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, tota atra glabra. Capitis clypeus truncatus, obtusus, reflexus. Thorax ater nitens, postice emarginatus. Scutellum triangulare, breve, acutum. Elytra obtusa nitida, postice gibba. Sternum obtusum.

29. C. atra, scutello elytris dimidio breviore, pedibus tringuiulatis, pollice fixo. *tetrada.*

Scarabaeus tetradactylus scutellatus, muticus, niger, pedibus triunguiulatis, pollice fixo. Linn. Mant. p. 530.

Scarabaeus tetradactylus. Drury. Inf. 1. tab. 33. fig. 7.

Scarabaeus major niger. Sloan. Fam. Tom. II. 237. fig. 2.

Habitat in America.

Statura et magnitudo C. chryseos, at tota atra.

30. C. nigro aenea, elytris lineis duabus elevatis alboque maculatis. *lurida.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Clypeus rotundatus, integer. Thorax niger aeneus, obscurus, vase punctatus, postice emarginatus. Scutellum triangulare acutum. Elytra obtusa, nigra, albo maculata. Lineae duae elevatae, postice coeuntes, apicem haud attingunt. Sternum breve obtusum.

31. C. aenea, opaca, elytris acuminatis albo maculatis.

Habitat ad Suratte Indiae. *Mus. Brit.*

Similis C. philippensi, at duplo minor et minime nitens.

Clypeus subrotundus, integer. Thorax aeneus, immaculatus. Elytra postice acuminata, obscure aenea, parum albo maculata.

*anrichal-
cea.*

32. C. aenea, nitida, thorace margine punctisque duobus albis, elytris maculatis acuminatis. *philippensi.*

Petiv. Gazoph. fis. tab. 26. fig. 7.

Habitat in insulis Philippinis. *Mus. Brit.*

Statura C. auratae, at paullo major. Clypeus valde emarginatus. Thorax rotundatus, aeneus, nitens margine

D punctis-

punctisque duobus dorsalibus albis. Elytra viridia,
splendida, albo maculata, postice acuminata.

fasciata. 33. C. viridi fusca, obscura, thorace margine punctisque,
elytris fascia media maculisque niveis, postice acu-
minatis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Caput fuscum, lineis duabus baseos albis. Clypeus
emarginatus. Thorax obscure virescens, margine
laterali punctisque utrinque duobus albis, posteriore
majore. Scutellum triangulare, immaculatum. Elytra
obscure virescens, fascia in medio undata, quae ta-
men futuram haud attingit, maculisque plurimis albis.
Sternum breve obtusum. Pedes fusci immaculati.

*acumi-
nata.* 34. C. obscure aenea, pallido maculata, elytris acuminatis.
Habitat ad Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo C. hirtellae. Thorax rotundatus
et elytra obscure aenea, pallido maculata. Elytra
postice ad futuram excurrunt in spinam compressam,
acutissimam. Scutellum triangulare, immaculatum.
Subtus aenea, lateribus albo maculatis.

areata. 35. C. nigra pubescens elytris disco rufo.

Habitat in Virginia. *Mus. Brit.*

Statura C. hirtellae; ideoque hic referto. Caput nobis
deficit. Thorax niger pubescens. Elytra glabra,
postice gibba, ad futuram linea unica elevata, nigra,
disco ferrugineo. Abdomen nigrum.

hirta. 36. C. nigricans, hirta, elytris pallido maculatis, thorace
carinato.

Scarabaeus hirtellus, scutellatus, muticus, hirtus, testaceo
nigricans, elytris pallido maculatis. *Linn. Syst. Nat.*
II. 556. 69.

Scarabaeus hirtus. *Scopoli Ent. 8.*

Scarabaeus hirtus. *Pod. Inf. 21.*

β. Scarabaeus squalidus, scutellatus, muticus, niger, hirtus,
thorace subcarinato. *Linn. Syst. Nat. II. 556. 68.*
Scop. Ent. carn. 13.

Habitat in Europa australi. Vix specie differt β,
quamvis elytra minus maculata.

37. *C. clypeo emarginato, nigra, albo maculata, abdomine subtus punctis quatuor albis.* *stictica.*

Scarabaeus sticticus scutellatus, muticus, nigro glaber, punctis albis sparsis, abdomine subtus punctis quaternis albis. *Linn. Syst. Nat. II. 552. 54.*

Scarabaeus nigro coerulescens, maculis albis sparsis, ordine macularum abdominalium longitudinali. *Geoff. Hist. Inf. I. 79. 14.*
Raj. Inf. 104. 8.
Habitat in Galliae carduis.

38. *C. nigra, thorace rufo nigro maculato, elytris nigris, vericolor.*
albo punctatis, dorso rufo.

Habitat in Aegypto. *Forskäbl.*

Statura et magnitudo C. hirtellae. Caput atrum. Thorax rufus, antice maculis duabus magnis nigris, linea-
laque marginali cinerea. Margo tamen ipse parum
elevatus, tenuissime niger. Scutellum triangulare
nigrum, puncto apicis albo. Elytra nigra, punctis
sparsis albis et disco macula magna oblonga ferru-
ginea. Abdomen atrum, marginibus quoque albo
maculatis.

Variat maculis atris thoracis albo pupillatis et coccis.

39. *C. testacea capite, thoracis lineis duabus, elytris futura maculisque tribus nigris.* *Histrion.*

Habitat in Aegypto. *D. Forskäbl.*

Caput nigrum, immaculatum. Thorax testaceus, lineis
duabus dorsalibus apice convergentibus nigris. Scu-
tellum triangulare, testaceum. Elytra acuminata testa-
cea, futura et maculis tribus nigris posteriore trans-
versa. Subtus picca, punctis plurimis albis.

40. *C. atra, thorace margine elytrisque maculis sparsis variegata.*
albis.

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Statura C. sticticae. Caput atrum, immaculatum. Tho-
rax ater margine albo. Scutellum atrum puncto albo.
Elytra obtusa, atra, maculis plurimis sparsis albis.
Anus sive ultimum abdominalis segmentum prominet
maculis duabus majoribus albis. Pedes nigri.

- Hatten-torra.* 41. C. atra glabra, elytris postice punctis duobus albis.
Habitat ad Cap. B. S. *Muf. Dom. Banks.*
Statura reliquis longior et angustior. Caput atrum.
Clypeo obtuso integro. Thorax ater, glaber, nitens,
postice rotundatus. Elytra basi gibba vix striata, atra,
apice pari punctorum alborum notata. Ultimum
abdominis segmentum prominet macula utrinque ob-
scure picea. Pedes atri. Sternum abbreviatum.

7. HISTER. *Maxilla* unidentata.

Labium cornuum, cylindricum,
integrum.

Antennae clavatae.

- major.* 1. H. ater, elytris substriatis, thoracis marginibus ciliatis.
Linn. Syst. Nat. II. 566. 2.
Habitat in Africa.
Simillimus H. unicolori, at duplo major, et thorax pilis
ferrugineis densis ciliatus.

- unicolor.* 2. H. ater, elytris oblique striatis. *Linn. Syst. Nat. II.*
567. 3. Scopoli Ent. carn. 30. Fn. Sv. 440.
Attelabus totus niger, elytris laevibus nonnihil stria-
tis. *Geoff. Inf. I. 94. tab. I. fig. 4.*
Scarabaeus antennis globulosis, media parte in annu-
lum flexis, septimus. *Raj. Inf. 91. 7. Sulzer. Inf.*
tab. 2. fig. 8. 9.
Habitat in Europae, Americae arena, stercore.

- cyaneus.* 3. H. thorace aeneo, elytris coerulecentibus.
Habitat in nova Hollandia. *Dom. Banks.*
Statura et magnitudo H. unicoloris. Caput obscurum.
Thorax aeneus nitidus, laevis, margine obscuro
subpunctato. Elytra coerulecentia, nitidissima, ab-
breviata, basi oblique striata. Corpus coerulescens.
Pedes nigri.

- brunneus.* 4. H. ferrugineus, elytris substriatis.
Habitat in Sveciae stercoribus. *Muf. Dom. Banks.*
Simillimus H. unicolori, at color totus brunneus.

5. *H. ater*, elytris laeuisimis. *Linn. Syst. Nat.* I. 567. 4. *pygmaeus*.
Fn. Sv. 441.

Habitat in Europa boreali.

Nimis affinis videtur *H. unicolor*.

6. *H. ater*, elytris crenato striatis, striis interioribus abbreviatis. *abbreviatus.*

Habitat in America boreali. *D. Drury.*

Statura omnino *H. pygmaei*, ater, nitidus. Elytra striis quatuor crenatis, et inter has et futuram duo brevissimi apices.

7. *H. ater*, elytris postice rubris. *Linn. Syst. Nat.* I. 567. 5. *2maculatus.*
Fn. Sv. 442.

Attelabus niger, elytro singulo, macula rubra. *Geoff. Inf. I. 95. 2.*

Hister fimetarius. Scop. Ent. 31.

Coccinella, atra, glabra, elytris abdomine brevioribus, maculis duabus rubris. *Vdm. Diff.* 80.

Habitat in stercore bovino.

An satis distinctus ab *unicolori*?

8. *H. ater*, elytris bimaculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 567. 6. *4maculatus.*
Fn. Sv. 443.

Scarabaeus ovatus niger, glaber, maculis duabus rubris in singulo elytro. *Gud. Satag.* 76.

Habitat in Europa boreali.

Saepius maculae cohaerent in unicam lunatam. Affinis valde *H. bimaculato*.

9. *H. aeneus*, elytris basi striatis apice punctatis. *aeneus.*
Attelabus nigro cupreus, capite nonnihil pominulo.

Geoff. Hist. des Inf. I. 95. 3.

Habitat in Anglia. *Muf. D. A. Monsson.*

Statura et magnitudo *H. pygmaei*. Corpus totum aeneum, splendens. Thorax glaber. Elytra abdomine multo breviora basi, striis quatuor arcuatis impressa, quae vix medium elytrorum attingunt, apice vase punctata.

10. *H. ater*, nitens, elytris piecis, apice obscuris. *detritus.*
Habitat in nova Hollandia. Dom. Banks.

Magnitudo praecedentis, totus ater, nitens, elytra basi subpicea nitida, striis quatuor obliquis, lateralibus minoribus, apice obscura, punctata, et quasi detrita.

8. APATE. *Palpi filiformes aequales.**Maxilla unidentata.**Labium membranaceum truncatum.**Antennae perfoliatae.*

muricatus. 1. A. *elytris reticulatis, postice retusis dentatis, thorace muricato gibbo.*

Dermestes muricatus niger, elytris postice retusis, dentatis, thorace muricato. *Linn. Syst. Nat. II. 562. 6.*
Habitat in Africæ lignis.

Descriptio Linnaei omnino quadrat, at D. Lardario fere quadruplo major, et elytra profunde reticulata.

Monachus. 2. A. *elytris obtusis, retusis, thorace gibbo truncato.*

Habitat in America. *Dom. Drury.*

Summa affinitas A. muricati, et forte ejus varietas.
Caput atrum, fronte pilis densis elongatis rufis tectum. Thorax globosus, ater, antice ad latera denticulis brevibus, elevatis, numerosis truncatus. Elytra nigra, punctata, lineisque elevatis tribus laevibus, postice obtusa integra. Abdomen piceum.

Jesuita. 3. A. *elytris integris variolosis, thorace antice truncato.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentium. Antennae perfoliatae, nigrae, apice ferrugineae. Thorax rotundatus, ater, antice dentibus plurimis elevatis acutis muricatus. Elytra punctis latioribus striata, basi punto gibbo, apice vix retusa, integra. Pedes nigri.

Minutus. 4. A. *niger, elytris integris piceis, thorace antice scabro,*

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura exacte praecedentium, at decuplo minor. Antennae flavescentes, perfoliatae. Thorax rotundatus, gibbus antice niger, punctis elevatis scaber. Elytra integerrima, laevia, et pedes testacei.

9. DERMESTES. *Palpi inaequales filiformes.**Maxilla bifida.**Labium corneum, obtusum, integrum.**Antennae clava perfoliata.*

1. *D. niger*, elytris antice cinereis. *Linn. Syst. Nat. II. lardarius.*

561. I. Geoff. Inf. I. 101. 5. Fn. Sv. 408.

Scarabaeus antennis clavatis clavis in annulos divisus quartus. *Raj. Inf. 107. I.*

Scarabaeus lardi parvus fascia transversali elytrorum nigro-fuseorum albida. *Frisch. Inf. 5. 25. tab. 9.*

Habitat larva ovata cinerea glabra in animalibus affervatis lardo, carnibus, repositoriis culinariis et musaeis infesta.

Scybala inter vorandum ex ano protrudit, concavata pendula. Olea et pinguedines expedit aliis lethales. Varietatem misit *D. de Hattorf*, elytris antice ferrugineis: an distincta species?

2. *D. niger*, elytris antice testaceis, abdome albo. *carniforous.*

Habitat in nova Hollandia et Zelandia. *Muf. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo *D. Lardarii*. Antennae fuscae clava ferruginea. Caput et thorax nigra lateribus griseo villosis. Elytra nigra, antice testacea. Abdomen subtus album. Pedes nigri.

3. *D. niger*, ore ferrugineo. *cadaverinus.*

Habitat in insula St. Helenae. *Muf. D. Banks.*

Statura et summa affinitas praecedentis. Antennae fuscae clava ferruginea. Os ferrugineum. Elytra tota nigra. Abdomen subtus cinerascens.

4. *D. niger*, elytris puncto albo. *Pellio.*

Dermestes Pellio niger coleoptris punctis albis binis, *Linn. Syst. Nat. II. 562. 4. Fn. Sv. 411. Geoff. Inf. 100. 4. Scop. Inf. carniol. 37.*

Scarabaeus parvus corpore brevi fuscō, elytris puncto albo notatis, *Raj. Inf. 85. 35.*

Scarabaeus lardi larva brunnea, cauda setosa longiori, *Frisch. Inf. 5. 22. tab. 8.*

Habitat in pelliis, lardo. Elytra colore variant,
mox obscuriora, mox dilucidiora.

Larva oblonga, pilosa, cauda setosa.

undatus. 5. D. oblongus, niger, elytris fascia alba linearis duplice.
Linn. Syst. Nat. II. 562. 3. *Fn. Sv.* 410.

Habitat in Europae putridis, suffocatis.

Statura D. pellionis, at loco puncti elytrorum fasciae
duae undulatae.

20 gutta- 6. D. oblongus, ater, punctis viginti albis.
tus. Habitat Halae Saxonum. *D. Schaller.*

Statura omnino et magnitudo D. undati. Corpus
atrum, glabrum. Punctum e pilis albis utrinque
ad basin thoracis, et novem in singulo elytro. Ab-
domen nigrum certo situ albicans,

murinus. 7. D. oblongus, tomentosus, nigro alboque nebulosus,
abdomine niveo.

Dermestes murinus tomentosus, oblongus, fusco cine-
reoque nebulosus, scutello luteo. *Linn. Syst. Nat.*
II. 563. 18. *Fn. Sv.* 426. *Geoff. Inf.* I. 102.

Scarabaeus erucae, nigrae, glabrae pinguedinis. *Frijch.*
Inf. 4. pag. 34. tab. 18.

Habitat in Europa, victimis cadaveribus.

Larva oblonga brunnea, ore atro.

teſſellatus. 8. D. oblongus, tomentosus, fusco cinereoque nebulosus,
abdomine fuscus.

Dermestes flavescentis, pilosus, oculis nigris. *Geoff. Inf.*
I. 100. 8.

Habitat in Angliae cadaveribus.

Statura et magnitudo omnino D. murini, cuius forte
varietas. Differt tamen colore minus nigro et albo,
et abdomine omnino fusco.

naualis. 9. D. elongatus, ferrugineo fuscus, oculis atris.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura D. murini, at quadruplo minor, totus ferrugi-
neo fuscus, elytris parum dilutioribus. Antennae
perfoliatae.

10. D. nigro coerulescens, thorace villoso. *Linn. Syst. violaceus.*

Nat. II. 563. 13. Fn. Sv. 422.

Dermestes violaceus, thorace elytrisque villosis. *Scop.*

Entom. carniol. 57.

Clerus nigro coeruleus. *Geoff. Inf. I. 30.*

Scarabaeus antennis clavatis. 12. *Raj. Inf. 100.*

Habitat in cadaveribus frequens.

11. D. violaceus, thorace elytrorumque basi rufis.

ruficollis.

Habitat in India orientali. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo D. violacei. Caput nigrum, antennis perfoliatis. Thorax glaber, laevis, rufus, immaculatus. Elytra subpubescentia punctis minutissimis striata, cyanea, basi rufa. Pectus rufum. Abdomen violaceum, basi rufum.

12. D. oblongus testaceus, oculis nigris. *Linn. Syst. Nat. fumatus.*

II. 564. 22. Fn. Sv. 432. Geoff. Inf. I. 104. 12.

Dermestes rosae. *Scopoli Ent. 39.*

Habitat in Europae floribus.

Magnitudo et statura D. undati.

13. D. oblongus, villosus, griseus, capite punctis duobus fuscis.

romente-
sus.

Habitat in Anglia.

Statura omnino D. fumati, cuius forte varietas, totus supra villis cinereis tectus. Puncta duo fusca, elevata in fronte. Pedes dilutiores.

14. D. oblongus, ferrugineus, oculis rufis. *Linn. Syst. paniculus.*

Nat. II. 564. Fn. Sv. 431.

Scarabaeus parvus, luteus panis. *Frisch. Inf. 2. 36. tab. 8.*

Habitat in pane diutius asservato.

Larva ovata, alba, nitida.

15. D. oblongus, testaceus, oculis abdominalisque basi nigris. *testaceus.*

Habitat in Belgio.

Statura D. paniculi, at triplo minor, totus laevis, glaber, testaceus, solis oculis et abdominalis basi subtus fuscis.

16. D. griseus, thorace elytrisque scabris.

scaber.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Parvus, totus griseus punctis elevatis, scaber. Thorax marginatus, margine crenulato. Antennae perfoliatae.

chinensis. 17. D. oblongus, ferrugineus, elytris striatis.

Habitat in seminibus e China acceptis.

Minor D. fumato, totus ferrugineus, glaber, elytris punctato striatis.

scanicus. 18. D. ater, thorace puncto que elytrorum testaceis.

Dermestes scanicus fuscus, thorace testaceo. *Linn. Syst.*

Nat. II. 564. 26. Fn. Sv. 437.

Habitat in Svecia.

Statura D. paniciei, at minor. Caput cum antennis perfoliatis testaceum, oculisque nigris.

Thorax testaceus. Elytra glabra, atra, nitida, puncto basos testaceo. Abdomen nigrum.

Pedes testacei.

femoralis. 19. D. castaneus, capite nigricante, thorace fusco. *Linn.*

Syst. Nat. II. 563. 15. Fn. Sv. 423.

Habitat in Europa boreali.

Magnitudo vix pediculi.

IO. MELYRIS. *Palpi* filiformes.

Maxilla unidentata, acuta.

Labium clavatum emarginatum.

Antennae totae perfoliatae.

viridis. 1. M. viridis, elytris lineis elevatis tribus.

Habitat ad Cap. B. S.

Caput sub thorace inflexum, uti in dermestide, viride, antennis perfoliatis nigris. Thorax submarginatus, margine reflexo, dorso canaliculato. Scutellum parvum rotundatum. Elytra viridia, nitida, scabra, lineisque elevatis tribus.

II. BOSTRI.

II. BOSTRICHVS. *Maxilla cornea.*

Labium cylindricum integrum, apice palpigerum.

Antennae clava solida.

1. B. niger, elytris abdomineque rubris, thorace emarginato retuso. *Capucinus.*

Bostrichus. *Geoff. Inf.* I. 302. 1.

Dermestes capucinus, niger, elytris abdomineque rubris, thorace emarginato retuso. *Linn. Syst. Nat.* II. 562. 5. *Fn. Sv.* 416.

Habitat in Europae truncis emortuis.

2. B. testaceus, pilosus, elytris striatis retusis praemorsodentatis.

Dermestes typographus testaceus, pilosus, elytris striatis retusis praemorsodentatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 562. 7. *Fn. Sv.* 418.

Scarabaeus antennis clavatis. *Raj. Inf.* 100. 10.

Habitat intra cortices truncorum labyrinthos pulvere repletus formans.

Variat colore testaceo et fusco.

typographus.

3. B. ater elytris praemorsodentatis rufis.

Dermestes calcographus ater, elytris praemorsodentatis, rufis: lateribus basique nigricantibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 562. 8. *Fn. Sv.* 417.

Habitat intra arborum cortices.

Triplo minor B. typographo.

calcographus.

4. B. glaber, elytris truncatis integris, abdomine retuso. *Scolytus.*

Scolytus. *Geoff. Inf.* I. 310. 1. tab. 5. fig. 5. mal.

Destruit ulmos Angliae. *Dom. Lee.*

Statura B. typographi, totus glaber. Antennae clava solida. Caput et thorax atra, laevissima, nitida, longitudine elytrorum. Elytra striata, picea, apice truncata integra, abdomine paulo longiora; abdomen nigrum valde retusum.

5. B.

piniperda. 5. B. niger, subvillosum, elytris piceis integris, plantis rufis.
Dermetes piniperda niger, subvillosum, elytris piceis integris, plantis rufis. *Linn. Syst. Nat.* 563. II. *Fn. Sv.* 421.

Habitat in ramulis inferioribus Pini, quos perforat, exsiccatur, destruit. *Linn.*
Statura fere curculionis.

varius. 6. B. subvillosum, corpore nigro cinereoque vario.
Habitat Hafniae.
Statura praecedentis, at paulo minor et corpus variegatum.

12. BYRRHVS. *Palpi aequales, subclavati.*
Maxilla bifida.
Labium bifidum.
Antennae moniliformes extrorsum crassiores.

pilula. 1. B. fuscus, elytris striis atris interruptis. *Linn. Syst. Nat.* II. 568. 4.
Dermetes tomentosus, ovatus, fusco nebulosus. *Linn. Fn. Sv.* 427.
Habitat in Europae fabulosis.

varius. 2. B. niger, thorace aeneo, elytris fuscis, striis tribus abbreviatis viridibus nigro maculatis.
Habitat in Anglia: captus prope Henly, die 28. Iun. *Mus. Dom. Banks.*
Statura et summa affinitas B. pillulae. Corpus subtus nigrum. Caput aeneum, antennis extrorsum crassioribus nigris. Thorax ovatus obscure aeneus, immaculatus. Elytra fusca, striis tribus nitentibus, dorsalibus viridibus fusco maculatis, quae tamen apicem elytrorum non attingunt. Pedes nigri tibiis compressi.

aeneus. 3. B. totus aeneus.
Habitat Upsaliae.
Simillimus B. pilulae, at triplo minor, supra totus aeneus, subtus marinus.

13. ANTHRENVS. *Palpi* inaequales, filiformes.

Maxilla membranacea,
linearis, bifida.

Labium corneum, integrum.

Antennae clava solida.

1. A. niger, elytris fascia alba, apice ferrugineis: litura alba. *Pimpinellae.*

Anthrenus squamosus niger, fascia punctisque coleoptrorum albis, futuris fuscis. *Geoff. Inf.* I. 114. 1.

Habitat in pimpinellae floribus Galliae.

Thorax niger, albo ferrugineoque maculatus.

2. A. niger, elytris albo maculatis, futura sanguinea.

Byrrhus Scrophulariae niger, elytris albo maculatis, futura sanguinea. *Linn. Syst. Nat.* II. 568. 1.

Scarabaeus parvus corpore subrotundo, collo oblongo, alarum elytris nigris, binis punctis albicantibus notatus. *Raj. Inf.* 85. 37.

Dermestes tomentosus maculatus, futura elytrorum rubra. *Linn. Fn. Sv.* 429.

Habitat in Scrophulariis Europae.

3. A. nebulosus, elytris subnebulosis.

Byrrhus Musaeorum nebulosus, elytris subnebulosis, puncto albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 568. 2.

Dermestes tomentosus maculatus, elytris puncto albo. *Linn. Fn. Sv.* 430.

Habitat in musaeis, animalia asservata destruens.

Simillimus praecedenti, at minor absque futura sanguinea.

4. A. niger, elytris fasciis tribus undatis albis.

Anthrenus squamosus niger, elytris fuscis, fascia triplici undulata alba. *Geoff. Inf.* I. 115. 2.

Byrrhus Verbasci fuscus, elytris fasciis tribus undulatis pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 568. 3.

Habitat in Verbasci Galliae.

Affinis B. scrophulariae, at minor.

Pimpinellae.

Scrophulariae.

Musaeorum.

Verbasci.

24. ANOBIVM. *Palpi clavati.*
Maxilla obtuse dentata.
Labium integrum.
Antennae filiformes.

pertinax. 1. A. fuscum, immaculatum.

Ptinus pertinax, fuscus, unicolor. Linn. Syst. Nat. II.
565. 2.

Byrrhus totus nigro fuscus. Geoff. Inf. I. 112. 4.

Dermestes pertinax. Linn. Fn. Sv. 414.

Destruit e ligno confecta, devoratur a Clero formicario. Captum se contrahit immobile.

molle. 2. A. testaceum, oculis nigris.

Ptinus mollis testaceus, oculis fuscis. Linn. Syst. Nat.
II. 565. 3.

Byrrhus fulvus, obscurus, oculis nigris. Geoff. Inf.
I. 112. 2.

Dermestes mollis. Linn. Fn. Sv. 415.

Habitat in Europae quisquiliis.

Affinis praecedenti, attamen distincta species.

frumenta- 3. A. testaceum, thorace ciliato, dorso plano carinato.
tium.

Habitat in pane diutius asservato: captum in nave prope Brasiliam. Mus. Dom. Banks.

Statura A. mollis, totum testaceum. Antennae porrectae, fuscae, filiformes. Thorax magis obscurus, spinis minutissimis ciliatus, dorsoque piano carinato. Elytra testacea striata.

nigrum. 4. A. pilosum, nigrum, elytris molliusculis.

Dermestes niger oblongus, pilosus, niger, elytris molliusculis. Linn. Syst. Nat. II. 564. 28. Fn. Sv. 439.

Cantharis pilosa. Scopoli Ent. 131.

Habitat in floribus Europae.

Hujus generis videtur.

lineatum. 5. A. pilosum, nigrum, elytris lineis sesquitertiis rufis.

Habitat in Brasilia. Mus. Dom. Banks.

Statura exacte praecedentis. Caput et thorax pilosa, nigra, aeneo paucō mixta. Antennae nigrae, filiformes. Elytra molliuscula, nigra margine exteriori, linea

linea basi flexuosa ad suturam, quae apicem haud attingit, et lineola in disco abbreviata rufis. Pedes nigri.

6. A. subvillosum, cyaneum, antennis nigris.

cyaneum.

Habitat in Europa australiore.

Statura et magnitudo omnino A. nigri.

15. PTINVS. *Palpi* filiformes.

Maxilla bifida.

Labium bifidum.

Antennae filiformes.

1. P. griseus, elytris postice cinereis.

Gigas.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Gigas in hoc genere. Antennae filiformes, corpore longiores, apice nigrae, articulo ultimo acuto. Caput magnum, griseum. Thorax rotundatus, griseus, lineis quatuor obsoletis fuscis, puncto albo. Elytra grisea, punctis aliquot oblongis, apiceque cinereis, abdomen et pedes cinerei.

An proprii generis?

2. P. testaceus thorace quadridentato, elytris fasciis duabus albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 566. 5.

Fur.

Bruchus testaceus elytrorum fascia duplii albida.

Geoff. Inf. I. 164. 4. tab. 2. fig. 6.

Buprestes Fur. *Scopoli. Ent.* 210.

Cerambyx Fur. *Linn. Fn. Sv.* 651.

Habitat in musaeis, pessimus, destruens herbaria, infesta, aves, vix pellendus.

3. P. fuscus, thorace subbearinato, coleoptris, macula alba *imperialis*. aquilam expansam referente. *Linn. Syst. Nat.* II. 565. 4.

Habitat in Europae borealis arboribus.

4. P. thorace bidentato, testaceus, immaculatus.

Latro.

Habitat Strasburgi. *Dom. Prof. Hermann.*

Statura et magnitudo omnino P. suris, cuius forte varietas. Antennae filiformes longitudine corporis.

Thorax

Thorax angustus, rotundatus dentibus duobus dorsibus, acutis. Elytra punctato-striata testacea, immaculata.

16. BRVCHVS. *Palpi aequales filiformes. Maxilla membranacea, bifida.*

Labium acuminatum.
Antennae filiformes.

spinosus. 1. B. antennis filiformibus, thorace elytrisque spinosis.
Habitat in Iamaica. *D. Drury.*

Statura omnino hujus generis, at reliquis major. Maxillae porrectae. Antennae filiformes longitudine dimidii corporis. Thorax rotundatus, antice angustatus, griseus, spinis tribus dorsalibus elevatis acutis. Elytra longitudine fere abdominis, grisea, spinis sparsis erectis brevibus. Corpus et pedes grisei.

Pisi. 2. B. elytris nigris albo maculatis, podice albo, punctis binis nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 604. I. M. L. VI. 35.*
Mylabris fusca, cinereo-nebulosa abdominis apice, cruce alba. *Geoff. Inf. I. 267. I.*

Curculio Piforum. *Amoenit. acad. 3. 347.*
Bruchus Americae septentrionalis. *Kalm. It. 294.*

Laria Salicis. *Scopol. Ent. Carniol. 6.*
Habitat in America septentrionali, Europa australi victans pisis. Devoratur a Gracula Quiscula. Caput et antennae nigrae. Femora subdentata.

scabrosus. 3. B. niger, elytris rufis elevato striatis, punctis nigris sparsis.

Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*

Statura B. seminarii, at paulo major. Antennae nigrae extrosum subcrassiores. Caput et thorax nigra. Elytra rufa striis elevatis scabris, punctisque aliquot nigris holofericeis sparsis.

Cacao. 4. B. corpore fusco, griseo, maculato.

Habitat in Theobromae seminibus. Corpus statura B. piforum, at paulo minor.

5. B.

5. B. elytris griseis nigro maculatis, pedibus rufis, scutello *Theobroma-*
albo. *Linn. Syst. Nat.* II. 605. 2. *miae.*
Habitat in Theobromae semenibus. Elytra punctis
striata. Thorax sublineatus.
6. B. elytris nigris, atomis albis, femoribus posticis uni- *granarius.*
dentatis.
Bruchus granarius elytris nigris; atomis albis, pedi-
bus anticus rufis: posticis dentatis. *Linn. Syst. Nat.*
II. 605. 5.
Curculio atomarius. *Fn. Sv.* 628.
Habitat in semenibus plantarum.
Antennae basi testaceae. Thorax futura alba. Elytra
striata abdomen breviora. Tibiae anticae testaceae.
7. B. ater, immaculatus, femoribus muticis. *Cisti.*
Habitat in floribus Cisti Helianthemi. *Mus. D. Banks.*
Statura praecedentium, at duplo minor.
8. B. ater, antennarum basi pedibusque anticus testaceis, *semina-*
femoribus muticis. *rius.*
Bruchus seminarius ater, antennarum basi pedibusque
anticis testaceis. *Linn. Syst.* II. 605. 6.
Mylabris nigra, abdomen albo sericeo. *Geoff. Inf.* I.
268. 3.
Habitat in floribus: captus d. 28. Jun. prope Henly
Anglorum.
De synomino *Linnaei* dubito; quum pedes omnes et
antennae totae nigrae. Statura B. granarii, at pau-
lo minor. Caput prominens, antennis quasi peduncu-
latis crassis, ferratis. Thorax antice attenuatus.
Elytra striata abdomen breviora. Pedes inermes.
9. B. elytris punctatis, testaceis, nigro maculatis, podice *macula-*
griseo punctis binis nigris. *tus.*
Habitat in America. *D. v. Rohr.*
Statura et magnitudo B. seminarii. Antennae serratae,
testaceae. Thorax testaceus, obscure fusco-macula-
tus. Elytra punctis striata, testacea, maculis tribus
magnis fuscis.
10. B. antennis pectinatis corpore longioribus, corpore *serratico-*
griseo, fusco, maculato. *nis.*
Habitat in Oriente. *Forstkäbl.*

Major pectinicorni. Antennae longitudine corporis,
valde ferratae. Thorax tomento cinereo tectus,
postice trilobus. Elytra abdomine breviora, cinerea,
falcata, abdomen et pedes cinerea.

- pectinicornis.** II. B. antennis pectinatis, corpore ferrugineo longioribus.
Bruchus pectinicornis antennis pectinatis corpore lon-
gioribus. *Linn. Syst. Nat. II. 605. 7.*
Habitat in Chinae feminibus.
Simillimus B. ferraticorni, at totus ferrugineus.

17. ELOPHORVS. *Maxilla* cornea, apice
membranacea.

Labium corneum, qua-
dratum.

Antennae clava solida.

- aquaticus.** I. E. fuscus, thorace rugoso elytrisque fusco aeneis.
Silpha aquatica cinerea, elytris substriatis, thorace emar-
ginato, longitudinaliter rugoso, virescente. *Linn.
Syst. Nat. II. 573. 25.*
Dermetes viridi aeneus, thorace fasciis quatuor eleva-
tis, elytris punctato striatis. *Graeff. Inf. I. 105. 15.*
Habitat frequens in aquis stagnantibus.

- minutus.** II. E. fuscus, thorace rugoso, aeneo, elytris pallidis.
Habitat in Angliae aquis stagnantibus. Forte E.
aquatici varietas triplo minor. Statura et color
exacte idem, exceptis solis elytris pallidis.

18. SPHAERIDIVM. *Palpi* quatuor filiformes.
Labium quadratum, emar-
ginatum.
Antennae perfoliatae.

- scaraba-**
coides. I. S. ovatum, atrum, elytris maculis duabus ferrugineis.
Dermetes Scarabaeoides ovatus, ater, glaber, elytris
maculis duabus obsolete ferrugineis. *Linn. Syst.
Nat. II. 563. 17. Fn. Sv. 428. Scop. Ent. carn. 36.*
Der-

Dermestes niger, coleoptris, punctis rubris quaternis,
elytris laevibus, subrotundis. *Geoff. Inf.* I. 106. 17.

Scarabaeus ovatus, niger, glaber, maculis duabus rubris
in singulo elytro. *Gad. Satag.* 76.

Habitat in Europae locis suffocatis.

2. *S. ferrugineum*, elytris atris.

Habitat in insula St. Helena. *Muf. Dom. Banks.*

Dytiscoides.

Statura et magnitudo *S. scarabaeoidis*, totum glabrum,
nitidum. Antennae rufae, perfoliatae. Caput,
thorax, pectus, abdomen rufa, elytra atra, glabra.

3. *S. laeve*, atrum, elytris crenato - striatis, pedibus
pallidis.

Silpha atomaria, nigra, subovata, elytris immarginatis,
pedibus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 574. 35.

atomarium.

Dermestes niger subrotundus, elytris striatis. *Geoff.*
Inf. I. 107. 19.

Habitat in stercore Angliae. *D. Banks.*

Statura *S. melanocephali*, at paulo majus, atrum,
nitens, immaculatum. Thorax glaberrimus.
Elytra crenato striata. Pedes pallidi.

4. *S. atrum* glabrum, elytris griseis: macula communi
baseos nigra.

melanocephalum.

Dermestes melanocephalus niger ovatus, glaber, ely-
tris griseis. *Linn. Syst. Nat.* II. 563. 16. *Fn. Sv.* 425.

Habitat in stercore Angliae.

Corpus atrum, laeve, nitidum. Elytra testacea, ma-
cula magna triangulari nigra ad basin. Pedes atri.

5. *S. atrum*, elytris apice rufis

haemor-

Anthribus niger ovatus, elytris apice punctis duobus
rubris. *Geoff. Inf.* I. 308. 5.

rhoidale.

Habitat in stercore bovino Angliae. *Dom. Banks.*

Statura omnino *S. atomarii*, at paulo minus. Ely-
tra vix striata, abdome paulo longiora,
apice rufa.

6. *S. atrum*, nitidum, thoracis margine elytrorumque
macula sanguineis.

4 pustula-

Habitat in nova Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*

tum.

Statura praecedentium. Antennae porrectae, perfö-
liatae, nigrae. Palpi filiformes. Thorax ater, niti-

E 2. dus

dus, margine rufo. Elytra truncata, atra, nitida, macula magna rufa versus basin, abdomen acutissimum. Pedes nigri.

fimetarii. 7. S. atrum immaculatum, elytris laevissimis.

um. Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium, totum atrum, immaculatum.

minutum. 8. S. atrum, elytris striatis, pedibus concoloribus.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus minutum, totum atrum immarginatum, elytra postice pallidiora.

pulicarii- 9. S. nigrum, oblongum, elytris abbreviatis, abdomine acuto.

Silpha pulicaria nigra, oblonga, elytris abbreviatis, abdome acuto. *Linn. Syst. Nat. II. 574. 33.*

Anthribus niger, elytris abdomine brevioribus. *Geoff. Inf. 308. 4.*

Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos divisus.

Raj. Inf. 108. 29.

Habitat in Europae floribus cursitans.

Hujus generis videtur: antennae vix clavatae, attamen tres ultimi articuli prominent.

19. TRITOMA. *Palpi* anteriores securiformes.

Labium emarginatum.

Antennae perfoliatae.

2 pustula- 1. T. atra, elytris macula laterali coccinea.

ta. Tritoma. *Geoff. Inf. I.*

Habitat in Agaricis arboreis Angliae, capta d. 17. April. ad Hamstead.

Corpus magnitudine coccinellae, totum atrum, glabrum, nitidum. Thorax postice acuminatus. Elytra striata, basi laterali macula magna coccinea, in qua punctum parvum fuscum. Pedes nigri, plantis pallidis.

2. T.

2. *T. nigra*, thoracis lateribus abdomineque rufis. *collaris.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at antennae filiformes, ideoque de genere haereo: forte potius anthrenus. Caput et thorax nigra, thoracis lateribus rufis. Elytra nigra fasciis duabus undatis, obsoletis, cinereis, ab domen rufum.

3. *T. oblonga*, nigra, elytris punctis duobus ferrugineis. *4 pustulata.*

Silpha 4. pustulata, oblonga, nigra, elytris punctis duobus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat. II. 570. 5. Fn. Sv. 446.*

Dermestes niger coleoptris, punctis rubris quaternis, elytris striatis, oblongus. *Geoff. Ins. I. 106.*

Scarabaeus parvus luteo maculatus; *erucae lanigerae.* *Frisch. Ins. 9. 36. tab. 19.*

Habitat in Europae ligno humido. De synonymo *Geoff. dubito*, nam elytra in nostra laevissima.

Larva oblonga, hirsuta, grisea.

4. *T. oblonga*, nigra, thorace rugoso, elytris striatis: *crenata.* maculis duabus rubris.

Habitat in Suecia.

Statura omnino *T. quadripustulatae*, at quadruplo minor. Thorax longitudinaliter rugosus, obscure niger. Elytra striis crenatis nigra, basi apiceque macula magna ferruginea.

5. *T. oblonga*, glabra, atra, fronte, pedibus, maculisque duabus elytrorum ferrugineis. *rufifrons.*

Habitat in Anglia. *Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentium, et magnitudo *T. crenatae*. Antennae nigrae, clava ferruginea. Caput nigrum fronte ferrugineo. Thorax glaber, ater, laevis, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, nitida, punctis duobus ferrugineis, altero ad basin, altero ad apicem.

20. HISPA. *Palpi aequales, medio crassiores, fusiformes.*

Maxilla bifida.

Labium corneum, integrum.

Antennae cylindricae.

mystacina. 1. *H. antennis pectinatis, elytris testaceis albo punctatis.*
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Gigas in hoc genere. Caput nigrum, anteninis approximatis pectinatis, radiis compressis, elongatis maximis. Maxillae porrectae, corneae, acutae, dentatae. Palpi aequales articulo ultimo obtuso. Thorax cinereus. Elytra testacea, punctis plurimis albis sparsis. Abdomen subitus cinereum, utrinque lineis duabus punctorum nigrorum. Pedes cinerascentes.

flabellicornis. 2. *H. antennis pectinatis, elytris laevibus.*
Habitat in Anglia. *D. Lee.*

Corpus totum cylindricum, atrum. Caput globosum, antennis uno latere valde pectinatis. Thorax cylindricus, basi utrinque terminatus, dente valido acuto. Elytra scabra vix distincte striata.

pectinicornis. 3. *H. antennis pectinatis, fusca, pedibus luteis.*
Ptinus pectinicornis fuscus, antennis luteis pectinatis.

Linn. Syst. Nat. II. 565. 1.

Dermetes pectinicornis. Fn. Sv. 412.

Ptilinus atro fuscus, thorace convexo, pedibus anten-nisque pallidis. Geoff. Inf. I. 65. 2.

Habitat in Europae quisquiliis.

hirta. 4. *H. antennis ferratis, atra, hirta.*

Dermestes hirtus, ater hirtus. Linn. Syst. Nat. II. 563. 14.

Habitat in tritico Europae australioris. *D. Dana.*

Certe huius est generis. Animalculum totum atrum, pilis erectis, hirtum. Antennae valde ferratae.

coerulea. 5. *H. antennis subferratis, coerulea, hirta.*

Habitat in Germania. *D. de Hattorf.*

Statura et summa affinitas praecedentis, at corpus to-tum coeruleum, nitidum, pilis erectis fuscis hirtum.

6. *H.*

6. H. inermis, nigra, antennis pilosis, elytris striatis. *mutica.*
Hispa mutica inermis, antennis pilosis. Linn. Syst.
Nat. II. 604. 4.
Dermestes clavicornis, niger, antennis clavatis pilosis.
Linn. Fn. Sv. 413.
Habitat in Europae quisquiliis, muscis.
7. H. thorace elytrisque spinosis, corpore atro. *atra.*
Hispa atra corpore toto atro. Linn. Syst. Nat. 603.
Crioceris tota atra, spinis horrida. Geoff. Inf. I. 243. 7.
Habitat in Europa australi ad radices graminum.
Antennae fusiformes prominent.
8. H. corpore testaceo, antennis aculeisque nigris. *Linn. testacea.*
Syst. Nat. II. 603. 2.
Habitat in Africa.
Thorax spinis lateralibus, elytra aculeis sparsis omnibus nigris.
9. H. nigra, thorace elytrorumque basi rufis, elytris ferratis. *sanguinicollis.*
Hispa sanguinicollis inermis, atra, thorace sanguineo.
Linn. Mantis. 530.
Habitat in America. D. v. Robr.
Caput nigrum, antennis fusiformibus. Thorax glaber, rotundatus, laete rufus. Elytra margine inprimis apice ferrata, striis tribus elevatis, spatio interiecto punctato; nigra, basi rufa.
21. NICROPHORVS. *Labium cordatum, emarginatum, crenatum.*
Antennae perfoliatae.
1. N. ater, clypeo obrotundo, inaequali. *germanicus.*
Silpha germanica oblonga, atra, clypeo obrotundo inaequali marginato, elytris obtusissimis, margine laterali ferrugineo. Linn. Syst. Nat. II. 569. 1.
Dermestes thorace marginato, elytris abscessis, totus niger. Geoff. Inf. I. 99. 2.
Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos divisis, primus. Raj. Inf. 107. 1.
Scarabaeus majusculus ex toto niger. List. Loqu. 381.

Habitat in Germania, victitans cadaveribus.
Apex antennarum ferrugineus. Variat interdum
puncto uno alterove elytrorum ferrugineo.

- vulgaris.* 2. N. ater, elytris fascia duplici ferruginea.
Silpha Vespillo oblonga, atra, clypeo orbiculato inae-
quali, elytris fascia duplici ferruginea. *Linn. Syst.*
Nat. II. 569. 2. Fn. Sv. 444.
Dermetes thorace marginato, elytris abscessis nigris,
fasciis duabus transversis undulatis luteis. *Geoff. Inf.*
I. 98. 1. tab. 1. fig. 6.
Scarabaeus foetidus primus. *Raj. Inf. 106.*
Cantharis tertius. *Mouffet. Inf. 149. fig. 1.*
Scarabaeus majusculus, niger, duabus luteis fasciis un-
dulatis transversim ductis supra alarum thecas. *Lift.*
loqu. 381. 2.
Scarabaeus Moschi odore. *Frisch. 12. 28. tab. 3. fig. 2.*
Vespillo. *Roef. Inf. 4. tab. 1. fig. 1. 2.*
Habitat in Europae, Americae cadaveribus, quae
sepelit.
Moschum spirat, oxyssime volitat elytris erectis ap-
proximatis. Acaris infestatur.
Varietates vidi plures, et Americanos et Europaeos,
at nullo modo distingui merentur.

22. SILPHA. *Maxilla* unidentata.

Labium dilatum, bifidum.
Antennae perfoliatae.

- surina-
mensis.* 1. S. atra, elytris: fascia postica flava, femoribus posticis
dentatis.
Habitat in America meridionali. *Muf. Dr. Hunter.*
Summa affinitas S. littoralis, at elytra postice fascia
ferruginea.
- littoralis.* 2. S. atra, elytris laevibus; lineis elevatis tribus, thorace
orbiculato nitido. *Linn. Syst. Nat. II. 570. II. Fn.*
Sv. 450.
Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis, prima et se-
cunda gibbositate connexis, thorace laevi. *Geoff. Inf.*
I. 126. 3.

- Scarabaeus campestris. *Frisch. Inf.* 6. 12. tab. 5.
 Silpha littoralis. *Scop. Ent. Carn.* 55.
 Habitat in Europae cadaveribus.
 Larva ovata, fusca, voracissima.
3. S. nigra elytris: fasciis duabus ferrugineis, thorace
 antice bidentato. *Linn. Syst. Nat.* II. 570. *Mus. Lud.*
Vlr. 38.
 Habitat in India.
4. S. depressa nigra, thorace flavo: centro nigro. *ameri-*
canica.
 Silpha Americana ovata, fusca, clypeo flavo; centro
 nigro intra annulum fulvum. *Linn. Syst. Nat.* II.
 570. 7.
 Blatta americana. *Catesby Car.* 3. tab. 10. fig. 5.
 Habitat in America.
 Statura fere S. thoracicae, at paulo major & magis de-
 pressa. Thorax postice rotundatus, flavescens, ma-
 cula magna in medio nigra. Elytra postice sub-
 marginata, rugosa, immaculata.
5. S. oblonga rufa, antennis elytris pectoreque nigris. *russica.*
Linn. Syst. Nat. II. 570. 10. *Fn. Sv.* 449.
 Dermetes elytris nigris, capite, clypeo et abdome
 rubro. *Vdm. Diff.* 7.
 Habitat in Europa boreali.
6. S. nigra, elytris linea elevata unica, thorace testaceo. *thoracica.*
Linn. Syst. Nat. II. 571. 13. *Fn. Sv.* 452. *Strom. Act.*
Nidr. 3. tab. 6. fig. 1.
 Peltis nigra, lineis tribus elevatis acutis, thorace testa-
 ceo. *Geoff. Inf.* I. 121. 6.
 Scarabaeus primo similis, parum canaliculatus, scapulis
 eroseis. *Raj. Inf.* 90. 10.
 Cassida nigra, clypeo latissimo pallide rufo, macula lata
 nigra nitida. *Gudd. Satag.* 25.
 Silpha thoracica. *Scop. carn.* 54.
 Habitat in Europa.
7. S. gibba nigra, elytris rugosis lineis elevatis tribus, *laevicollis.*
 thorace laevi emarginato.
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magna, tota gibba nigra. Capitis clypeus subtruncatus.
Thorax valde marginatus, niger, laevis, antice late
emarginatus. Elytra rugosa, lineis elevatis tribus,
et inter has lineas aliaetres minus elevatae.

rugosa. 8. S. nigricans, elytris rugosis: lineis elevatis tribus,
thorace rugoso postice sinuato. *Linn. Syst. Nat.* II. 571. 16. *Fn. Sv.* 455. *Scop. carn.* 53.

Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, spatio
interiecto veluti complicato, thorace scabro. *Geoff.*
Inf. I. 120. 4.

Scarabaeus inter cadavera frequens. *Raj. Inf.* 90. 9.

Habitat frequentissime in Europa.

Cadavera, pisces, carnes, consumens. Capta hu-
morem foetidissimum evomit.

atrata. 9. S. atra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus laevi-
bus, thorace integro. *Linn. Syst. Nat.* II. 571. 12. *Scop. carn.* 56.

Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis, spatio inter-
iecto punctato, thorace laevi. *Geoff. Inf.* I. 118. 1.
Habitat in Europae agris et viis frequens.

laevigata. 10. S. atra, elytris laevibus subpunctatis.

Peltis nigra tota, elytris laevibus, punctis minimis
excavatis. *Geoff. Inf.* I. 122. 8.

Habitat in sylvis Europae.

Nimis affinis S. atratae, a qua tamen differt elytris
laevibus nec striis tribus elevatis.

obscura. 11. S. nigra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus, tho-
race antice truncato. *Linn. Syst. Nat.* II. 572. 18. *Fn.*
Sv. 457. *Scop. carn.* 57.

Cassida ovata, nigra, lineis tribus elevatis: media lon-
gissima. *Vdm. Diff.* 8.

Habitat in Europa boreali.

opaca. 12. S. fusca, elytris concoloribus lineis elevatis subternis,
thorace antice truncato. *Linn. Syst. Nat.* II. 571. 15.
Fn. Sv. 454.

Habitat in Europa.

S. atratae paulo minor.)

13. S. thorace emarginato rugosissimo, elytris lineis elevatis tribus apice sinuatis. *sinuata.*

Peltis nigra, elytris lineis tribus elevatis, spatio interjecto minutissime punctato, thorace scabro. *Geoff.*

Inf. I. 119. 2.

Habitat in Anglia. Cap. Bon. Spei. *Dom. Banks.*

Statura omnino S. opacae, cuius forte varietas.

Thorax antice emarginatus, fuscus, argenteo colore splendens, punctis nigris elevatis, scaber. Elytra nigra apice sinu rotundo excavata.

14. S. nigra, elytris pallidis, puncto baseos medioque nigro, thorace emarginato. *Linn. Syst. Nat. II. punctata.* 571. 14.

Peltis nigra, thorace elytrisque testaceis, thoracis macula coleoptrorumque punctis quinque nigris. *Geoff.*

Inf. I. 122. 7.

Silpha quadripunctata nigra, elytris ex albidis, maculis quatuor nigris. *Schreb. Inf. 2. fig. 5.*

Habitat frequens in queru Angliae.

15. S. testacea, antennis apice nigris.

Peltis tota testacea. *Geoff. Inf. I. 123. 9.*

Paede-montana.

Habitat Paedemontiae. *Dr. Allioni.*

Statura et magnitudo S. atratae. Corpus totum obscure testaceum, elytris tamen paulo pallidioribus.

Elytra laevissima, punctata: lineis tribus elevatis obsoletis. Ultimi tres articuli antennarum nigris.

16. S. ferruginea, elytris lineis elevatissimis, thorace emarginato, capite latiore. *Linn. Syst. Nat. II. 572. 19.* *ferrugi-nea.* *Scop. Ent. carn. 60.*

Scarabaeus minor e rufo fordide nigricans, elytris striatis. *Raj. Inf. 84. 33.*

Habitat in Europa.

17. S. nigra, elytris striis punctatis: lineis elevatis senis, thorace emarginato. *Linn. Syst. Nat. II. 572. 22. Fn. Sv. 460.* *oblonga.*

Habitat in Europa.

23. OPATRVM. *Palpi anteriores clavati,
clava oblique truncata:
posteriores filiformes.*

*Labium subemarginatum.
Antennae moniliformes,
extrorsum crassiores.*

sabulosum. 1. *O. fuscum, elytris lineis elevatis tribus dentatis, thorace emarginato.*

*Silpha sabulosa fusca, elytris lineis elevatis tribus utrinque dentatis, thorace subemarginato. Linn. Syst. Nat.
II. 572. 17. Fn. Sv. 456.*

Tenebrio atra, elytris striis quinque utrinque dentatis. Geoff. Ins. I. 350. 7.

Dermestes niger, inter elytrorum lineas quatuor elevatis scrobiculis exaratus. Vddm. Diff. 5.

Habitat in Europac, Americae borealis fabulosis.

gibbum. 2. *O. nigrum, elytris lineis elevatis plurimis obsoletis.
Habitat in Sveciae collibus arenosis.
Magnitudo omnino praecedentis, at magis oblongum
et postice magis gibbum. Elytra obsoleta, lineis elevatis striata.*

*arenari-
sum.* 3. *O. griseum, elytris striatis.
Habitat in Cap. bon. Speci. Mus. Dom. Banks.
Statura et magnitudo omnino O. fabulosi: obscure cinerum.
Palpi anteriores clava oblique truncata.
Antennae moniliformes, extrorsum crassiores. Capitis clypeus emarginatus. Thorax laevis. Elytra striata. Pedes nigri.*

orientale. 4. *O. cinereum, thorace elytrisque rugosis, tibiis anticis dilatatis triangularibus.
Habitat in Oriente. Forstkäbl.
Simillimum S. gibbae. Caput ruga transversali elevata
clypeoque fisso. Thorax scaber, rugosus, inaequalis.
Elytra scabra striisque longitudinalibus rugosa. Pedes cinerei.*

5. *O.*

5. O. cinereum, thorace rugoso, elytris lineis elevatis qua- *minutum.*
tuor laevibus.

Habitat in Svecia.

Praecedentibus quadruplo minus, totum cinereum ob-
scurum. Elytra laevia lineis elevatis quatuor.

24. NITIDVLA. *Palpi* filiformes.

*Maxilla cylindrica, mem-
branacea.*

*Labium cylindricum, inte-
grum.*

Antennae clava solida.

1. N. ovata, nigra, elytris puncto rubro.

Sylpha 2 pustulata oblonga, nigra, elytris singulis
puncto unico rubro. *Linn. Syst. Nat.* II. 570. 4.
Fn. Sv. 445. *2 pustu-
lata.*

Dermestes niger coleoptris, punctis rubris binis. *Geoff.*

Inf I. 100. 3.

Habitat in Europae cadaveribus.

2. N. testacea, subtomentosa, thorace emarginato, oculis
nigris. *aestiva.*

Silpha aestiva, testacea, subtomentosa. Thorace emar-
ginato, oculis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 574. 32.
Fn. Sv. 465.

Habitat in Europae floribus.

3. N. ovata, thorace marginato, ferruginea, capite fusco. *ferrugi-
nea.*
Dermestes ferrugineus, oblongus, ferrugineus, semi-
cylindricus, elytris abbreviatis. *Linn. Syst. Nat.* II.
564. n. 21? *Fn. Sv.* 433?

Habitat in Angliae lycoperdis: capt. d. 9. Jul.

Magnitudo et statura N. aestivae. Caput fuscum, imma-
culatum, fronte impressa. Thorax marginatus, fer-
ruginous, antice emarginatus. Elytra obsolete pun-
ctato-striata, ferruginea, postice obscuriora. Ab-
domen in quibusdam acutum prominet. Subtus niger,
pedibus ferrugineis.

4. N.

Colon. 4. N. nigra, elytris ferrugineo variis, thorace emarginato.

Silpha *Colon nigra*, elytris ferrugineo variis, thorace emarginato; tergo duplici puncto impresso. *Linn.* *Syst. Nat.* II. 573. 27. *Fn. Sv.* 462.

Habitat in Europa.

Duplicem vidi varietatem vix nisi magnitudine differentem.

discoidea. 5. N. thorace marginato, nigra, elytrorum disco ferrugineo.

Habitat in Anglia. *Dom. Banks.*

Statura et magnitudo N. bipustulatae. Caput atrum. Thorax inaequalis, marginatus margine obscurō ferrugineo. Scutellum nigrum. Elytra nigra macula magna, orbiculata, communis, ferruginea. Pedes nigri.

pedicularia- 6. N. nigra, elytris laevibus, thorace marginato.

ria. Silpha *pedicularia nigra*, elytris laevibus, thorace marginato. *Linn. Syst. Nat.* II. 574. 34. *Fn. Sv.* 466.

Habitat in Europae hortis.

aenea. 7. N. thorace marginato viridi, aenea, antennis pedibusque nigris.

Habitat in Anglia. *Dom. Banks.*

Statura N. bipustulatae, at duplo minor. Corpus totum viride - aeneum, laeve, glabrum.

rufipes. 8. N. nigra, nitida, pedibus pallidis.

Silpha *rufipes nigra*, laevis, thorace subemarginato, pedibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 573. 24.

Habitat in Anglia.

Statura N. aeneae, at paulo longior. Totum corpus nigrum violaceo nitens, glabrum. Pedes pallidi, geniculis nigris,

25. COCCINELLA. *Palpi* anteriores securiformes, posteriores filiformes.

Labium cylindricum.

Antennae clava solida.

1. C. coleoptris rubris: margine nigro, thorace utrinque puncto marginali albo. *margi-*
nata.

Coccinella marginata coleoptris flavis immaculatis, mar-

gine nigro, thoracis margine punctis duobus albis.

Linn. Syst. Nat. II. 579. 1.

Habitat in Brasilia.

2. C. coleoptris rubris immaculatis, thorace capiteque nigris. *surina-*
nata. *Linn. Syst. Nat. II. 579. 2. Am. Acad. 6.*
mensis.
393. 12.

Habitat in America meridionali.

Corpus magnitudine C. 7 punctatae.

3. C. coleoptris sanguineis immaculatis, thorace maculis *sanguinea.*
nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 579. 3. Amoen. Acad. 6.*
393. 4.

Habitat in America meridionali.

Parva, subtus atra.

4. C. coleoptris rubris: puncto nullo. *Linn. Syst. Nat. II.* *impun-*
Etata.
579. 4.

Habitat in Sveciae hortis.

Magnitudo C. bipunctatae.

5. C. elytris rubris: lineola baseos apicisque nigra. *lineola.*
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Parva. Caput albidum. Thorax albidus punctis qua-

tuer nigris. Elytra rubra lineolis duabus, altera

ad basin, altera versus apicem nigris. Subtus nigra;

tibiis albis.

6. C. coleoptris rubris: punctis nigris duobus. *Linn. Syst. 2punctata.*
Nat. II. 580. 7. Geoff. Inf. I. 320.

Scarabaeus alter niger, exiguus, pennarum crustis minia-

tulis, in quibus duae tantum maculae nigrae. *Lift.*

Scar. Angl. 383. 8.

Scara-

- Scarabaeus hemisphaericus minor*, elytris e flavo rubentibus, singulis maculis seu punctis nigris media parte notatis. *Raj. Inf.* 86. 2.
- Coccinella anglica bimaculata* seu minor rubra. *Petiv. Gazoph.* 34. tab. 21, fig. 4.
- Coccinella secundae magnitudinis*, punctis coleoptorum duobus. *Frisch. Inf.* 9. 33. tab. 16, fig. 4.
Habitat in hortis frequens.
- hieroglyphica.* 7. *C. coleoptris luteis*: maculis duabus nigris longitudinalibus sinuatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 580. 14. *Fn. Sv.* 476.
Habitat in Europa.
Parva est. Caput nigrum flavo maculatum. Thorax flavus, punctis quatuor baseos et uno utrinque laterali nigris. Elytra flava lineis duabus longitudinalibus nigris, exteriore sinuata, interiore interrupta, vel potius punctis quatuor constante. Corpus atrum.
- inaequalis.* 8. *C. clytris flavis*: punctis anticis tribus, futura fascia que apicis nigris.
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Media. Corpus nigrum. Caput flavidum. Thorax ater, antice flavidus. Elytra flava futura antice maculis tribus et postice fascia magna inaequali nigris.
- trifasciata.* 9. *C. coleoptris rubris*: fasciis nigris tribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 580. 13. *Fn. Sv.* 475.
Habitat in Europae hortis.
Affinis *C. conglomeratae*.
- 4 punctata.* 10. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris quatuor. *Linn. Syst. Nat.* II. 580. 9.
Habitat in Europa media.
Thorax flavidus, punctis 4 nigris.
- 5 punctata.* 11. *C. coleoptris sanguineis*: punctis nigris quinque. *Linn. Syst. Nat.* IV. 580. 4. *Fn. Sv.* 474. *Geoff. Inf.* 1. 320.
Habitat in Europae arboribus.
- glacialis.* 12. *C. coleoptris rubris*: punctis sex nigris, intermediis majoribus sinuatis.
Habitat in America boreali, *D. Drury.*

Statura

Statura C. 13 punctatae. Caput atrum, macula frontali alba. Thorax ater, nitidus, margine lineolisque duabus obliquis albis. Elytra rufa, punctis tribus nigris, quorum baseos parvum, intermedium majus sinuatum, apicis orbiculatum. Differt manifeste a C. sex, punctata *Linnaei*.

13. C. coleoptris rubris: punctis nigris septem. *Linn. Syst.* 7 punctata.
Nat. II. 581. 15. Fn. Sv. 477. Geoff. Inf. I. 321. tab. 6.
fig. 1.

Scarabaeus alter niger. List. Scar. Engl. 382. 7.

Coccinella anglica vulgatissima, rubra, septem nigris maculis punctata. Petiv. Gazoph. tab. 21. fig. 3.

Scarabaeus subrotundus f. hemisphaericus rubens, major vulgatissimus. Raj. Inf. 86. I.

Coccinella major. Frisch. 4. tab. 1. fig. 4.

Roeſ. Inf. 2. Scar. 3. p. 7. tab. 2.

Habitat in Europae plantis frequentissima,

14. C. coleoptris rubris: punctis nigris octo. 8 punctata.
Habitat in Germania. *D. de Hattorf.*

Magnitudo C. 2 punctatae. Caput albicans, punctis duobus nigris in fronte. Thorax albicans, punctis quinque nigris ad basin, et unico utrinque ad marginem. Elytra rubra, punctis quatuor nigris, quorum unicum ad basin et tria in medio.

15. C. coleoptris rubris: punctis novem nigris, postice communi, thorace bipunctato. 9 punctata.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Corpus rufum. Thorax ruber, nitidus, punctis duobus dorsalibus nigris. Elytra punctis quatuor. I. 2. I. et postico communi.

16. C. coleoptris rubris: punctis nigris novem. *Linn. 10 punctata.*
Syst. Nat. II. 581. 16. Fn. Sv. 478.

Coccinella coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, lateribus albis. Geoff. Inf. I. 322. 4.

Coccinella nigra elytris rubris, punctis novem nigris. Vddm. Diff. 14.

Habitat in Europa.

- 10 pun-
ctata.* 17. *C. coleoptris fulvis: punctis nigris decem, thorace quadrimaculato.* *Linn. Syst. Nat. II. 581. 17. Fn. Sv. 479.*
Scopol. carn. 237.
Habitat in Europa.
- dilatata.* 18. *C. subrotunda, coleoptris marginatis fulvis: punctis nigris decem, thorace bipunctato.*
Habitat in America. *Mus. Brit.*
Magna, fulva. Thorax antice valde emarginatus, margine punctisque duobus dorsalibus nigris. Elytrorum margo dilatatus, niger.
- 11 pun-
ctata.* 19. *C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim.* *Linn. Syst. Nat. II. 581. Fn. Sv. 480.*
20. Coccinella coleoptris rubris: punctis undecim nigris, thorace rubro, immaculato. *Geoff. Inf. I. 325. 9.*
Strom. Ag. Nidr. 3. tab. 6. fig. 2.
Habitat in Europa boreali.
- 12 pun-
ctata.* 20. *C. coleoptris flavis: punctis nigris duodecim: extimus linearibus repandis.* *Linn. Syst. Nat. II. 581. 19.*
Habitat in Europae hortis.
Thorax flavus, punctis maculisque duabus nigris.
- chrysome-
lina.* 21. *C. coleoptris rufis: punctis duodecim nigris, thorace immaculato.*
Habitat in insula St. Helena. *Mus. Dom. Banks.*
Major. Caput et thorax rubra, immaculata, margine paulo pallidiora. Elytra rufa, punctis sex nigris per paria distributis. Pedes flavescentes.
- borealis.* 22. *C. coleoptris flavis, punctis nigris duodecim, duobus communibus, ultimis orbiculatis.*
Habitat in America boreali. *D. Drury.*
Statura C. ocellatae. Caput flavum. Thorax flavus, punctis tribus nigris, intermedio majori. Elytra flava, punctis septem, at duobus ad suturam dimidiatis nigris, ultimo orbiculato majori 3. 3. 1. Subtus flava, pectore nigro.
- cassidea.* 23. *C. oblonga rubra: coleoptris punctis duodecim, thorace quatuor nigris.*
Habitat in Marylandia. *Mus. Brit.*

Thorax

- Thorax ruber, punctis quatuor nigris, antice emarginatus, margine incrassato, postice tridentatus. *13 punctata.*
Elytra punctis sex, antico minutissimo.
24. C. rotunda, coleoptris flavis: punctis nigris tredecim. *13 maculata:*
Habitat in Svecia.
Distincta sane a *13 punctata*, tota fere orbiculata.
Thorax albus, maculis quatuor nigris. Coleoptera
flava, punctis nigris *13* nempe, *1, 3, 2,* et communi.
25. C. oblonga, coleoptris luteis: punctis nigris tredecim. *13 punctata.*
Linn. Syst. Nat. II. 582. 20. Geoff. Inf. I. 323.
Coccinella *13 punctata*. *Scopol. carn. 238.*
Reaum. Inf. 3. tab. 31. fig. 79.
Habitat in Europa.
Puncta elytrorum *1. 2. 2. 1.* et communi ad basin.
26. C. coleoptris flavis: punctis nigris quatuordecim: *14 punctata.*
quibusdam contiguis. *Linn. Syst. Nat. 3. 582. 21.*
Fn. Sv. 482.
Coccinella tessulata. *Scop. carn. 243.*
Coccinella luteo nigroque variegata. *Frisch. Inf. 9.*
tab. *17.* fig. *4. 5.*
Habitat in Europa.
27. C. coleoptris luteis, punctis nigris quindecim. *Linn. ocellata.*
Syst. Nat. II. 582. 23. Fn. Sv. 484.
Coccinella elytris flavo-luteis, punctis *15* nigris, ocello
flavo cinctis. *Gad. Sat. 16.*
Coccinella. *Sultz. Inf. tab. I. fig. 14.*
Schaeff. Icon. tab. I. fig. 2.
- - elem. tab. *47.* fig. *I.*
Menar. Inf. Eur. 48. fig. 5.
Habitat in Europae hortis.
Major reliquis.
28. C. coleoptris flavis: punctis nigris octodecim, ultimo
arcuato. *Linn. Syst. Nat. II. 582. 24.* *18 punctata.*
Habitat in Europa boreali.
Media, thorax lateribus flavis.
29. C. coleoptris flavis, punctis nigris novendecim. *Linn.*
Syst. Nat. II. 582. 25. Fn. Sv. 485. *19 punctata.*
Coccinella coleoptris rubris: punctis novendecim.
Geoff. Inf. I. 325. 10.

- Habitat in Europae plantis, hortis.
Thorax punctis 6. Elytris punctis 9. et uno com-
muni.
- 20 pun-*
Etata. 30. *C. coleoptris flavis:* punctis nigris viginti.
Coccinella coleoptris flavis, punctis viginti nigris.
Geoff. Inf. 1. 329. 17.
Habitat in Anglia. *D. Eaton.*
Parva. Statura hieroglyphicae. Caput nigrum.
Thorax flavus, punctis quinque baseos nigris.
Elytra flava, punctis tribus nigris, dein 3. ultimis
quatuor in figura quadrata dispositis. Subtus nigra.
- 22 pun-*
Etata. 31. *C. coleoptris flavis:* punctis nigris viginti duobus.
Linn. Syst. Nat. II. 582. 26. *Fn. Sv.* 486.
Habitat in Europa.
Parva est.
- 25 pun-*
Etata. 32. *C. coleoptris rubris:* punctis rubris viginti quinque
distinctis. *Linn. Syst. Nat.* II. 582. 27.
Habitat in Germaniae hortis.
Thorax ruber, punctis tribus nigris.
- 24 pun-*
Etata. 33. *C. coleoptris rubris:* punctis nigris viginti quatuor.
Linn. Syst. Nat. II. 583. 28. *Fn. Sv.* 487. *Geoff. Inf.* 1.
326. 11.
Habitat in Europa.
- 28 pun-*
Etata. 34. *C. coleoptris rubris:* punctis nigris viginti octo.
Habitat Tranquebariae. *Koenig.*
Corpus medium rufum. Thorax rufus, punctis nigris
septem, duobus in medio fere coalitis. Elytra sub-
villosa, punctis nigris 14.
- conglome-*
rata. 35. *C. coleoptris flavescensibus:* punctis nigris plurimis
contiguis. *Linn. Syst. Nat.* II. 583. 31. *Fn. Sv.* 490.
Coccinella coleoptris rubris, punctis plurimis nigris,
quibusdam connexis, sutura longitudinali nigra.
Geoff. Inf. 1. 316. 12.
Scarabaeus hemisphaericus flavidus, maculis nigris variae
figurae depictus. *Raj. Inf.* 87. 5.
Scarabaeus luteus, nigris maculis distinctus. *List. Loqu.*
383. 9.
Frisch. Inf. 9. p. 34. tab. 17. fig. 6.
Habitat in Europa.
Nimis affinis *C. 14 punctatae.*

36. *C. flava*, coleoptris immaculatis, thorace albo maculato. *detrita.*
Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.
37. *C. coleoptris luteis*: punctis albis decem. *Linn. Syst. 10guttata.*
Nat. II. 583. 33.
Habitat in Svecia.
Puncta elytrorum 2. 2. 1.
38. *C. coleoptris rufis*: punctis albis quatuordecim. *14guttata.*
Linn. Syst. Nat. II. 583. 34. Fn. Sv. 492. Geoff. Ins. I.
327. 13.
Scarabaeus subrufus. Lift. Scar. Angl. 383. X.
Habitat in Europae salicibus.
39. *C. coleoptris luteis*: punctis albis sedecim. *Linn. Syst. 16guttata.*
Nat. II. 584. 35. Fn. Sv. 493.
Coccinella 16 guttata. Scop. carn. 249.
Habitat in Europa.
40. *C. coleoptris rubris*: punctis albis octodecim. *18guttata.*
Habitat in Europa.
Parva, punctis novem in singulo elytro.
41. *C. coleoptris rubris*: punctis albis viginti. *Linn. Syst. 20guttata.*
Nat. II. 584. 37. Fn. Sv. 495.
Habitat in Europa.
42. *C. coleoptris rubris*: lineis punctisque albis. *Linn. oblongo-*
Syst. Nat. II. 584. 38. Fn. Sv. 496. *guttata.*
Habitat in hortis rarius.
43. *C. coleoptris nigris*; puncto nullo. *Linn. Syst. Nat. II. impu-*
584. 40. *lata.*
Habitat in Germaniae nemoribus.
Thoracis latera flava puncto nigro.
44. *C. coleoptris atris*: maculis duabus rubris. *Linn. Syst. Caffi.*
Nat. II. 584. 41.
Coccinella coleoptris marginatis, nitidis, atris, macula
solitaria subrotunda utrinque. Gronov. Zooph. 609.

Scarabaeus hemisphaericus cochinifer. Petiv. *Gazoph.*
tab. 1. fig. 5.

Sloan. Fam. 2. tab. 237. fig. 31-33. et tab. 9. fig. 13.
Habitat in Americae cactis, saepius inter coccos cacti
lecta.

Affinis C. 2 pustulatae, a qua tamen differt macula
majori simplicissima.

- 2 pustulata** 45. C. coleoptris nigris: punctis rubris duobus compositis, abdome sanguineo! *Linn. Syst. Nat.* II. 585. 42.
Fn. Sv. 498.

Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, fascia transversa rubra. *Geoff. Inf.* I. 334. 26.

Coccinella media nigra, punctis duobus rubris dorsibus. *Frisch. Inf.* 9. p. 34. tab. 16. fig. 6.

Roe. Inf. Scarab. 3. p. 10. tab. 3.

Habitat in Europa.

Singulum punctum e tribus componitur.

- 4 pustu-**
lata 46. C. coleoptris nigris: punctis rubris quatuor: interioribus longioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 585. 43. *Fn.*
Sv. 499.

Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum imagine reflexo, punctis quatuor rubris. *Geoff. Inf.* I. 333. 25.

Habitat in Europae urticis.

- 6 pustu-**
lata 47. C. coleoptris nigris: punctis rubris sex. *Linn. Syst.*
Nat. II. 585. 44. *Fn. Sv.* 500.

Coccinella ovata, coleoptris nigris: punctis rubris sex. *Geoff. Inf.* I. 331. 10.

Scarabaeus hemisphaericus minor, elytris nigris, rubris maculis pictis. *Raj. Inf.* 87. 4.

Habitat in Europa.

- lunata**. 48. C. coleoptris nigris, maculis decem rubris, sex lunatis.

Habitat in insula St. Helena. *Muf. Dom. Banks.*

Magna. Caput album. Thorax niger margine antieo, in primis ad latera albo. Elytra atra macula magna lunata, baseos punctis duobus rotundatis, in medio et postice maculis duabus magnis lunatis, altera ad marginem interiorem, altera ad exteriorem. Corpus subtus nigrum.

49. C.

49. *C. coleoptris nigris*: punctis fulvis rotundatis decem. *to pustulata.*
Linn. Syst. Nat. II. 585. 35. Fn. Sv. 501.

Coccinella coleoptris nigris, punctis decem flavescen-
 tibus aut rubris. *Geoff. Inf. I. 330. 19.*

Habitat in Europa.

Variat maculis flavis et rubris.

50. *C. coleoptris nigris*: punctis albis quatuordecim. *14 pustulata.*
Linn. Syst. Nat. II. 585. 46. Fn. Sv. 502. Geoff. Inf. I.
530. 18.

Coccinella 14 maculata. Pod. Inf. 26.

Habitat in Europae floribus.

Maculae interdum flavae, interdum rubrae.

51. *C. coleoptris nigris*; punctis duobus flavis, quatuor
 rufis. *Guttato-pustulata.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Caput flavescens. Thorax niger, lateribus late
 albis. Elytra nigra, puncto flavescente ad marginem
 exteriorem baseos; puncto majore rufo ad margi-
 nem interiorem, et denique postice macula magna
 vel posticis fascia sinuata rufa, quae tamen futuram
 haud attingit. Corpus nigrum.

52. *C. globosa*, *coleoptris atris*: punctis sex albis. *felina.*

Habitat in America boreali. *D. Drury.*

Parva, tota globosa. Caput album, immaculatum.

Thorax albus macula baseos nigra. Elytra atra
 punctis tribus lineolaque parva baseos albis.

53. *C. coleoptris nigris*, punctis flavis octo. *Linn. Syst.* *Nat. II. 585. 48. Fn. Sv. 504.* *pantherina.*

Habitat in Europa.

54. *C. coleoptris atris*: punctis albis sedecim. *leonina.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Parva. Caput atrum punctis duobus albis in fronte.

Thorax ater utrinque macula magna marginali alba.

Elytra atra nitida punctis octo albis 2. 3. 2. 1. Cor-
 pus atrum.

nigrina. 55. C. coleoptris nigris: punctis albidis viginti. *Linn.*
Syst. Nat. II. 586. 49. *Fn. Sv.* 505.

Coccinella coleoptris nigris, punctis viginti albis. *Vddm.*
Diff. II.

Habitat in Europa boreali.

26. CASSIDA. *Palpi* anteriores clavati:
posteriores filiformes.
Labium elongatum integrum.
Antennae moniliformes.

viridis. 1. C. viridis corpore nigro. *Geoff. Inf.* I. 313. I. *Linn.*
Syst. Nat. II. 574. I. *Fn. Sv.* 467. *Scop. Ent. carn.* II. 7.
Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos divisus.
Raj. Inf. 107. 5.
Testudo viridis. *Goidait belg.* Vol. I. 94. tab. 43.
Roef. Inf. 2. Scarab. 3. tab. 6.
Reaum. Inf. Vol. 3. tab. 18.
Merian. Eur. tab. 115.
Habitat in plantis variis Europae.
Larva deprepta, hexapoda, spinis lateralibus acutis,
cauda biseta. Proprio stercore obtecta, obambulat.

maculata. 2. C. viridis, elytris variis, sutura dorsali confertius nigro
maculatus. *Linn. Syst. Nat.* II. 575. 6.
Cassida viridis maculis nigris variegata. *Geoff. Inf.* I.
314. 5. tab. 5. fig. 6.
Habitat in Germaniae plantis.
Affinis C. viridi.

affinis. 3. C. elytris griseis nigro punctatis, thorace flavescente,
immaculato.
Habitat in Germania. *D. de Hattorff.*
Nimis praecedenti affinis. Corpus atrum. Thoracis
elypeus omnino flavesens, immaculatus. Elytra gri-
sea punctis numerosis nigris. Margo flavesens, ante-
tice immaculatus, postice punctis quatuor nigris.

4. C. virens, futura dorsali sanguinolenta. *Linn. Syst. Vibex.*

Nat. II. 575. 5.

Habitat in Germania.

Nimis affinis praecedentibus.

5. C. pallido nebulosa fusco punctata. *Linn. Syst. Nat. II. nebulosa.*

Nat. 575. 3. Fn. Sv. 468.

Cassida nebulosa, pallida, corpore nigro. *Geoff. Inf. I.*

313. 2.

Scarabaeus minor fordide fulvus, punctis et maculis aliquot nigris temere sparsis notatus. *Raj. Inf. 88. 13.*

Cassida viridis. *Frisch. Inf. 4. p. 30. tab. 15.*

Habitat in carduis.

6. C. viridis, thoracis elytrorumque marginibus flavis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

*margi-
nella.*

Statura omnino C. nebulosae. Clypeus rotundatus, integer, viridis, margine flavo. Elytra punctata, viridia, margine flavo. Aliam vidimus simillimam, totam pallecentem, vix distinctam.

7. C. flavescens, thorace immaculato, clytris ante marginem punctisque nigris.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

*interru-
pta.*

Statura omnino praecedentis. Antennae flavae, apice nigrae. Thoracis clypeus rotundatus, flavus, integer. Elytra flavescens, linea lata atra in medio interrupta, quae ante marginem a basi ad angulum ani excurrit. Margo ipse late flavescens fasciis duabus atris, altera ad basin, altera versus apicem. In disco obscuriore puncta aliquot nigra sparsa. Corpus subtus flavescens.

8. C. rufescens, thorace punctis duobus, elytris numerosis cyaneo nigris, clypeo integro.

deusta.

Habitat in nova Hollandia. *Dom. Banks.*

Statura nostratum. Antennae apice nigrae. Clypeus rotundatus, integer, rufus, punctis duobus nigris in medio, elytra rufa, punctis circiter novem lateribus majoribus nigro cyaneis. Margo subtus fasciis tribus. Corpus flavescens.

- cibraria.* 9. *C. rufescens*, thorace punctis quatuor, elytris numerosiss., nigris, clypeo emarginato.
Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*
Statura nostratum, at paulo major. Antennae apice nigrae. Clypeus emarginatus, rufescens, punctis quatuor dorsalibus nigris. Elytra laevia, gibba, rufescens, punctis numerosis sparsis. Corpus nigrum.
- murraca.* 10. *C. nigra*, clypeo rubro, elytris sanguineis: punctis nigris sparsis. *Linn. Syst. Nat.* II. 575. 2.
Cassida rubra maculis nigris variegata. *Geoff. Inf.* I. 314. 5. β .
Habitat in plantis Europae.
Varietatem *C. maculatae* dicit *Geoff.* An rite?
- mobilis.* 11. *C. grisea*, elytris linea coerulea nitidissima. *Linn. Syst. Nat.* II. 575. 4.
Cassida pallida, linea dupliciti longitudinali viridi deaurata. *Geoff. Inf.* I. 313. 3.
Scarabaeus antennis clavatis, clavis in annulos divisus. *Raj. Inf.* 107. 7.
Habitat in stellatis, carduis Europae.
- eruciata.* 12. *C. flavescens*, coleoptris disco nigro: maculis quatuor flavescens. *Cassida cruciata pallida*, elytris disco fusco cruciato. *Linn. Syst. Nat.* II. 576. 9.
Habitat in Europa.
Corpus magnitudine *C. nebulosae*, pallide flavescens. Thoracis clypeus rotundatus, integer, lineolis tribus dimidiatis nigris; intermedia breviore, obsoletiore. Elytra punctata, vix marginata, pallida, disco nigro, maculis duabus magnis flavescensibus dorsalibus.
- tuberculata.* 13. *C. testacea*, margine thoracis elytrorumque flavis, coleoptris basi trituberculatis.
Cassida marginata, testacea, margine thoracis elytrorumque flavo. *Linn. Syst. Nat.* II. 576. 14.
Habitat in Sierra Leon Africæ.
Parva; statura *C. cruciatae*. Testa testacea, margine omni flavo: excepto elytrorum basi testaceo. Coleoptra basi tuberculis tribus elevatis, lateralibus minoribus. Corpus subtus pallidum.

14. C. thorace flavo, elytris rufescentibus, maculis duabus lateralibus flavis. *biguttata.*

Habitat Cajennae. *D. Manduit.*

Statura et magnitudo C. cruciatae. Clypeus rotundatus, integer, flavus, immaculatus. Elytra obscure rufescentia, maculis duabus oblongis flavis, posteriore minori.

15. C. flava, thorace immaculato, elytris nigro punctatis: margine bifasciato. *miliaris.*

Habitat in insula St. Helenae. *Mus. Dom. Banks.*

Statura C. marginatae. Antennae flavae, apice nigrae.

Thoracis clypeus rotundatus, integer, immaculatus. Elytra laevia, flava, punctis circiter decem nigris sparsis. Margo uti in reliquis dilatatus fasciis duabus, altera ad basin, altera versus apicem nigris. Sutura apice nigra. Subtus nigra, margine flavescente. Pedes flavi.

16. C. cyaneo-nigra, elytris testaceis, margine nigro. *Linn. Syst. Nat. II. 578. 23.* *margi-*
nata.

Habitat in Indiis.

Magnitudo C. jamaicensis. Clypeus cyaneus, medio gibbus. Elytra testacea, margine omni cyaneo. Corpus nigrum.

17. C. luteo-aenea, elytris immaculatis excavato pun-
ctatis. *Linn. Syst. Nat. II. 577. 21.* *jamaicen-*
Sloan. Jam. 2. p. 208. Tab. 233. fig. 27. 28. *sis.*

Habitat in America.

Thorax elytrorumque margo testaceus. E spiritu vini
extracta colorem aeneum in triste testaceum mutat,
naturalem vero recuperat, aqua calida immissa.

18. C. cyanea, elytris angulo antico spina truncata. *Linn. bicornis.*
Syst. Nat. II. 576. 8. Amoenit. acad. 6. p. 393. 9.

Habitat in Indiis.

19. C. cyaneo aenea, elytris immaculatis excavato pun-
ctatis. *Linn. Syst. Nat. II. 577. 39. Mus. Lud. Vlr. 39.* *cyanea.*
Petiv. Gazoph. tab. 57. fig. 6.

Habitat in America. *Mus. Brit.*

- spinifex.* 20. *C. ferruginea*, elytris angulo antico spina porrecta; thorace utrinque spina transversa. *Linn. Syst. Nat. II.* 576. 7. *Amoen. Acad. 6. 392. 7.*
Habitat in India.
Linea nigra ad basin elytrorum.
- flava.* 21. *C. flava immaculata*, corpore testaceo, puncto scutellari nigro. *Linn. Syst. Nat. II. 576. II.*
Habitat in America australi.
- leucophaea.* 22. *C. testacea*, margine punctisque flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 576. 13. Amoen. acad. 6. 392. 8.*
Habitat in America.
Reliquis minor. Margo thoracis et elytrorum flavus, et praeterea puncta elevata flava in disco.
- reticulata.* 23. *C. flava*, elytris coeruleo variegatis: lateribus unifasciatis. *Linn. Syst. Nat. II. 576. 15.*
Habitat in America.
Thorax emarginatus, testaceus, linea dorsali crassa nigra.
- variegata.* 24. *C. rufa*, elytris coeruleo variegatis: lateribus bifasciatis. *Linn. Syst. Nat. II. 576. 16.*
Habitat in America.
Thorax fuscus. Margo extimus elytrorum tenuissime cyaneus.
- grossa.* 25. *C. sanguinea*, elytris disco punctis nigris sparsis, margine lineis ramosis nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 577. 17.*
Habitat in America meridionali.
Gigas in hoc genere. Thorax sanguineus, immaculatus.
- 7guttata.* 26. *C. nigra*, coleoptris, maculis septem albis. *Linn. Syst. Nat. II. 577. 19.*
Habitat in India orientali.
- exclamationis.* 27. *C. elytris lineis ternis nigris*. Inter media signum referente. *Linn. Syst. Nat. II. 577. 20.*
Habitat in America.
Corpus medium pallide flavescens. Lineae laterales obsoletiores.

28. C. ferrugineo aenea, elytris macula flava subovata *inaequalis.*
Linn. Syst. Nat. II. 578. 24.

Mus. petropol. 650. n. 130.

Habitat in America.

Elytra inaequalia.

29. C. fusco aenea, elytris macula flava laterali. *Linn. lateralis.*
Syst. Nat. II. 578. 26.

Habitat in America.

Tota cyaneo aenea, elytris macula magna flava.

30. C. viridi aenea, elytris macula didyma flava disci. *discooides.*
Linn. Syst. Nat. II. 578. 27.

Habitat in America. *Mus. Hunteri.*

Corpus subtus nigrum.

31. C. elytris viridi aeneis: maculis duabus sanguineis. *bipustulata.*
Linn. Syst. Nat. II. 578. 30. Amoen. acad. 6. 392. 8.

Habitat Cayennae.

Statura et magnitudo C. lateralis. Clypeus rotundatus,
 emarginatus, obscure aeneus, immaculatus. Elytra
 gibba, viridi-aenea, maculis duabus sanguineis ap-
 proximatis, interiori lunata, exteriori minori sub-
 orbiculata. Antennae nigrae.

32. C. nigro coerulescens, elytris flavo maculatis: maculis
 dorsibus reticulatis, lateralibus distinctis. *decussata.*

Habitat in Jamaica. *Mus. Brit.*

Magna. Thoracis clypeus emarginatus, coerulescens,
 macula utrinque magna flava. Elytra dorso reticu-
 lata, margine maculis sex vel septem distinctis
 flavis.

33. C. flavescens, elytris punctis duobus nigris. *Linn. 2 punctata.*
Syst. Nat. II. 578.

Habitat in India orientali.

Variat elytrorum punctis duobus et tribus.

27. ALVRNVS. *Palpi sex, acuti, brevissimi.*
Maxilla cornea, fornicata.
Antennae filiformes.

Grossus. i. ALVRNVS.

Habitat in Indiis.

Statura Chrysomelae, oblongae, at maxima. Corpus atrum. Antennae filiformes, nigrae, corpore dimidio breviores. Thorax depresso, subrugosus, basi utrinque acuminatus, coccineus, margine postico nigro. Scutellum rotundatum, nigrum. Elytra corpore majora longioraque basi, gibbosa, subpunctata, flava. Pedes nigri, tarsis subtus valde spongiosi.

28. CHRYSOMELA. *Palpi sex exterritorum crassiores.*

Labium corneum, integrum.

Antennae moniliformes.

tenebri-
cosa. 1. C. ovata, aptera, atra, antennis pedibusque violaceis.
 Chrysomela atropurpurea elytris coadunatis, alis nullis. *Geoff. Inf.* I. 295. 19.

Tenebrio laevigatus apterus, niger, laevis, elytris laevibus, thorace lunato, subtus coeruleus. *Linn. Syst. Nat.* II. 678. 29.

Habitat in Europa australiori.

Statura et summa affinitas C. Goettingensis, at triplo major.

Larva gibba, violacea, ano rufo, in plantis herbaceis polyphaga.

Goettin-
gensis. 2. C. ovata, atra, pedibus violaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 586. 4. *Fn. Sv.* 506.

Roeff. Inf. 2. Scarab. 3. tab. 5.

Habitat in Germania.

Plantae rufae.

3. C.

3. C. ovata, viridi aenea, subtus violacea. *bicolor.*

Habitat in Oriente. *D. Forstkäbl.*

Statura Ch. populi. Tota subtus violacea, supra ob-
seure aenea. Elytra punctata, striata, striis per
paria approximatis.

4. C. ovata, supra aenea, subtus testacea. *Bankii.*

Habitat in Lusitania. *Muf. D. Banks.*

Statura C. bicoloris. Caput aeneum, óre testaceo, an-
tennisque fuscis. Elytra aenea, punctata. Subtus
tota cum pedibus et elytrorum margine inferiori
testacea.

5. C. ovata, nigra, elytris flavis: fasciis duabus punctis-
que baseos nigris. *gibbosa.*

Chrysomela gibbosa, ovata, nigra, elytris testaceis,
nigro punctatis: fascia media posticaque nigris.

Linn. Syst. Nat. II. 586. 2. Am. acad. 6. 393. 13.

Coccinella. *Gron. Zoolph. 606. tab. 14. fig. 5.*

Habitat in America meridionali.

Magnitudo C. graminis. Elytra flavescens, basi
punctis quatuor nigris, quorum posterius trans-
versum commune. Fasciae dentatae.

6. C. cyanea, coleoptris flavis: fascia maculisque dua-
bus nigris. *trimacu-
lata.*

Chrysomela trimaculata ovata, nigra, elytris flavis:
maculis tribus oblongis, nigris, intermedia futurae
communi. *Linn. Syst. Nat. II. 592. 45.*

Habitat in America.

Magna. Caput et thorax cyanea, nitida, immaculata.
Scutellum cyaneum. Elytra subpunctata, flava,
fascia ad basin communi, quae marginem exte-
riorem haud attingit. Macula magna triangularis
nigra versus apicem. Pedes cyanei, plantis rufis.

7. C. aenea, elytris flavis: sutura vittaque aeneis. *futuralis.*

Habitat in America septentrionali. *Muf. D. Banks.*

Media, tota aenea. Elytra flava, sutura lata aenea,
quae, tamen basin elytrorum haud attingit. Vitta
lata aenea in medio, quae nec basin, nec apicem
attингит.

- surino-* 8. C. cyanea, glaberrima, antennis plantisque fuscis.
mensis. Habitat Surinami. *Mus. Dom. Banks.*
 Major Ch. graminis, tota cyanea, glabra, nitida. Os,
 antennae et plantae fuscae, femora subdentata.
- Graminis.* 9. C. ovata viridi coerulea, nitida, antennis pedibus-
 que concoloribus. *Linn. Syst. Nat. II. 587. 7.*
Fn. Sv. 509.
 Chrysomela viridi coerulea. *Geoff. Inf. I. 260. 10.*
 Coccinella graminis. *Scop. carn. 220.*
 Habitat in Europae plantis.
- cuprea.* 10. C. ovata, capite thoraceque aeneis elytris cupreis,
 corpore atro.
 Habitat in Germania. *D. de Hattorf.*
 Statura et magnitudo omnino C. graminis; Corpus,
 antennae et pedes nigra. Caput aeneum, oculis
 fuscis. Thorax aeneus, margine incrassato, puncta-
 to. Elytra omnino cuprea, nitida, basi gibba.
 Abdominis margo sanguineus.
- haemopte-* 11. C. ovata, violacea, plantis alisque rubris. *Linn.*
ra. *Syst. Nat. II. 587. II. Fn. Sv. 572.*
 Chrysomela tota violacea. *Geoff. Inf. I. 258. 5.*
 Chrysomela graminis. *Pod. Inf. 26.*
 Habitat in pratis Europae.
 Primus antennarum articulus rufus.
- semistria-* 12. C. ovata nigra, elytris flavis: fascia media nigra;
ta. antice posticeque nigro striatis.
 Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura C. trimaculatae. Caput atrum, antennis mo-
 niliformibus, rufis. Thorax ater, margine antico
 lateribusque flavis. Elytra laevia, flava, basi striis
 decim abbreviatis nigris, quae nec basin, nec fasciam
 attingunt. In medio fascia lata atra, et postice ite-
 rum striae octo abbreviatae, secunda tertiaque bre-
 vissimis. Subtus atra, plantis ferrugineis.
- Populi.* 13. C. ovata, thorace coerulecente, elytris rubris, apice
 nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 590. 30. Fn. Sv. 523.*
 Chrysomela nigro-coerulea, elytris rubris, apice nigris.
Geoff. Inf. I. 256. 1.

Scarabaeus viridis, alarum thecis miniatis. *Lister.* *Scarab.* *Angl.* 381. 6.

Coccinella populi. *Scopoli Ent.* 228.

Merian. Inf. 14. tab. 27.

Albin. Inf. 53. fig. 6.

Habitat in populo tremula folia saepius devastans.

Larvae hexapodae, albo nigroque variae, duplice serie tuberculorum, e quibus humoris lactei guttulas fundunt. Odorem spargunt gravem et ingratum. *Lister.*

14. C. ovata obscure testacea tota. *Linn. Syst. Nat.* II. 590. 26. *Fn. Sv.* 518. *staphylaea.*

Habitat in Europae pratis.

Corpus C. polita majus.

15. C. ovata, testacea, elytris aeneis: margine testaceo. *fervida.*

Habitat in insula Java. *D. Manduit.*

Magna. Statura C. staphylaeae. Caput testaceum, oculis albis. Thorax rotundatus, nitidus, testaceus, punctis quatuor dorsibus nigris. Elytra viridia, nitida, margine testaceo.

16. C. ovata, thorace aurato, elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 590. 27. *Fn. Sv.* 522. *polita.*

Chrysomela viridi aenea, elytris rubicundis punctis sparsis. *Geoff. Inf.* I. 257. 2.

Coccinella polita. *Scopoli Ent. Carn.* 229.

Habitat in salice, populo.

17. C. ovata, nigra, elytris castaneis. *Linn. Syst. Nat.* II. 590. 28. *lurida.*

Chrysomela nigra, elytris rubris striatis, striis punctatis. *Geoff. Inf.* I. 258. 3.

Habitat in vite. *D. Mullet.*

Statura politae, at minor.

18. C. ovata, nigra, elytris fasciis tribus flavis repandis. *Boleti.*

Linn. Syst. Nat. II. 591. 36. *Fn. Sv.* 527.

Diaperis. *Geoff. Inf.* I. 337. tab. 6. fig. 3. fig. mala.

Coccinella fasciata. *Scopoli Ent.* 247.

Dermestes ater, nitens, elytris nigris, fasciis duabus flavis undulatis. *Vddm. Diff.* 4. f. 3.

Habitat in boletis arborum.

stolida. 19. C. ovata, ferruginea, capite thoraceque flavis, elytris variegatis.

Habitat in America.

Statura C. boleti. Caput et thorax flava, immaculata, oculis antennisque nigris. Elytra flavo ferrugineo-que varia, margine tamen semper flavo. Subtus abdomen et pedes ferruginea.

nigricornis. 20. C. ovata, nigro-aenea, capite, thoracis lateribus elytrorumque macula duplice, baseos ferrugineis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at longior. Caput ferrugineum punctato frontali antennisque nigris. Thorax aeneus, lateribus pectoreque rufis. Elytra aenea, subtilissime punctata, basi ad marginem exteriorem macula duplice fulva. Abdomen nigrum, basi apiceque ferrugineum. Pedes nigri.

Varietatem vidimus macula ferruginea in apice elytrorum et adhuc aliam punctis duobus in medio, et majori, ad apicem elytrorum ferrugineis.

collaris. 21. C. ovata, violacea, thoracis marginibus albis: puncto nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 591. 37. *Fn. Sv.* 528.

Habitat in Europae, Americae salicibus.

viminalis. 22. C. ovata, nigra, thorace rufo bimaculato, elytris rufis. Chrysomela viminalis ovata, nigra, thorace bimaculato, elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 590. 31. *Fn. Sv.* 524.

Chrysomela rubra, thorace punctis duobus nigris, coleoptrorum futura nigra. *Geoff. Inf.* I. 265. 18.

Coccinella signata. *Scopoli Entom.* 233.

Habitat in salicibus Europae.

Affinis C. 10 punctatae.

cyanipes. 23. C. ovata, rufa, elytris punctis posticeque cyaneis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis paulo major. Caput rufum macula baseos antennisque moniliformibus cyaneis. Thorax rufus, nitidus, glaber. Scutellum cyaneum. Elytra glabra, basi ferruginea, punctis duobus aut tribus apiceque cyaneis, qui color ad futuram paulo altius ascendit, postice ad marginem crassiorem inter-

interdum puncto parvo ferrugineo. Abdomen nigrum, ane rufo. Pedes cyanei.

24. *C. ovata*, rufa, thorace macula dorsali punctisque duobus, coleoptris maculis octo cyaneis. *cyanicor-*
nis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et summa affinitas praecedentis. Caput rufum, macula baseos antennisque cyaneis. Thorax rufus, macula magna dorsali punctoque utrinque porro cyaneis. Scutellum cyaneum. Coleoptra glabra, nitida, rufa, maculis octo cyaneis 2. 3. media com- muni 3. media apicis communi. Abdomen cyaneum, basi apiceque ferrugineis. Pedes cyanei.

25. *C. ovata*, thorace rubro postice nigro, elytris rufis, 10 punctis subquinis nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 590. 32. ta.*

Fn. Sv. 525.

Chrysomela rubra, elytro singulo maculis quinque nigris. *Geoff. Inf. I. 258. 4.*

Habitat in Europae populo.

Variat elytrorum punctis.

26. *C. ovata*, flavescens, oculis nigris. *Linn. Syst. Nat. II. pallida.*
589. 25. *Fn. Sv. 521.*

Crioceris pallida, oculis nigris. *Geoff. Inf. I. 243.*

Habitat in salice.

27. *C. ovata*, flavescens, elytris maculis duabus nigris. *crassicor-*
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.* *nis.*

Statura C. pallidae. Caput flavescens, oculis nigris. Antennae moniliformes, extrorsum crassiores nigræ, basi pallidae. Thorax flavescens, immaculatus. Elytra flavescentia, maculis duabus nigris, posteriore majori oblonga. Pedes nigri, basi flavescentes.

28. *C. ovata*, nigra, elytris rubris: punctis sparsis, im- *variolosa.*
pressis, coeruleis. *Linn. Syst. Nat. II. 591. 33.*

Habitat in Africa.

Statura C. 10 punctatae.

29. *C. ovata*, thorace viridi, elytris rubris: fascia inter punctum maculamque lunatam coerulea. *lapponica.*
Nat. II. 591. 34. Fn. Sv. 526.

Habitat in Europa boreali.

Sutura elytrorum coerulea.

- undulata*. 30. C. ovata, rufa, elytris fasciis tribus atro-coeruleis, undulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 591. 35. *Amoen. acad.* 6. 393. 14.
Habitat in India.
Fasciae elytrorum undulatae, in primis secunda. Antennae, pedes et basis abdominis atro-coeruleae.
- 18 gutta-ta*. 31. C. ovata, elytris fuscis: punctis octo pallidis, quibusdam connexis.
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Caput pallidum macula baseos, antennisque nigris.
Thorax glaber, pallidus, maculis tribus dorsalibus fuscis. *Elytra* fusca, subtilissime punctato-striata, punctis octo pallidis, quibusdam ad basin connexis.
Abdomen nigrum, margine pallido.
- Polygoni*. 32. C. ovata, coerulea, thorace femoribus anoque rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 589. 24. *Fn. Sv.* 520.
Chrysomela nigra, elytris coeruleo viridibus, thorace pedibus antennarumque basi rufis. *Geoff. Inf.* I. 283. 4.
Habitat in Polygono, gravida ultra coleoptra ventricosa evadit.
- cerealis*. 33. C. ovata, aurata, thorace lineis tribus coleoptrisque quinque coeruleis. *Linn. Syst. Nat.* II. 588. 17.
Chrysomela aurea, fasciis coeruleis, cupreisque alternis, punctis inordinatis. *Geoff. Inf.* I. 262. 14.
Schaeff. Icones I. tab. 3.
Habitat in Europae australioris segete.
- america-na*. 34. C. ovata, viridi aenea, elytris striis quinque sanguineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 592. 46.
Chrysomela americana. *Sulz. Inf.* tab. 3. fig. 16.
Habitat in America.
Caput aeneum, macula verticis coccinea. *Affinis Ch. cereali.*
- festiva*. 35. C. nigro aenea, elytris lineis tribus futuraque antica flavis.
Habitat in America. *Mus. Brit.*
Statura C. fastuosa, at duplo minor. *Caput* et *thorax* obscure aenea. *Elytra* punctato-striata, obscure aenea, margine antico lineisque tribus longitudinalibus

I. ELEVTERATA. Chrysomela. 101

libus flavis. Lineae duae exteriores apice coeunt,
intermedia vero apicem haud attingit.

36. C. ovata, aurea, coleoptris lineis tribus coeruleis. *fastuosa.*
Linn. Syst. Nat. II. 588. 18.

Coccinella fastuosa. Scopoli carn. 232.
Habitat in lamio albo Germaniae.

37. C. ovata, viridi sericea, elytris lineis duabus aureis. *speciosa.*
Linn. Syst. Nat. II. 588. 19.

Coccinella speciosissima. Scopol. Ent. carn. 231.
Habitat in Germaniae sylvis.
Lineae elytrorum antice posticeque coeunt.

38. C. ovata, thorace rotundato cyaneo, elytris aureis: *aurata.*
margine cyaneo.

Habitat in Pensylvania. *Mus. Brit.*

Affinis C. fastuosa, at longior. Caput et thorax cya-
nea, nitida, antennis nigris. Elytra aurea, nitida,
margine exteriori cyaneo, basi gibba. Abdomen
cyaneum.

39. C. ovata, atra: coleoptrorum limbo sanguineo. *limbata.*

Chrysomela nigro coerulea, elytris luridis, punctatis,
margine exteriori et anteriori rubris. *Geoff. Ins.*
I. 260. 9.

Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*

Statura et summa affinitas C. sanguinolentae, a qua
tamen manifeste differt elytris multo laeviori-
bus, et margine anteriori sanguineo; color omnis
niger, parum aeneo tinctus.

40. C. ovata, atra, elytris margine exteriori sanguineis. *sanguine-*
Linn. Syst. Nat. II. 591. 38. Fn. Sv. 529. lenta.

Chrysomela nigro coerulea, elytris atris punctatis,
margine exteriori rubro. *Geoff. Ins. I. 259. 8.*
tab. 4. fig. 8.

Buprestis sanguinolenta. *Scop. carn. 203.*
Habitat in Europa.

41. C. ovata, nigro aenea, elytris margine luteis. *Linn. marginata.*
Syst. Nat. II. 591. 39. Fn. Sv. 529.

Habitat in Europae pratis apricis.
Elytra striato-punctata.

- marginel.* 42. C. ovata, nigro coerulea, thorace elytrisque margin'e luteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 591. 40. *Fn. Sv.* 331.
Habitat in Europae ranunculis.
- bannove- riana.* 43. C. ovata, cyanea, thorace margine, elytris margine vittaque ferrugineis.
Habitat in Germania. *D. de Hattorf.*
Parva. Statura C. marginatae, cyaneo nitida, glabra.
Antennae moniliformes nigrae. Thorax margine late ferrugineo. Elytra punctato striata, margine vittaque media ferrugineis, quae postice cum margine coit.
- litura.* 44. C. ovata, rufescens, elytris sutura lineaque longitudinali nigris.
Habitat in Anglia, capta in fabuletis Richmondensibus, die VI. Maj.
Statura Ch. pallidae, at duplo minor. Caput rufum, margine postico nigro. Thorax rotundatus, nitidus, immaculatus. Elytra striato punctata, sutura lineaque media nigris. Subtus nigra, pedibus pallidis. Mas pallidus, ubi foemina rufescens, interdum linea nigra elytrorum deest.
- lineola.* 45. C. ovata, flava, coleoptris punctis undecim lineisque duabus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 593. 47.
Habitat in America.
Puncta 3 ad basin, lineola abbreviata in medio; puncta 2 ad apicem, et unicum commune.
- sacra.* 46. C. ovata, supra rufa, thoracis linea punctis duobus, elytrorumque sutura nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 593. 49. *Mus. Lud. Vlr.* 40.
Habitat in Palaestina.
Alae sanguineae.
- haemor- rhoidalis.* 47. C. ovata, nigra, nitida, antennis basi flavescentibus, ano supra rubro. *Linn. Syst. Nat.* II. 587. 6. *Fn. Sv.* 508.
Coccionella haemorrhoidalis. *Scop. Ent. carn.* 225.
Habitat in betula, alno.
Elytra striato punctata.

48. C. ovata, nigra, thorace rotundato angustiori, pedibus posticis elongatis. *obscursa.*

Chrysomela obscura subcylindrica, thorace pedibusque nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 599. 96.*

Habitat in Europa.

Thorax valde gibbus, elytris angustior.

49. C. ovata, viridis, elytris flavis, viridi maculatis, antennis pedibusque ferrugineis. *philadelphica.*

Chrysomela philadelphica ovata, viridis, elytris flavis: punctis virescentibus, oblongiusculis, antennis pedibusque ferrugineis. *Linn. Syst. Nat. II. 592. 44.*

Petiv. Gazoph. tab. 26. fig. II.

Habitat in Pennsylvania.

Variat futura viridi et flava.

50. C. ovata, coeruleoescens, nitida, subtus nigra. *Linn. Armoraciae.*
Syst. Nat. II. 588. 16. Fn. Sv. 515.

Habitat in cochlearia armoracia, Ranunculo aquatili et R. flammula.

51. C. oblonga, nigra, punctata, elytris coriaceis. *Tanaceti.*

Chrysomela Tanaceti ovata, atra, punctata, antennis pedibusque nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 587. 5. Fn. Sv. 507.*

Galleruca atro fusca, elytris lineis tribus elevatis, punctis numerosis. *Geoff. Inf. I. 252. I. tab. 4. fig. 6.*
Habitat in Tanaceto Europae.

Variat colore toto obscure griseo.

52. C. oblonga, thorace flavescente, elytris viridibus: punctis sex nigris. *12 punctata.*

Habitat

Statura et magnitudo C. alni. Caput nigrum. Antennae nigrae, articulo secundo et tertio virescentibus. Thorax flavescente puncto utrinque impresso. Elytra viridia, punctis sex nigris distinctis per paria dispositis. Pectus nigrum, abdomen et pedes flavescentes.

53. C. oblonga, violacea, elytris vage punctatis, pedibus antennisque nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 587. 9. Fn. Sv. 511.* *Alni.*

Cryptocephalus violaceus, punctis inordinatis. *Geoff.*
Inf. 1. 332. 1.

Scarabaeus Alni coeruleus. *Frisch. Inf.* 7. p. 13. tab. 8.
 Habitat in betula, alno.

Betulae. 54. *C. oblonga*, violacea, elytris punctato-striatis. *Linn.*
Syst. Nat. II. 587. 10. *Fn. Sv.* 514.

Chrysomela nigro-purpurea, punctis excavatis striata.
Geoff. Inf. 1. 264. 17.

Coccionella Betulae. *Scop. Ent. carn.* 221.

Roef. Inf. 2. *Scarab.* 3. tab. 1.

Habitat in betulae albae foliis paginam inferiorem
 exedens.

Vitelli- 55. *C. oblonga*, viridi aenea.

nae. *Chrysomela Vitellinae ovata*, viridi coerulea. *Linn.*
Syst. Nat. II. 589. 23. *Fn. Sv.* 519.

Coccinella vitellinae. *Scop. carn.* 224.

Roef. Inf. 2. *Scarab.* 3. p. 5. tab. 1.

Habitat in salice.

Parva, tota aenea, elytris striato-punctatis. *Larvae*
 foetentes, flavae, nigro punctatae, capite cauda-
 que nigris, in turnis parallelis foliorum pul-
 pam exedunt.

vulgatissi- 56. *C. oblonga*, coerulea, antennis basi ferrugineis. *Linn.*
ma. *Syst. Nat.* II. 589. 22. *Fn. Sv.* 517.

Coccinella vulgatissima. *Scopol. carn.* 222.

Habitat in Europae salicibus.

Affinis praecedenti, at paulo major.

aenea. 57. *C. oblonga*, viridis, nitida, elytris aeneis.

Chrysomela aenea ovata, viridis, nitida, abdomine
 postice ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* II. 587. 8.
Fn. Sv. 510.

Chrysomela viridis, nitida, thorace antice excavato,
 fasciis elytrorum longitudinalibus coeruleis. *Geoff.*
Inf. 1. 261. 12.

Habitat in betula, alno.

analis. 58. *C. oblonga*, atra, elytris fuscis, margine exteriori
 testaceo. *Linn. Syst. Nat.* II. 582. 42.

Habitat ad praedium Ill. Archiatri Linné *Hammarby*.
 Thorax ater, nitens. Antennae basi pallescentes.

I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus.* 105

59. *C. oblonga*, thorace marginato, sanguineo: macula *coccinea*, nigra, elytris sanguineis: maculis duabus nigris.

Linn. Syst. Nat. II. 592. 43. Fn. Sv. 532.

Coccinella coleoptris rubris, maculis 4. nigris. Uddm.

Diss. 13.

Habitat in Europae borealis corylo.

60. *C. oblonga*, nigra, coleoptris rubris, punctis decem *10 macu-* nigris, duobus communibus. *lata.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Statura *C. coccinea*. Corpus nigrum. Thorax submarginatus, rufus, maculis duabus magnis dorsalibus nigris. Coleoptera *coccinea* punctis nigris decem.

3. 2. 3. 2.

65. *C. oblonga*, viridi aenea, thoracis marginibus albis, *20 puncta-* elytris albis: maculis decem aeneis. *ta.*

Petiv. Gazoph. tab. 29. fig. 5.

Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*

Statura *C. analis*. Thorax aeneus, marginibus incrassatis albis. Elytra alba, sutura maculisque decem oblongis aeneis. Pedes aenei, geniculis albis.

29. CRYPTOCEPHALVS.

Palpi filiformes.

Maxilla unidentata.

Labium corneum, integrum.

Antennae filiformes.

1. *C. niger*, obscurus, elytris pallidis: maculis tribus *longipes*, nigris, pedibus anticis elongatis.

Habitat Dresdæ.

Statura *C. tridentati*, at major. *Antennae breves*, serratae. Thorax niger, subpubescens. Elytra pallida, punctis tribus nigris, uno ad basin et pari in medio. Pedes nigri, antici in omnibus, quos vidi, elongati.

G 5

2. C.

- 4 punctata-* 2. *C. niger*, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis brevibus ferratis.
tus. Chrysomela 4. punctata cylindrica, thorace nigro, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis brevibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 596. 76. *Fn. Sv.* 432.
Melolontha coleoptris rubris, maculis quatuor nigris, thorace nigro. *Geoff. Inf.* I. 195. tab. 3. fig. 4.
Euprestris quadripunctata. *Scopoli Ent.* 206.
Habitat in corylo frequens.
- 10 macu-* 3. *C. niger*, thorace elytrisque rubris: punctis quatuor nigris.
latus. *Habitat in Capite bonae speci.* *Mus. Dom. Banks.*
Statura et magnitudo omnino C. 4. punctati. Caput atrum, antennis brevibus ferratis, basi rufescens, punctis quatuor nigris; mediis duabus majoribus. Elytra glabra, rufa, pari punctorum ad basin, in medio macula magna vel potius fascia, margines haud attingens, atra, et punctum parvum ad apicem.
Subtus totus ater.
- obfitus.* 4. *C. testaceus*, antennis elytrorumque margine nigris.
Habitat in America. *Dom. Drury.*
Caput et thorax rufescens, glabra, nitida, antennis ferratis nigris. Elytra testacea, margine omni nigro in primis sutura. Abdomen cinereo fuscum. *Statura C. tridentati.*
- tridenta-* 5. *C. coeruleus*, elytris testaceis.
tus. Chrysomela tridentata cylindrica, thorace coeruleo, elytris testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 596. 73. *Fn. Sv.* 546.
Habitat in Lonicera Xylosteo.
Punctum parvum cyaneum ad basin elytrorum.
Pedes antici in altero sexu elongati.
- lineatus.* 6. *C. rufescens*, thorace maculis, elytris lineis duabus nigris.
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
Magnitudo praecedentis. Caput nigrum fronte rufescente. Antennae thorace longiores, filiformes, nigrae, basi rufescentes. Thorax glaber, rufescens, maculis duabus magnis dorsalibus nigris. Scutellum

I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus.* 107

1. *Ium nigrum.* Elytra rufescentia, vittis duabus longitudinalibus nigris, altera ad marginem, altera ad futuram. Subtus rufescens. Pedes nigri, femoribus basi rufis.
7. C. ater, glaber, thorace elytrisque punctis quatuor *Gorteriae.* flavescentibus.
Chrysomela Gorteriae. *Linn. Syst. Nat.* II. 596. 74.
Amoen. acad. 6. 394. 16.
Habitat in Gorteria C. B. S.
Puncta quatuor elytrorum per paria remota. Duo ad basin, duo ad apicem.
8. C. ater, thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. *auritus.*
Chrysomela aurita subcylindrica, nigra, thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 596. 75.
Habitat in corylo Saxoniae.
9. C. rufus, elytris maculis tribus nigris: anteriore postice didyma. *didymus.*
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Statuta praecedentis. Antennae thorace longiores, filiformes, nigrae, basi rufescentes. Caput et thorax obscure rufa, immaculata. Elytra punctato striata, glabra, rufa, futura dimidiaque parte postica marginis exterioris, maculisque tribus disci nigris. Macula anterior oblonga, postice didyma, media subrotunda, tertia versus apicem linearis. Subtus rufus, pectore pedumque geniculis nigris.
10. C. thorace tibiisque luteis, elytris luteis: maculis duabus coerulescenti nigris. *4 maculatus.*
Chrysomela 4. maculata. *Linn. Syst. Nat.* II. 596. 77.
Habitat in Saxonie.
Puncta elytrorum remota, alterum ad basin, alterum ad apicem.
11. C. obscure aeneus, elytris testaceis. *longimanus.*
Chrysomela longimana, subcylindrica obscuro-aenea, elytris livido-flavis, pedibus anticis longissimis. *Linn. Syst. Nat.* II. 599. 95.
Habitat in trifolio montano Sueciae.

Pun-

Punctum paryum, aeneum ad basin elytrorum, et pedes in altero sexu elongati. Videtur varietas minor *C. tridentati.*

- bipunctata.* 12. *C. niger*, nitidus, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longitudine corporis.

Chrysomela bipunctata cylindrica, thorace nigro, nitido, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longis. *Linn. Syst. Nat.* II. 597. 78. *Fn. Sv.* 548.

Cryptocephalus niger, elytris rubris, striatis, maculis quatuor limboque nigris. *Geoff. Inf.* I. 234. *Petiv. Gazoph.* tab. 31. fig. 4.

Chrysomela atra, elytris rubris, punctis quatuor nigris. *Uddm. Diff.* 21 & 22.

Habitat in Europae corylo.

Varietas linea longitudinali, loco punctorum.

- cordiger.* 13. *C. thorace variegato*, elytris rubris: punctis duobus nigris.

Cryptocephalus niger, thoracis lineis flavis, elytris rubris punctatis, maculis quatuor limboque nigris. *Geoff. Inf.* I. 235. 7.

Chrysomela cordigera cylindrica, thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 598. 91. *Fn. Sv.* 558.

Chrysomela nigra, elytris subflavis, punctis quatuor nigris. *Uddm. Diff.* 23.

Habitat in Europae corylo, salice. Macula intermedia thoracis interdum cordata.

- bothnicus.* 14. *C. ater*, thorace linea longitudinali rubra.

Chrysomela bothnica. *Linn. Syst. Nat.* II. 598. 90. *Fn. Sv.* 557.

Habitat in Suecia.

Frons macula quadrata rufa. Pedes flavescentes.

- vitis.* 15. *C. niger*, glaber, elytris rufis. *Geoff. Inf.* I. 233. 2.

Habitat in vite vinifera Europae australis, quam misere saepius depascit.

An satis distinctus a *C. coryli*?

I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus.* 109

16. *C. niger*, thorace elytrisque testaceis, immaculatis. *Coryli.*
Chrysomela Coryli cylindrica, thorace elytrisque testaceis, pedibus nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 598. 88.*
Fn. Sv. 555.
Habitat in Europae corylo.
17. *C. niger*, thorace rufo, elytris testaceis. *ruficollis.*
Habitat in insula St. Heleneae. *Mus. Dom. Banks.*
Caput nigrum, antennis filiformibus, longitudine corporis. Thorax glaber, rufus, immaculatus. Elytra laevia, testacea. Abdomen nigrum, segmentorum marginibus rufis. Pedes atri.
Variat, margine thoracis pallido femoribusque basi rufis.
18. *C. niger*, thorace variegato, elytris rubris: maculis tribus nigris. *6 punctatus.*
Chrysomela 6 punctata cylindrica, thorace variegato, elytris rubris: maculis tribus nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 599. 92. Fn. Sv. 559.*
Buprestis 6 punctata. *Scopoli Entom. 208. Sultz. Inf. tab. 3. fig. 18.*
Habitat in Europa.
Genicula tibiarum puncto albo notata.
19. *C. violaceus*, capite thorace femoribusque dentatis rufis. *calcatus.*
Habitat ad Sierra Leon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus medium *C. longimani*. Caput rufum, antennis oreque nigris. Thorax valde globosus, glaber, rufus. Elytra striata, violacea. Abdomen nigro violaceum. Pedes violacei, femoribus dente acuto notatis, rufis basi apiceque nigris.
20. *C. cyaneus*, thorace pedibusque rufis. *cyaneus.*
Melolontha coerulea, thorace pedibusque ferrugineis.
Geoff. Inf. I. 197. 4.
Habitat in Gallia. *D. Mallet.*
Statura *C. cordigeri*. Caput et elytra cyanea, nitida. Thorax glaber, rufus.
21. *C. viridi coeruleus*, antennis nigris. *sericeus.*
Cryptocephalus viridi auratus, sericeus. Geoff. Inf. I. 233.
Chryso.

Chrysomela sericea cylindrica, thorace coeruleo, clytris pedibusque coeruleis. *Linn. Syst. Nat.* II. 598.
86. *Fn. Sv.* 554.

Habitat in salicibus.

nitens. 22. *C. viridis*, nitens, ore pedibusque testaceis.

Chrysomela nitens cylindrica, thorace coeruleo, nitido, elytris coeruleis, pedibus testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 598. 84. *Fn. Sv.* 551.

Habitat in Europa.

glabratus. 23. *C. violaceus*, thorace elytrisque viridi aeneis, antennis fuscis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Caput aeneum fronte canaliculato. Antennae fuscae, basi ferrugineae. Thorax glaber, laevis, nitens, aeneus. Elytra laevissima, nitida, aenea. Subtus totus violaceus.

vittatus. 24. *C. niger*, elytris margine striaque abbreviata flavis.

Cryptocephalus niger, elytro singulo duplice, linea longitudinali flava. *Geoff. Inf.* I. 233. 4.

Habitat in graminosis Europae australis.

Magnitudo et statura C. Moraei; Corpus nigrum, nitidum. Elytrorum margo exterior flavus, et in medio stria abbreviata flava.

Moraei. 25. *C. ater*, elytris maculis duabus flavis marginalibus.

Cryptocephalus niger, capite thoraceque antice luteis, elytro singulo externe macula duplice flava. *Geoff. Inf.* I. 234. 5.

Chrysomela Moraei cylindrica, thorace nigro, elytris nigris; maculis duabus rubris marginalibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 597. 82. *Fn. Sv.* 550.

Buprestis Moraei. *Scopoli Ent.* 202.

Cassida nigra, nitida, clypeo caput fere integrum tenui, macula ad apicem et basin elytrorum lutea. *Gudd. Diff.* 28.

Var. Caput et thorax interdum albo maculata.

is gutta-sus. 26. *C. rufus*, thorace maculis tribus, elytris sex flavis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae nigrae, basi flavescentes. Caput rufum, fronte flavo. Thorax glaber, nitens, rufus, maculis

I. ELEVTERATA. *Cryptocephalus.* III

culis tribus flavis, lateralibus majoribus sublunatis.
Elytra glabra, rufa, maculis sex per paria dispositis
flavis. Pedes rufi, femoribus anticis puncto flavo.

27. C. capite thoraceque variegatis coleoptris flavis, *10 punctatus*
punctis 10. nigris.

Chrysomela 10 punctata cylindrica, thorace variegato,
elytris flavis: punctis quinque nigris. *Linn. Syst.*
Nat. 2. 597. Fn. Sv. 560.

Habitat in Italia. *D. Albini.*

Parva. Statura C. pini. Caput flavum, punctis tribus
parvis nigris. Thorax rotundatus, flavus, punctis
quinque difformibus connatis nigris. Elytra lae-
via, flava, punctis quinque nigris. Tria horum
ad suturam exteriorem subrotunda, duo majora
oblonga in medio. Corpus nigrum, pedes flavi.

28. C. niger, elytris rufo bimaculatis.

Chrysomela 4 pustulata. Linn. Syst. Nat. II. 597. 80. 4 pustula-
Fn. Sv. 549.

Habitat in Suecia.

Maculae elytrorum rufae, remotae, altera major ad
basin, altera minor ad apicem.

29. C. rufus, elytris punctis duobus coerulescentibus.

Koenigii.

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Statura et magnitudo omnino C. Scopolini. Caput
et thorax obscure rufa. Elytra paulo pallidiora
punctis duobus coeruleis, quae margines haud
attingunt.

30. C. niger, thorace rufo, elytris rufis: fasciis duabus *scopolinus*.
cyaneis.

Chrysomela scopolina cylindrica, thorace rufo, elytris
rufis: fasciis duabus nigris. *Linn. Syst. Nat. II.*
597. 81.

Habitat in America, Europa australi.

Fasciae elytrorum nec suturam nec marginem
attingunt.

31. C. elytris flavis, lineola punctisque tribus nigris.

paracen-
tesis.

Chrysomela paracentesis. Linn. Syst. Nat. II. 1066. I.

Habitat in Europa australi.

Supra flavus, thorace nigro variegato.

32. C.

Pini. 32. *C. testaceus*, elytris pallidis, antennis fuscis.
Chrysomela Pini cylindrica, testacea, elytris pallidioribus, pedibus concoloribus, antennis fuscis. *Linn.*
Syst. Nat. II. 598. 89. *Fn. Sv.* 556.

Habitat in pino Sueciae.

labiatus. 33. *C. ater*, nitidus, ore pedibus basique antennarum lutescentibus.
Chrysomela labiata subcylindrica, atra, thorace nitido, ore pedibus anticis basique antennarum lutescentibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 598. 87. *Fn. Sv.* 553.

Habitat in Europae rosis. Minutus.

30. ALTICA. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla cylindrica, bifida:
laciniis linearibus.
Antennae moniliformes.

bicolor. 1. *A. rufa*, elytris femoribusque posticis coeruleis.
Chrysomela bicolor saltatoria, ovata, rufa, elytris femoribusque posticis coeruleis. *Linn. Syst. Nat.* II. 593. 52.
Habitat in America.
Gigas in hoc genere.

aequino-
Etialis. 2. *A. thorace rubro*, elytris violaceis, maculis quatuor albis alternis.
Chrysomela aequinoctialis. *Linn. Syst. Nat.* II. 596. 71.
Habitat in America meridionali.

oleracea. 3. *A. viridi coerulea.* *Geoff. Inf.* I. 245.
Chrysomela oleracea saltatoria, virescenti coerulea.
Linn. Syst. Nat. II. 593. 51. *Fn. Sv.* 534.
Scopoli Ent. carn. 212.
Habitat in Cotyledonibus plantarum, in primis Tetradymanistarum, quas misere destruit.
Pellitur cineribus vegetabilium, in primis Tabaci.

albicollis. 4. *A. thorace pallido*, elytris aeneis: maculis duabus fasciaque aureis.
Habitat in nova Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*

Statu-

Statura et magnitudo A. oleraceae. Caput nigrum, antennis filiformibus, basi pallidis. Thorax rotundatus, totus pallidus. Elytra glabra, nitida, aenea, punctis duobus baseos fasciaque media aureis. Abdomen nigrum. Pedes pallidi, femoribus posticis crassioribus nigris.

5. A. viridis, nitida, pedibus testaceis: femoribus posticis violaceis. *Hyoscyami.*

Altica coerulea elytris striatis, tibiis ferrugineis. *Geoff. Inf. I. 248. II.*

Chrysomela Hyoscyami saltatoria, virescenti-coerulea, pedibus testaceis, femoribus posticis violaceis. *Linn. Syst. Nat. II. 594. 54. Fn. Sv. 536.*

Capricornus exiguus, saltatorius. *Raj. Inf. 98. 9.*
Habitat in hyoscyamo, brassica.

6. A. viridi-aenea, pedibus nigris.

Habitat in Anglia. *Mus. D. Hunter.*

Affinis A. Hyoscyami, at pedes omnes nigri.

nigripes.

7. A. viridis, nitens, capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis. *nitidula.*

Altica nigra, aurata, thorace aureo, femoribus ferrugineis. *Geoff. Inf. I. 249. 13.*

Chrysomela nitidula, saltatoria, elytris coeruleis, capite thoraceque aureo, pedibus ferrugincis. *Linn. Syst. Nat. II. 594. 60. Fn. Sv. 542.*

Habitat in Europae salice.

8. A. viridi aenea, antennis fuscis, pedibus testaceis. *Helxinis.*

Altica aurea, pedibus flavis. *Geoff. Inf. I. 249. 14.*

Chrysomela Helxinis saltatoria, viridi aenea, antennis pedibusque omnibus testaceis. *Linn. Syst. Nat. II. 594. 58.*

Chrysomela Helxinis. *Sultz. Inf. tab. 3. fig. 12.*
Habitat in polygono fagopyro.

9. A. supra albida: fasciis tribus fuscis.

Chrysomela trifasciata saltatoria, supra albida: fasciis tribus fuscis. *Linn. Syst. Nat. II. 594. 61.*

Habitat in Europa.

Fascia unica capitis, duea elytrorum. Femora rufa,

- erythrocephala.* 10. A. atro coerulea, capite geniculisque pedum rufis.
Altica nigro-aenea, elytris striatis, pedibus ferrugineis. *Geoff. Inf.* I. 246. 4.
Chrysomela saltatoria erythrocephala. *Linn. Syst. Nat.* II. 594. 56. *Fn. Sv.* 538.
Habitat in Europa.
- atricilla.* 11. A. nigra, thorace elytrisque cinereis.
Altica elytris pallido flavis, capite nigro. *Geoff. Inf.* I. 251. 19.
Chrysomela atricilla saltatoria, nigra, thorace elytris tibiisque testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 594. 55. *Fn. Sv.* 537.
Habitat in Europa.
- anglica.* 12. A. atra, elytris tibiisque pallidis.
Habitat in Anglia. *Mus. D. Hunter.*
Statura et affinitas summa A. atricillae, at thorax etiam ater. Tibiae pallidae.
- 4 pusilla-* 13. A. nigra, coleoptris punctis quatuor rufis. *Geoff. Inf.*
ta. 2. 250. 15.
Habitat in hortis Angliae, Galliae.
Magnitude A. rufipedis, punctum alterum elytrorum ad basin, alterum versus apicem.
- rufipes.* 14. A. coerulea, capite thorace pedibus antennarumque basi rufis.
Altica nigra, elytris coeruleis, thorace pedibusque rufis. *Geoff. Inf.* I. 245. 2.
Chrysomela rufipes, saltatoria, coerulea, obovata, capite thorace pedibus antennisque rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 595. 65. *Fn. Sv.* 545.
Habitat in Europa.
- fuscipes.* 15. A. violacea, capite thoraceque rufis, pedibus nigris.
Habitat in Anglia.
Forte varietas A. rufipedis, a qua solis pedibus nigris differt.
- testacea.* 16. A. testacea, gibba, elytris laevissimis.
Altica ovata, ferruginea, elytris punctis sparsis. *Geoff. Inf.* I. 250. 17.
Habitat in Anglia. *Dom. Banks.*

Differt

Difserit sane ab A. exoleta. Major est, magis gibba,
thorace elytrisque laevissimis, nitidis.

17. A. ferruginea, elytris striatis. *Geoff. Inf.* I. 250. 4. *exoleta.*

Chrysomela exoleta, saltatoria, livida, pedibus testaceis, capite abdomineque fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 594. 59. *Fn. Sv.* 541?

- Altica oblonga ferruginea, elytris striatis. *Geoff. Inf.* I. 250. 16.

Habitat in Echii floribus.

18. A. nigra, nitida, elytris apice punto rubro. *holistica.*

Chrysomela holistica. *Linn. Syst. Nat.* II. 595. 67. *Fn. Sv.* 544.

Habitat apud nos frequens, olera depascens.

19. A. pallida, oculis nigris.

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

tabida.

Statura omnino A. exoletae, at paulo minor, tota pallida, immaculata, oculis solis nigris, prominulis. Elytra laevia.

20. A. atra, elytris flavis: margine omni nigro.

nemorum.

Altica atra, elytris longitudinali in medio flavescen-
tibus. *Geoff. Inf.* I. 247. 9.

Chrysomela nemorum saltatoria; elytris linea flava,
pedibus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 595. 62.

Fn. Sv. 543.

Habitat in Pulmonaria, Dentaria, Cardamine po-
lyphaga.

Duae sunt varietates, vix nisi magnitudine differentes.

21. A. atra, nitida, antennarum basi plantisque piceis.

atra.

Altica nigra, subrotunda, tibiis ferrugineis. *Geoff. Inf.* I. 247. 8.

Habitat Hafniae.

Parva, tota atra, solis plantis pedum et basi anten-
narum subrufescensibus.

22. A. suborbiculata, depreffsa, nigra.

Chrysomela hemisphaerica, saltatoria, nigra, hemi-
sphaerica, tibiis piceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 595. 68. *hemisphae-*

rīca.

Habitat in corylo Saxoniae.

- furina-*
mensis.
23. A. flavescens, elytris margine fasciaque sanguineis.
Chrysomela surinamensis. *Linn. Syst. Nat.* II. 595. 69.
Habitat Surinami.
Antennae et pedes pallidi.
- S. littera.* 24. A. pallida, elytris nigris, linea longitudinali flexuosa alba.
Chrysomela S. littera, saltatoria, pallida: linea longitudinali flexuosa alba. *Linn. Syst. Nat.* II. 595. 70.
Habitat Surinami.

31. CISTELA. *Palpi filiformes*
Maxilla unidentata.
Labium membranaceum,
bifidum.
Antennae filiformes.

- cervina.* 1. C. livida, pedibus fuscis.
Cistela subvillosa, viridefcens, fasciis longitudinalibus fuscis interruptis. *Geoff. Inf.* I. 116?
Chrysomela cervina oblonga, livida, thorace postice transverso. *Linn. Syst. Nat.* II. 602. 115. *Fn. Sv.* 575.
Habitat in Europa.
- livida.* 2. C. livida, antennis fuscis.
Habitat in terra del Fuego. *Muf. Dom. Banks.*
Statura praecedentis, at duplo minor. Antennae fuscae articulis superne lividis. Thorax et elytra glabra, nitida, livida. Abdomen et pedes lividi, at paulo obscuriores.
- Ceramboi-*
des. 3. C. atra, elytris striatis, testaceis.
Chrysomela Ceramboides oblonga, nigra, elytris testaceis, antennis ferratis. *Linn. Syst. Nat.* II. 602. 117.
Fn. Sv. 576.
Mordella nigra elytris fulvis striatis. *Geoff. Inf.* I. 354. 3.
- testacea.* 4. C. nigra, thorace elytris abdomineque testaceis.
Habitat in Europa australi. *Forskäbl.*
Statura C. ceramboidis. Antennae nigrae, articulis conicis. Thorax punctis duobus dorsalibus impressis.

5. C. flava, elytris sulphureis. *sulphurea.*

Chrysomela sulphurea oblonga, flava tota. Linn. Syst.

Nat. II. 602. 114.

Tenebrio lutea. Geoff. Inf. I. 351. II.

Habitat in floribus umbellatarum.

Antennae fuscae.

6. C. rufescens, antennis, macula elytrorum, anoque *nigris.* *analis.*

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Statura et magnitudo C. sulphureae.

Antennae fere longitudine corporis, nigrae. Caput et thorax imprimis subtus flavescens. Elytra rufa, macula magna baseos nigra. Abdomen rufum, anō nigro.

Variat elytris maculis duabus nigris, altera baseos, altera versus apicem.

7. C. nigra, elytris pedibusque testaceis. *murina.*

Chrysomela murina oblonga, nigra, elytris pedibusque testaceis. Linn. Syst. Nat. II. 602. 118. Fn. Sv. 577.

Mordella nigra, elytris fulvis, laevibus. Geoff. Inf. I.

355 - 4.

Habitat in Europa.

8. C. pallida, capite elytrorumque apicibus fuscis. *pallida.*

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Hunter.*

Statura omnino C. murinae, at caput et elytrorum apices fusca. Antennae fuscae, pedes pallidi.

9. C. flava, capite pectoreque nigris, elytris viridibus. *aeruginea*

Habitat in Africa.

Statura C. sulphureae. Antennae filiformes, basi virescentes, medio nigrae, apice flavae, ultimo articulo tamen nigro. Thorax et abdomen flava. Elytra et pedes viridia, glabra, nitida.

10. C. nigra, thorace rufo, elytris nigris: margine vitta- que luteis. *innuba.*

Habitat in America. *D. Drury.*

Statura et magnitudo C. murinae. Antennae filiformes, rufescentes. Caput atrum, nitens. Thorax rotundatus, laevis, flavus. Elytra fusca, punctata, margine exteriori vittaque longitudinali versus futuram flavis. Pedes lutei.

- melanocephala.* 11. *C. thorace flavo, elytris pallidis, vitta media nigra.*
Habitat in America septentrionali. Mus. Dom. Banks.
Statura praecedentis; caput nigrum. Pedes pallidi,
plantis nigris.
- quinquevittata.* 12. *C. testacea, elytrorum marginibus vittaque media*
nigris.
Habitat in Carolina. Dom. Menson.
Corpus testaceum, antennis nigris, ferratis. Elytra
rufescens, margine omni vittaque in medio unius-
cujusque elytri nigris. Femora postica valde in-
crassata, intus canaliculata.
- minuta.* 13. *C. nigra, elytris pedibusque griseis.*
Chrysomela minuta ovata, nigra, elytris pedibus thora-
cisque lateribus griseis. Linn. Syst. Nat. II. 593, 50.
Fn. Sv. 533.
Habitat in Europae aquosis,
Facies Dytisci.

32. CRIOCERIS. *Palpi filiformes.**Maxilla bifida.**Labium corneum inte-*
*grum.**Antennae filiformes.*

- nymphaea.* 1. *C. fusca, elytris margine prominulo flavescente.*
Chrysomela nymphaea oblonga, fusca, elytris margine
prominulo flavescentibus, Linn. Syst. Nat. II. 600. 99.
Fn. Sv. 565.
Galeruca pallida, thorace nigro variegato, elytris uni-
coloribus pallidis, Geoff. Inf. I. 254. 4.
Habitat in Nymphaeis Europae tarda,

- capreae.* 2. *C. thorace nigro maculato, elytrisque griseis, antennis*
nigris.
Chrysomela capreae oblonga, thorace nigro punctato,
elytrisque griseis, antennis nigris longis, Linn. Syst.
Nat. II. 600. 100. Fn. Sv. 516.
Galleruca nigra, thorace elytrisque luteolividis, Geoff.
Inf. I. 254. 5.

Habitat

Habitat in salicibus.

Abdomen nigrum.

3. C. pallida, elytrorum margine omni atro. *cincta.*
 Habitat Tranquebariae. *Koenig.*
 Statura et magnitudo C. Capreae. Corpus totum pallidum, flavescens, oculis nigris. Elytra adhuc pallidiora, sutura omni lineaque marginali postice interrupta atris. Margo ipse tenuissime pallidus.
4. C. ovata cinerea, elytris vitta lineolaque baseos nigris. *Calmariensis.*
 Chrysomela Calmariensis oblongiuscula, ferruginea, elytris macula longitudinali nigricante. *Linn. Syst. Nat. II. 600. 101.*
 Galeruca pallida, thorace nigro variegato, elytris fasciis duabus longitudinalibus nigris. *Geoff. Inf. I. 253. 3.*
 Habitat in Europa.
 Affinis C. Capreae. Thorax nigro variegatus.
5. C. ovata, rufa, antennis oculisque nigris. *sanguinea.*
 Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.*
 Statura omnino C. Capreae, at rubra, antennis oculisque nigris. Abdomen nigrum, pedes cinerei.
6. C. ferruginea, elytris margine thoraceque flavis. *tenella.*
 Chrysomela tenella oblongiuscula, ferruginea, elytris margine thoraceque flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 600. 102. Fn. Sv. 564.*
 Habitat in Europa.
 Affinis C. Capreae, at minor.
7. C. ferruginea, elytris violaceis, antennis nigris. *nigricornis.*
 Habitat in Germania. *D. de Hattorff.*
 Statura omnino praecedentium. Caput ferrugineum, basi parum violaceum, antennisque nigris. Thorax ferrugineus, puncto utrinque impresso. Elytra viridi violacea, glabra, nitida, subtus tota ferruginea, pectore puncto utrinque nigro.
8. C. rufa, capite nigro, elytris violaceis. *melanocephala.*
 Habitat in nova Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
 Magnitudo praecedentis. Caput et antennae nigra; thorax glaber, laevis, nitidus, rufus, punctis duobus dorsalibus impressis. Elytra laevia, cyanea. Scutellum rufum. Pedes nigri, femoribus rufis.

- cantha-* 9. *C. violacea*, capite thorace pedibusque rufis.
roidis. Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*
 Statura *C. nymphaea*. Antennae filiformes, basi rufescentes. Caput et thorax exacte *nymphaea*, rufa, immaculata. Elytra et abdomen cyanea, nitida.
- merdi-* 10. *C. rubra*, thorace cylindrico utrinque impresso.
gera. Chrysomela *merdigera* oblonga, rubra, thorace cylindrico utrinque impresso. *Linn. Syst. Nat.* II. 599. 97.
Fn. Sv. 563.
Crioceris rubra. *Geoff. Inf.* I. 239. I.
Attelabus Lilii. *Scopoli Ent.* 112.
Schaeff. Ebn. tab. 32.
Reaum. Inf. 3. tab. 17. fig. 12.
Merian. Europ. 3. tab. 21.
 Habitat in liliis conuallariis. Differt habitu ab hoc genere, attamen vix distinctum genus.
- 12 puncta-* 11. *C. thorace cylindrico*, rubra, elytris punctis sex nigris.
ta. Chrysomela *12 punctata* oblonga, rufa, elytris punctis sex, pectore pedumque geniculis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 601. 110. *Fn. Sv.* 568.
Crioceris rubra, punctis tredecim nigris. *Geoff. Inf.* I. 241. 2. tab. 4. fig. 5.
Attelabus 12 punctatus. *Scopoli Ent.* 114.
Frisch. Germ. 13. tab. 28.
 Habitat in Asparago.
 Statura *C. merdigerae*.
- bifascia-* 12. *C. thorace cylindrico*, rufa, elytris fasciis duabus atris.
ta. Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentis. Antennae nigrae, basi rufae; Caput et thorax glabra, nitida, rufa, immaculata. Elytra nitida, rufa, fasciis duabus atris, altera baseos, altera versus apicem. Pedes rufi, plantis fuscis.
- unifascia-* 13. *C. thorace cylindrico*, rufa, elytris fascia atra.
ta. Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et nimia affinitas praecedentis, cuius forte varietas. Differt solummodo basi elytrorum, haud atra, sed rufa.
- nigripes.* 14. *C. thorace cylindrico*, flava, antennis pectore pedibusque nigris.
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura

Statura et magnitudo C. merdigerae. Caput flavum, antennis filiformibus nigris. Thorax cylindricus, utrinque impressus, flavus. Elytra laevia, flava. Subtus flava, pectore pedibusque nigris.

15. C. thorace cylindrico, flava, elytris basi nigris, puncto oculata. flavo.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Caput et thorax flavescens, immaculata; Antennae filiformes, flavae longitudine corporis. Elytra vix striata, flava, basi nigra, puncto magno flavo. Pectus nigrum. Abdomen flavidus. Pedes flavi, femoribus nigris.

16. C. coerulea, thorace cylindrico: lateribus gibbis.

cyanella.

Chrysomela cyanella oblonga, coerulea, thorace cylindrico: lateribus gibbis. *Linn. Syst. Nat. II. 600. 104.*

Fn. Sv. 572.

Crioceris tota coeruleo viridis. *Geoff. Inf. I. 243. 5.*

Habitat in Europa.

Statura C. merdigerae.

17. C. oblonga coerulea, thorace pedibusque rufis.

melanopa.

Chrysomela melanopa oblonga, coerulea, thorace pedibusque rufis. *Linn. Syst. Nat. II. 601. 105. Fn. Sv. 573.*

Sultz. Inf. 3. tab. 3. fig. 19.

Habitat in Europa.

18. C. cyanea, thorace rufo, antennis pedibusque fuscis.

cyanoce-

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

phala.

Statura et magnitudo C. melanopae. Caput cyaneum, nitidum, antennis filiformibus fuscis. Thorax planus, glaber, rufus. Elytra laevia, cyanea. Pedes omnes fuscii.

19. C. oblonga, thorace rubro: punctis duobus nigris, coleoptris flavis: cruce punctisque quatuor nigris.

Asparagi.

Linn. Syst. Nat. II. 601. 112. Fn. Sv. 567. sub Chrysomela.

Crioceris thorace rubro, punctis duobus nigris, coleoptris flavis, cruce nigro. *Geoff. Inf. I. 241. 3.*

Attelabus Asparagi. *Scop. Ent. carn. 113.*

Roef. Inf. 2. Scar. 3. p. II. tab. 4.

Frisch. Germ. I. pag. 27. tab. 6.

Habitat in Europa asparagos devastans.

Phellan. 20. *C. oblonga*, nigra, thorace elytrisque lineis duabus flavis.

Chrysomela Phellandrii oblonga, nigra, thorace elytrisque lineis duabus luteis. *Linn. Syst. Nat. II. 601. III. Fn. Sv. 569.*

Chrysomela oblonga, nigra, elytrorum lineis duabus longitudinalibus luteis. *Geoff. Ins. I. 266. 20.*
Habitat ad Phellandrii aquatichi radices.

carolinia. 21. *C. oblonga*, flava, thorace punctis duobus, coelo-ptrisque vittis quinque nigris.

Habitat in Carolina. *D. Drury.*

Statura C. Asparagi. Caput flavum, antennis oculisque nigris; thorax vix marginatus, flavus, punctis nigris. Elytra flava vitta nigra ad marginem exteriorem, altera in medio elytri, et tertia communis per suturam; Femora postica incrassata, ferruginea.

tomentosa. 22. *C. oblonga*, thorace pallido punctis tribus nigris, elytris nigris vittis duabus albis.

Chrysomela tomentosa oblonga, elytris subtomentosis nigris: linea longitudinali margineque pallidis. *Linn. Syst. Nat. II. 601. 107.*

Habitat in America.

Affinis C. caroliniana. Caput nigrum fronte alba. Thorax pallidus, punctis tribus dorsalibus nigris. Elytra in rostro glabra, nitida, vitta duabus albis, quae apice coeunt. Margo elytrorum omnis niger. Abdomen fuscescens, lateribus albis. Femora postica incrassata, fusca, margine interiori pallido.

vittata. 23. *C. oblonga*, thorace rufo, elytris flavis: vitta nigra.

Habitat in Carolina. *Muf. Dom. Monson.*

Statura et magnitudo C. Phellandrii. Caput nigrum, antennis basi pallidis. Thorax rotundatus, glaber, rufescens. Elytra glabra, flava, vitta longitudinali nigra. Abdomen nigrum. Pedes flavescentes, geniculis nigris.

33. EROTYLVS. *Palpi inaequales, anteriores securiformes, posteriores clavati.*

Labium corneum, apice dilatatum, emarginatum.

Antennae filiformes.

1. E. ovatus, niger, coleoptris punctis fulvis numerosissimis. *Linn. Syst. Nat. II. 586. 1. sub Chrysomela. Coccinella gigantea. Sultz. Ins. tab. 3. fig. 15.* *Giganteus.*

Habitat in India.

Dorsum gibbum, elevatum.

2. E. ovatus, elytris nigris: punctis quinque rubris. *Linn. Syst. Nat. II. 586. 3.* *spunctatus.*

Coccinella coleoptris nigris punctato impressis: maculis decem rubris, Gronov. Gazoph. 613. tab. 16. fig. 7. Habitat in America.

3. E. niger, elytris flavis, punctis numerosissimis nigris. *punctatis-*
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.* *simus.*

Statura E. 5 punctati. Antennae filiformes. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra gibba, punctis numerosis sparsis nigris. Corpus subtus piceum.

4. E. oblongus, ater, immaculatus. *Morio.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae filiformes, atrae. Thorax nitidus, ater, laevis. Elytra atra, punctato striata.

5. E. oblongus, ater, thorace elytrisque cupreis. *cupreus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnus ovatus. Corpus atrum, immaculatum. Antennae filiformes, nigrae. Thorax laevis, cupreus, obscure nitidus. Elytra punctato striata, cuprea, nitida.

6. E. oblongus, ater, elytris viridibus, striatis. *smaragdulus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino E. cuprei. Antennae filiformes, nigrae. Corpus obscurum, atrum. Thorax laevis, niger. Elytra viridia, punctato striata.

amethysti- 7. C. oblongus, ater, thorace elytrisque cyaneis.
nec. Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 E. smaragdulo nimis affinis. Antennae filiformes, nigrae,
 frons retusa. Thorax elytris angustior, laevis,
 glaber, coerulescens. Elytra striata, punctata. Cor-
 pus atrum, femoribus interdum rufis.

bicolor. 8. E. oblongus, ater, supra aeneus.
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura praecedentium. Caput aeneum, antennae fili-
 formibus palpisque securiformibus nigris. Thorax
 rotundatus, laevis, nitidus, aeneus. Elytra obscure
 aenea, punctato striata. Subtus totus ater.

34. LAGRIA. *Palpi* quatuor anteriores se-
 curiformes, posteriores
 extrorsum crassiores.

Labium membranaceum in-
 tegrum.

Antennae filiformes.

aenea. 1. L. obscure aenea, immaculata.
 Habitat in insulis Americae. *Mus. Dom. Banks.*
 Animalculum magnum, oblongum. Antennae filifor-
 mes, nigrae, articulis obconicis. Thorax et elytra
 obscure aenea, minime nitida.

livida. 2. L. livida, oculis nigris.
 Habitat in Otaheiti maris australis. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et magnitudo L. aeneae. Palpi anteriores lon-
 gissimi, securiformes, postici breviores, subfiliformes.
 Antennae filiformes, lucidae, longitudine corporis.
 Thorax et elytra laevia, glabra, livida, immaculata.
 Pedes lividi.

lineata. 3. L. livida, thorace lineis, elytris vitta fuscis.
 Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et magnitudo praecedentis. Antennae filifor-
 mes, lividae. Caput lividum, fronte macula fusca.
 Thorax subcylindricus, lineis tribus fuscis. Elytra
 laevia, glabra, livida, vitta lata fusca, quae tamen
 apicem elytri haud attingit. Subtus livida.

4. L.

4. *L. coerulea*, antennis fuscis. *cyanæa.*
Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.
Statura omnino L. lividae, at duplo minor. Antennæ longæ, filiformes, fuscae. Corpus glabrum, obscure cyaneum. Anus stylis duobus validis, acutis. Femora postica crassiora, incurva.
5. *L. rufa*, elytris vitta, abdominisque apice fuscis. *vittata.*
Habitat in America. D. v. Rohr
Paulo major L. elongatae. Caput cum antennis rufum, oculis nigris. Thorax rotundatus, rufus, immaculatus. Elytra rufescens, vitta lata fusca, vel potius fusca margine omni rufescens. Abdomen rufum, apice fuscum. Pedes rufi.
6. *L. atra*, thorace rufo, villoso. *elongata.*
Chrysomela elongata, atra, thorace rubro, subvilloso. Linn. Syst. Nat. II. 603. 122.
Habitat in Anglia.
7. *L. nigra*, thorace marginato villoso, elytris glabris, pubescens. *testaceis.*
Chrysomela pubescens elongata, nigra, thorace nigro, villoso, elytris plantisque testaceis. Linn. Syst. Nat. II. 603. 120.
Habitat in Germania.
Nimis affinis videtur L. hirtae, at paulo major.
8. *L. villosa*, nigra, thorace tereti elytris testaceis. *hirta.*
Chrysomela hirta oblonga, villosa, nigra, thorace teretiusculo, elytris testaceis. Linn. Syst. Nat. II. 602. 119.
Fn. Sv. 578.
Habitat in Europa.
9. *L. villosa*, cyanea, abdomine femoribusque rufis. *tomentosa.*
Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.
Statura praecedentis. Antennæ rufescentes, apice fuscae. Caput et thorax villosa, obscure cyanea. Elytra hirta, paulo dilutiiora. Abdomen rufum. Pedes nigri, femoribus rufis.
Variat elytris fuscis.
10. *L. glabra*, thorace rufescente, elytris flavis. *glabrata.*
Habitat in Anglia. Mus. Dom. Banks.
Statura et magnitudo omnino L. hirtae, at tota glabra.

antherina. 11. L. nigra, elytris fasciis duabus ferrugineis.

Meloe antherinus, alatus, niger, elytris fasciis duabus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 681. 16. *Fn. Sv.* 829.
Habitat frequens in floribus, agilis, cursitans, vix pediculo major.

floralis. 12. L. nigra, thorace ferrugineo.

Meloe floralis, alatus, niger, elytris maculis duabus pallidis obsoletis. *Linn. Syst. Nat.* II. 681. 15. *Fn. Sv.* 829?
Habitat in Europae plantis.
Statura omnino praecedentis.

35. ZYGIA. *Palpi inaequales, filiformes.*

Maxilla unidentata.

Labium elongatum, membranaceum.

Antennae moniliformes.

oblonga. 1. ZYGIA.

Habitat in Oriente. *Forstkäbl.*

Media, oblonga, rufa, capite elytrisque obscure cyanis. Thorax rotundatus, immarginatus, punctatus, carinatus. Scutellum rotundatum. Elytra rugosa, obtusa, lineis elevatis tribus laevibus. Pedes rufi, inermes.

36. ZONITIS. *Palpi filiformes.*

Maxilla palpis longior, integrata.

Labium emarginatum.

Antennae setaceae.

chrysomela- 1. Z. flava, elytris puncto medio apiceque nigris.
lina. Habitat in Oriente. Prof. *Forstkäbl.*

Statura cistelae et magnitudo sulphureae. Caput flavum ore, antennis oculisque nigris. Thorax glaber, nitens, flavus, puncto medio nigro. Elytra laevia, flava, puncto et apice nigris. Subtus atra.

2. Z.

2. Z. rufescens, clytris flavis, apice nigro.

Habitat in Oriente. Prof. Forstkahl.

Statura et affinitas praecedentis, at minor. Antennae, excepto ultimo articulo, nigrae. Caput et thorax rufescens, immaculata. Elytra laevia, flava, apice fusca. Abdomen basi nigricans. Pedes flavi,

flave.

37. APALVS. *Palpi aequales, filiformes.*

Maxilla cornea, unidentata.

*Labium membranaceum,
truncatum, integrum.*

Antennae filiformes.

I. APALVS.

*2 macula-
tus.*

Meloe bimaculatus alatus, niger, clytris luteis, macula nigra postica. Linn. Syst. Nat. II. 680. 9. Fn. Sv. 828. Vddm. Diff. 82.

Habitat primo vere in Europae arenosis.

38. CVRCVLIO. *Palpi quatuor filiformes,*

*Maxilla cylindrica, uni-
dentata.*

Labium integrum.

*Antennae infedentes rostro
corneo.*

* *Longirostres femoribus simplicibus.*

1. C. longirostris, thorace elytrisque scabris, antennis apice albis.

Gigas.

Habitat in Japonia. Mus. Brit.

Magnitudo fere C. palmarum. Rostrum elongatum, cylindricum, arcuatum, antice fuscum, postice cinereum. Thorax rotundatus, in primis lateribus punctis elevatis acutis, scaber, fuscus, dorso cinerascente. Elytra connata, scabra, obscure grisea, punctis fuscis, albisque vagis. Femora scabra, inermia. Antennae clavatae, apice albae.

2. C.

- Palma-
rum.* 2. *C. longirostris*, ater, thorace supra plano, elytris abbreviatis striatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 506. *Mus. Lud.* *Vlr.* 42.
Cossus saguarium. *Rumph. amb.* I. p. 79. tab. 17. fig. 9.
Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 5.
Gronov. Zooph. 578. tab. 16. fig. 4.
Merian. Sur. tab. 48. fig. 3.
Sulzr. Inf. tab. 3. fig. 20.
Habitat in Indiae palmis.
- cruenta-
tus.* 3. *C. longirostris*, ater, thorace lineis, elytrisque punctis duobus sanguineis.
Habitat in Carolina. *Mus. Dom. Banks.*
Statura S. palmarum, at minor. Rostrum elongatum, compressiusculum, arcuatum, atrum. Antennae clava ferruginea, truncatae. Thorax planus, ater, lineis duabus dorsalibus subflexuosis sanguineis. Elytra abbreviata striata, holosericea, atra, punctis duobus disci sanguineis. Pedes atri, femoribus simplicibus. Tibiae apice spina valida, acuta, arcuata.
- indus.* 4. *C. longirostris*, ater, thorace subovato, excavato, punctato, elytris rugoso sulcatis, tibiis spinosis. *Linn. Syst. Nat.* II. 506. 2. *Mus. Lud.* *Vlr.* 43.
Habitat in India.
Magnitudo C. palmarum.
- hemipte-
rus.* 5. *C. longirostris*, obscure purpurascens, elytris abbreviatis, maculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 506. 3. *Mus. Lud.* *Vlr.* 44.
Habitat in India.
Elytra abdomine paulo breviora, nigro maculata. Thorax nigro-lineatus.
- paganus.* 6. *C. longirostris*, griseus, thoracis dorso fusco: arcubus cinereis, rostro bisulcato.
Habitat in Indiis. *D. Torstenson.*
Statura C. Pini, at duplo major. Rostrum crassum, capite duplo longius, fuscum, sulcis duobus exaratum. Antennae griseae, basi nigrae. Thorax lateribus griseis, dorso fusco, arcubus quatuor lineolaque media cinereis. Elytra obtusa, immaculata. Femora mutica.

7. *C. longirostris, cinereus, coleoptris macula communis cordata fusca.* *melano-*
cardius.

Curculio melanocardius longirostris, cinereus, coleo-
ptris fascia cordata fusca. Linn, Syst. Nat. II. 608. 18.

Mus. Lud. Vlr. 45.

Habitat in India.

Antennae nigrae.

8. *C. longirostris, subspinosis, niger, thorace lineis, elytris postice cruce albis.* *cruciatus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Caput nigrum fascia baseos cinerea. Rostrum thorace longius, cylindricum, inflexum, antennis clavatis nigris. Thorax ovatus, punctis elevatis acutis, subspinosis, niger, linea laterali albida. Elytra itidem punctis elevatis, acutis, numerosissimis subspinosa, nigra, lineola baseos, cruceque postica albis. Pedes mutici, nigri: femorum apice tibiarumque basi puncto albo.

9. *C. longirostris, niger, elytris holofericeo striatis.* *striatulus.*
Habitat in insula Terre neuve Americae. *Mus. D. Banks.*

Magnitudo C. Abietis. Rostrum longum, ferrugineum, apice nigrum. Thorax rotundatus, niger, scaber. Elytra nigra, striis elevatis holofericeis e punctis albis nigrisque alternis. Pedes ferruginei, femoribus simplicibus.

10. *C. longirostris, elytris rufescensibus, fasciis nebulosis.* *Pini.*
Linn. Syst. Nat. II. 608. 19. Fn. Sv. 589.

Habitat in Pini sylvestris cortice.

Affinis C. Abietis, at femora simplicia.

11. *C. longirostris, niger, cinereo irroratus, elytris puncto baseos distincto.* *Iaceae.*

Habitat in Centaurea Jacea. Prof. *Hermann.*

Statura C. Pini, antennae fractae, nigrae. Rostrum crassiusculum, cylindricum, nigrum. Thorax ovatus, niger, cinereo irroratus. Elytra nigra, atomis cincereis villosis adspersa et puncto distincto baseos versus scutellum.

Obs. Junior semper atomis plurimis e villo cinereo conflatis adspersus, aetate vero semper magis glaber et niger evadit.

- Colon.* 12. *C. longirostris*, griseus, elytris puncto albo.
Curculio oblongus, fuscus, thoracis lateribus albidis,
 elytris striatis puncto albo. *Geoff. Inf.* 1. 280. 6.
Curculio palustris. *Scop. Ent.* 104.
Curculio Colon longirostris, canescens, femoribus anti-
 cies subdentatis, thorace utrinque linea elytrisque
 puncto albo. *Linn. Mant.* 531.
Habitat in Germania.
Medius, totus cinereus, utrinque linea thoracis albi-
 cante et puncto elytrorum albo.
- biguttatus.* 13. *C. longirostris*, niger, elytris puncto elevato, abdo-
 mine pedibusque posticis flavis.
Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*
Parvus. Caput nigrum. Antennae clavatae. Thorax
 cylindricus, niger, immaculatus. Elytra laevia,
 nigra, puncto magno elevato globose flavescente ad
 basin. Abdomen flavum, Pedes antici elongati,
 nigri, reliqui flavi.
- Equiseti.* 14. *C. longirostris*, thorace laevi, elytris muricatis nigris,
 punctis duobus apiceque albis.
Habitat in Equiseto arvensi Angliae.
Nimis affinis videtur C. Lapathi. Rostrum atrum,
 thorax niger, vix tuberculatus, lateribus albis.
 Elytra muricata, lateribus apiceque albis, in parte an-
 teriori nigra puncta duo parva alba. Femora sim-
 plicia.
- Bacchus.* 15. *C. longirostris*, aureus, rostro plantisque nigris. *Linn.*
Syst. Nat. II. 611. 38.
Rhinomacer niger, elytris rubris, capite thoraceque
 aureis, proboscide longitudine corporis. *Geoff. Inf.*
 1. 270. 4.
Habitat in vite.
- Betulae.* 16. *C. longirostris*, corpore viridi aurato, subtus con-
 colore. *Linn. Syst. Nat.* II. 611. 39. *Fn. Sv.* 605.
Rhinomacer totus viridi coeruleus. *Geoff. Inf.* 1. 270. 2.
Schaeff. Icon. tab. 6, fig. 4.
Habitat in betula alba, in vite, folia contorquens.
Alter sexus thoracem antrorum spinosum gerit.
Color saepe coeruleus.

I. ELEVTERATA. Curculio. 131

17. *C. longirostris*, corpore viridi ignito: subtus atro coerulescente. *Linn. Syst. Nat. II. 511. 40. Fn. Sv. 606.* *Populi.*
Rhinomacer viridi auratus, subtus nigro violaceus.
Geoff. Ins. I. 270. 3.
Habitat in betula, populo.
Thorax in altero sexu antrorsum spinosus.
18. *C. longirostris*, niger, thorace elytrisque rufis. *bicolor.*
Habitat in America. Mus. D. Hunter.
Statura C. bacchi. Caput rufum rostro atro. Thorax et elytra rufa immaculata. Femora mutica.
19. *C. longirostris*, violaceus, hirtus, rostro atro. *pubescens.*
Habitat in Germania. v. Hattorf.
Magnitudo et statura praecedentium. Rostrum longitudine thoracis, fulcis duobus exaratum, atrum. Oculi flavescentes. Thorax cylindricus, lateribus gibbis, uti in C. betulae, et elytra violacea, pilis plurimis erectis, fuscis hirta.
20. *C. longirostris*, obscure aeneus, subtus obscurior. *cupreus.*
Linn. Syst. Nat. II. 608. 21. Fn. Sv. 593.
Habitat in Europae hortis.
21. *C. longirostris*, aeneus, rostro pedibusque nigris. *Tragiae.*
Habitat in Tragiae volubilis seminibus Brasiliae. Mus. Dom. Banks.
Parvus: triplo minor C. cupreo. Caput nigricans, rostro longo cylindrico. Thorax aeneus, obscurus, immaculatus. Elytra aenea. Pedes nigri, femoribus muticis.
22. *C. longirostris*, niger, elytris aeneis. *aeneus.*
Habitat in Anglia. Mus. D. Hunter.
Parvus: corpus nigrum, elytris solis aeneis, femora mutica.
23. *C. longirostris* griseus, pedibus rufis, rostro femoribusque basi nigris. *fuscirostris.*
Habitat in Germania. v. Hattorf.
Parvus: statura sequentis. Rostrum elongatum, cylindricum, nigrum. Thorax et elytra striata grisea, lineis duabus aut tribus albis ad futuram. Pedes rufi, femoribus basi nigris.

- nigrirostris.* 24. C. longirostris, viridis, rostro atro.
Habitat in Anglia. *D. Banks.*
Caput fuscum, rostro cylindrico, atro, nitido. Thorax gibbus, rotundatus, viridis, lineis duabus dorsibus fuscis. Elytra tomentosa, viridia, immaculata. Pedes fuscii, femoribus simplicibus.
- rufirostris.* 25. C. longirostris, niger, rostro dimidiato pedibusque rufis.
Habitat in Anglia. *D. Banks.*
Statura et magnitudo C. aterrimi. Caput nigrum, anterior dimidia rostri pars rufa, apice tamen puncto parvo nigro. Thorax niger. Elytra triata immaculata. Pedes rufi, femoribus simplicibus.
- pericarpinus.* 26. C. longirostris, subglobosus, nebulosus, elytrorum futura basi alba.
Curculio pericarpinus longirostris, subglobosus, coleoptris macula cordata alba. *Linn. Syst. Nat. II. 609.*
Fn. Sv. 602.
Habitat in Scrophulariis.
Statura C. campanulae. Parvus, totus supra obscure fuscus, futurae basi lineola parva alba, subtus cinereus. Femora clavata, inermia. Pedes picci.
- Alliariae.* 27. C. longirostris, violaceus totus. *Linn. Syst. Nat. II.*
506. 4. *Fn. Sv. 580.*
Habitat in eryfimo alliaria.
- cyanus.* 28. C. longirostris, ater, elytris violaceis. *Linn. Syst.*
Nat. II. 506. 5. *Fn. Sv. 581.*
Habitat in salicibus.
- globosus.* 29. C. longirostris, gibbus, supra ater, subtus cinereus.
Curculio Craccae longirostris, niger, ovatus, rostro subulato, abdомine pallido. *Linn. Syst. Nat. II. 506. 6?*
Habitat in Germania.
Parvus, fere globosus, supra glaber, ater, subtus subvillosus, pallidus.
- Malvae.* 30. C. longirostris, griseus, elytris pedibusque testaceis.
Habitat in Angliae malvis. *Muf. Dom. Banks.*
Parvus. Rostrum nigricans. Thorax et abdomen pilis cinereis grisea. Elytra testacea. Pedes testacei, femoribus inermibus.

31. *C. longirostris, nigricans, coleoptris maculis quatuor albidis.* *Linn. Syst. Nat. II. 609. 29. Fn. Sv. 600.* *4 macula-tus.*
Curculio cinereus elytrorum puncto quadruplici albo, proboscide thorace longiori. *Geoff. Inf. I. 287. 22.*
Habitat in Europa.
32. *C. longirostris, piceus, abdomine ovato.* *Linn. Syst. acridulus Nat. II. 507. 13. Fn. Sv. 584.*
Curculio pyriformis, nigro coerulescens, abdomine ovato. *Geoff. Inf. I. 291.*
Frequens in floribus tetrodynamis. Elytra striata.
33. *C. longirostris, ater, femoribus luteis.* *Rhinomacer subglobosus, niger striatus, femoribus rufis.* *Geoff. Inf. I. 272. 8.* *flavipes.*
Habitat frequens primo vere locis apricis calidioribus.
Parvus. Statura C. Alliariae, at totus ater, pedibus solis flavis. Elytra striata.
34. *C. longirostris, sanguineus.* *Linn. Syst. Nat. II. 608. frumentarius.* *15. Fn. Sv. 586.*
Aet. Holm. 1750. p. 186. I.
Leuvenh. arc. 168. aug. 6. p. 83. fig. 3.
Habitat in frumento diutius asservato. Elytra striata.
35. *C. longirostris, elytris rubris, futura nigra.* *Linn. dorsalis.*
Syst. Nat. II. 608. 17. Fn. Sv. 588.
Habitat in ranunculo ficaria.
Parvus. Tibiis flavis.
36. *C. longirostris, ovatus, fuscus, linea longitudinali alba.* *futuralis.*
Habitat in salice Germaniae.
Corpus parvum. Statura C. violacci. Rostrum longum, arcuatum, nigrum. Thorax fuscus, linea dorsali alba. Elytra striata, gibba, futura alba, subtus cinereus.
37. *C. longirostris, ater, elytris puncto lineolaque apicis albis.* *exclamationis.*
Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.
Parvus, totus ater, nitens, puncto in medio et lineola ad apicem elytrorum albis.

Rumicis. 38. *C. longirostris*, griseus, nigro nebulosus, antennis fuscis. *Linn. Syst. Nat.* II. 614. 60. *Fn. Sv.* 590.

Habitat in Rumice.

Convenit Linnaeana descriptio, at femora mutica.

granarius. 39. *C. longirostris*, piceus, thorace punctato longitudine elytrorum. *Linn. Syst. Nat.* II. 608. 16. *Fn. Sv.* 587.

Curculio rufo-testaceus, oblongus, thorace elytrorum fere longitudine. *Geoff. Inf.* I. 285. 18.

Scarabaeus parvus sordide fulvus, proboscide longa deorsum arcuata. *Raj. Inf.* 88.

Devastat granaria, pellitur Isatide, *Hyoscyamo*, *Thlaspide*.

Oryzae. 40. *C. longirostris*, piceus, thorace punctato longitudine elytrorum, elytris punctis duobus rufis.

Curculio Oryzae longirostris, oblongus, niger, elytris maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis. *Linn. Amoen. acad.* 6. 395. 19.

Habitat in Oryza.

Statura et summa affinitas *C. granarii*, at puncta duo rufa in elytris.

barbicoris. 41. *C. longirostris*, cylindricus, rostro longissimo: subtus barbato, elytris elongato clavatis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Singularis structurae insectum. *C. anchorago* triplo major. Rostrum corpore longius, cylindricum, apice parum incrassatum, fuscum, subtus pilis densis barbatum. Antennae rostro breviores, filiformes, hirtae, articulis undecim cylindricis versus apicem rostri insertae. Oculi globosi, atri. Thorax cylindricus, canaliculatus, niger, pilis griseis. Elytra abdomine longiora, ante apicem compressa, ideoque clavata, fornicata, punctato striata, nigra, maculis quatuor rufis obsoletis. Pedes nigri, pilis griseis, femoribus simplicibus.

assimilis. 42. *C. longirostris*, cylindricus, rostro apice glabro, atro, elytris ferrugineo subfasciatis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Videtur mas praecedentis duplo minor. Rostrum cylindricum, corpore brevius, ad medium pilis griseis hirtum, apice glabrum, atrum, nitidum, subtus laeve.

Anten-

Antennae filiformes, piceae, apice fuscae, articulis undecim pilosis. Thorax cylindricus, canaliculatus, ater, pilis griseis adspersis. Elytra vix abdomine longiora, acuta, punctato striata, nigra, maculis quatuor rufis. Pedes fusci simplices.

43. C. longirostris, cylindricus, thorace lineis, elytris *semipunctatis* albis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo C. paraplectici. Caput nigrum, palpebris albis. Antennae submoniliformes, exterrsum crassiores, fuscae. Thorax ater, canaliculatus, lineis quinque albis. Elytra punctata, substriata, abdomine longiora, acutiuscula, nigra, punctis numerosissimis albis sparsis. Subtus albicans punctis aliquot albis. Pedes fusci, femoribus muticis.

44. C. longirostris, cylindricus, subcinereus, elytris mucronatis. *Linn. Syst. Nat. II. 610. 34. Fn. Sv. 604. paraplecticus.*

Il. Scar. 184.

Curculio oblongus, elytris villoso cinereis, futura nigra. *Geoff. Inf. I. 279.*

Schreber. Sammlung. Tom. XI. 336. tab. 4.

Habitat larva intra caulem umbellatarum aquatium. Paraplegiam equorum causare fertur.

45. C. longirostris, niger, rostro barbato, tibiis anticis tridentatis. *Scb. Mus. IV. tab. 95. fig. 5. barbirostris.*

Habitat in Indiis. *Mus. Kramer.*

Statura elongata C. paraplectici, at paulo major. Rostrum tenue, barba laterali densa ferruginea. Thorax scaber. Elytra profunde sulcata sulcis scabris. Femora mutica, at tibiae anticae tridentatae.

46. C. longirostris, cylindricus, ater, elytris obtusis punctatis. *angustatus:*

Habitat in Anglia.

Statura C. paraplectici, at paulo major. Thorax scaber. Elytra striato punctata.

47. C. longirostris, cylindricus, ater, lateribus subcoeruleis. *lescentibus. Linn. Syst. Nat. II. 610. 36. Ascanii.*

Habitat in Europa australi.

Statura omnino C. paraplectici, at paulo minor.

- lineola.* 48. *C. longirostris, cylindricus, niger, elytris vitta testacea.*
Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.
Parvus, cylindricus, niger. Antennae clavatae, fuscae,
thoracis dorsum planum. Elytra striata vitta lata
testacea. Femora simplicia. Variat interdum elytris,
loco guttae solo puncto baseos apiceque testaceo.
- linearis.* 49. *C. longirostris, elongatus, niger, antennis pedibus-*
que piceis, rostro basi attenuato.
Habitat Strasburgi. D. Prof. Hermann.
Statura valde oblonga et tenuis. Minor C. Ascanio.
Rostrum mediocre, basi valde attenuatum, apice mul-
-to crassiore. Antennae ferrugineae. Thorax ob-
longus, niger, punctatus. Elytra striata, Pedes picei.
Varietas tota ferruginea invenitur.
- crassipes.* 50. *C. longirostris, femoribus anticis subclavatis, cor-*
pore atro.
Habitat Strasburgi. D. Prof. Hermann.
Statura oblongiuscula C. Ascanii. Antennae fractae,
nigrae, apice fuscae. Thorax elongatus, planus,
crassitie fere elytrorum, postice rotundatus. Elytra
abdomine breviora, laevia, atra.
- * * *Longirostres femoribus dentatis.*
- bidens.* 51. *C. longirostris, femoribus posticis dentatis niger,*
elytris unispinosis.
Habitat in nova Zelandia. Mus. Dom. Banks.
Corpus magnitudine C. viridis. Rostrum cylindricum,
atrum, nitidum. Antennae extrorsum crassiores,
fuscae. Thorax cylindricus, laevis, subrugosus. Ely-
tra striata striis crenatis in medio spina erecta va-
lida, acuta, armata. Pedes nigri, femoribus posti-
cis dente valido compresso.
- mucoreus.* 52. *C. longirostris, femoribus quatuor anticis dentatis,*
elytris polline flavescientibus, supra apicem gibbosis.
Linn. Syst. Nat. II. 612. 49. Mus. L. Ulr. 53.
Habitat in India.
- pufio.* 53. *C. longirostris, femoribus quatuor posterioribus den-*
tatis, elytris nigris, striatis, linea repanda grisea,
Linn. Syst. Nat. II. 612. 50. Mus. L. U. 46.
Habitat in Indiis.

54. C. longirostris, femoribus dentatis, elytris sulcatis *scaber.*
tuberculato spinosis.

Habitat Cayennae. *D. Mallet.*

Magnitudo fere C. palmarum. Rostrum mediocre,
erassum, nigrum. Thorax carinatus, niger. Elytra
sulcata striis elevatis tuberculisque subspinosis, sca-
bra. Pedes atri, femoribus acute dentatis.

An Curculio vaginalis *Linn.*? at elytra postice haud
mucronata,

55. C. longirostris, femoribus dentatis, thorace scabro, *cylindri-*
elytris postice bituberculatis. *rostris.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnus. Caput nigrum, rostro thorace longiore cy-
lindrico. Antennae clavatae. Thorax fusca, pun-
ctis elevatis numerosissimis scaber. Elytra fusco
griseoque varia, lineis elevatis quatuor subferratis,
intersticiis punctato striatis. Tubercula duo paria,
erecta ad apicem elytri. Pedes variegati, antici elongati,
femoribus omnibus acute dentatis.

56. C. longirostris, femoribus dentatis, elytris macula *stigma.*
magna ferruginea. *Linn. Syst. Nat. II. 612. 52.*

Mus. L. U. 48.

Habitat in Indiis.

Macula magna ferruginea in medio elytrorum.

57. C. longirostris, pallidus, femoribus dentatis, thorace *annulatus.*
elytrisque strigis nigris.

Curculio annulatus longirostris, femoribus dentatis,
thorace elytrisque fasciis linearibus nigris. *Linn.*
Syst. Nat. II. 613. 54. Mus. Lud. Ulr. 51.

Habitat in Indiis.

Striga unica in thorace et duae in elytris.

58. C. longirostris, femoribus dentatis, oblongus, elytro- *caligino-*
rum striis punctatis approximatis. *fus.*

Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*

Statura oblonga C. paraplectici, at paulo minor, totus
ater, obscurus, minime nitens. Thorax rotunda-
tus, punctatus, carinatus. Elytra striato punctata,
striis per paria approximatis profundis. Femora
acute dentata.

Abietis. 59. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris fuscis: fasciis duabus linearibus interruptis albidis. *Linn.*
Syst. Nat. II. 613. 57. *Fn. Sv.* 615.

Curculio subfuscus. *Linn. It. Oel.* 26.

Curculio norvegicus. *Petiv. Gazoph.* 14. tab. 8. fig. 9.
Habitat in Pini sylvestris cortice et resina.

reticula-
tus. 60. *C. longirostris*, femoribus dentatis, oblongus, piceus, elytris reticulatis, fasciis obliquis pallidis, tibiis anticae spinosae.

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Statura C. Abietis, at magis oblongus. Rostrum atrum. Elytra subtilissime reticulata, fasciis aliquot obliquis pallidis. Femora omnia dentata. Tibiae anticae apice spina valida incurva armatae.

Lapathi. 61. *C. longirostris*, femoribus bidentatis, albo nigroque varius, thorace elytrisque muricatis.

Curculio longirostris albido nigroque varius, muricatus. *Linn. Syst. Nat.* II. 608. 20. *Fn. Sv.* 591.

Habitat in salice.

Videtur curculio Lapathi *Linn.*, quamvis femora omnia bidentata. Affinis *C. equiseti* eiusdemque statura. Caput albo nigroque varium, rostro incurvo nigro. Thorax supra fuscus, tuberculis quinque elevatis muricatus, lateribusque albis. Elytra fusco alboque variegata, muricata, apice alba. Abdomen nigrum. Femora omnia bidentata, alba.

6 gutta-
tus. 62. *C. longirostris*, femoribus dentatis, niger, elytris maculis tribus albis.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Medius. Antennae clavatae, nigrae. Rostrum thorace longius, nigrum, linea longitudinali alba. Thorax niger, lateribus albis. Elytra laevia nigra, maculis tribus magnis albis. Pedes nigri, femoribus dentatis.

luridus. 63. *C. longirostris*, femoribus dentatis, ovatus, obscure niger, elytris punctato striatis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo *C. Lapathi*. Totus obscure niger, minime nitens. Antennae clavatae, apice fuscae.

fuscae. Rostrum cylindricum, thorace longius, sub pectore inflexum. Thorax scaber, linea dorsali elevata, glabra. Elytra punctis majoribus striata, quae striae per paria postice coeunt. Pedes dente brevissimo.

64. C. longirostris, femoribus dentatis, elytris striatis, postice acuminatis. *meditabundus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis. Totus obscure niger, minime nitens. Antennae clavatae. Rostrum cylindricum, thorace longius, atrum, nitidum. Thorax sublaevis, obscurus. Elytra obscura, striata, striis postice per paria coeuntibus. Apex elytrorum acuminatus. Femora omnia acute dentata.

65. C. longirostris, femoribus dentatis, niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris subspinosis. *stupidus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium: totus obscure niger, opacus. Rostrum thorace longius, incurvum. Thorax latior, quam in reliquis, lateribus rotundatis, scaber, obfcurus. Elytra connata, punctis elevatis acutis subspinosa. Femora scabra, dentata.

66. C. longirostris, femoribus dentatis, griseus, thorace linea, punctisque duobus dorsalibus albis. *Mangiferae.*

Habitat in nucleis mangiferae. *Koenig.*

Magnitudo et statura C. Lapathi. Rostrum valde inflexum, fuscum. Caput nigricans. Thorax griseus, linea dorsali et juxta lineam punctum utrinque album. Scutellum album. Elytra striata, grisea, punctis nigris sparsis. Pedes grisei.

67. C. longirostris, femoribus dentatis, ater, thorace *germanus.* utrinque punctis duobus testaceis.

Curculio germanus longirostris, femoribus subdentatis, corpore ovato, nigro, punctis testaceis adsperso.

Linn. Syst. Nat. II. 613. 58.

Habitat in Germania.

- Scrophulariae.* 68. *C. longirostris*, femoribus dentatis, coleoptris maculis duabus dorsalibus atris.
Curculio Scrophulariae longirostris, subglobosus, coleoptris maculis duabus dorsalibus atris. *Linn. Syst. Nat.* II. 614. 61. *Fn. Sv.* 603.
Curculio subglobosus niger, punctis duobus atris, suturae longitudinalis coleoptrorum, thorace exalbido. *Geoff. Hist. des Inf.* I. 296. 44.
Scarabaeus exiguis cinereus, duabus maculis nigris in alarum thecis insignitus. *List. Scarab. Angl.* 395. 35.
Reaum. Inf. 3. tab. 2. fig. 12.
Habitat in scrophularia, verbasco.
Rostrum inflexum, nigrum, antennis piceis. *Elytra cinerea*, lineis elevatis quatuor holofericeis, albo nigroque variiis. *Puncta duo atra communia*, anterius orbiculatum, posticum oblongum.
- gravis.* 69. *C. longirostris*, femoribus dentatis, niger, elytris ferrugineo variegatis, femoribus canaliculatis.
Habitat in Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*
Statura C. verbasci. Rostrum atrum, incurvum, thorace longius. Antennae piceae, clavatae. Thorax cylindricus, punctis elevatis scabris. *Elytra striata*, scabra, ferrugineo varia. Pedes nigri, postice ferruginei. Femora subtus late canaliculata, dente valido.
- s punctatus.* 70. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris sutura punctisque duobus albis.
Curculio s. punctatus longirostris, femoribus dentatis, elytris sutura alba maculisque duabus. *Linn. Syst. Nat.* II. 614. 64. *Fn. Sv.* 618.
Habitat in Europa.
Corpus supra purpureum, subtus cinereum. Thorax linea dorsali alba et elytris sutura punctisque duobus albis.
- haemorrhoidalis.* 71. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace fusco : lateribus cinerascentibus, elytrorum sutura apice ferruginea.
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Parvus

Parvus: statura C. cuprei. Caput fuscum, rostro cylindrico, thorace longiore antennisque clavatis. Thorax ovatus, fuscus, lateribus in parte cinereis, in femina ferrugineis, punctis aliquot fuscis. Elytra striata obscura, sutura apice ferruginea. Pedes fusti, femoribus dentatis.

72. C. longirostris, femoribus dentatis, coleoptris nigris, maculis tribus cinereis, postica communi lunata. *trimaculatus.*

Habitat in Alsacia. Prof. Hermann.

Caput nigrum, immaculatum. Thorax supra fuscus, antice macula utrinque marginali cinerea, lineaque dorsali brunnea. Elytra fusca, sutura baseos brunnea, puncto parvo albo, macula magna alba in medio marginis exterioris, et altera lunata ad apicem.

Pectus et abdomen cinerea. Femora fusca annulo cinereo.

73. C. longirostris, femoribus dentatis, albo nigroque varius, rostro atro. *litura.*

Habitat in Europa.

Statura praecedentis. Thorax linea dorsali nigra, antice lineola, postice puncto albis.

74. C. longirostris, femoribus dentatis, ater, elytris nitidis. *Linn. Syl. Nat. II. 607. 10. Fn. Sv. 582.* *aterrimus.*

Curculio niger thorace utrinque dentato. *Geoff. Ins.*

I. 299. 48.

Habitat in Europa.

Affinis C. Alliariae, at color aliis.

75. C. longirostris, femoribus dentatis, ater, elytris opacis oblongis. *Linn. Syl. Nat. II. 607. II. Fn. Sv. 583.* *Cerasi.*

Curculio Cerasi. *Scop. carn. 84.*

Habitat in foliis Cerasi.

Nimis affinis videtur C. aterrimo.

76. C. longirostris, femoribus dentatis, violaceus, totus. *violaceus.* *Linn. Syl. Nat. II. 614. 63. Fn. Sv. 579.*

Rhinomacer subvillosus, coeruleus. *Geoff. Ins. I. 271. 5.*

Habitat in pinis.

77. C. longirostris, femoribus dentatis, corpore griseo, longitudine rostri. *Linn. Syl. Nat. II. 673. 59.* *Nucum.*
Fn. Sv. 616.

Curcu-

Curculio rufo-marmoratus, scutello cordato albo, proboscide subulata longissima. *Geoff. Inf.* 1. 295. 42.

Curculio ovatus, griseus, rostro filiformi, longitudine corporis. *Uddm. Diff.* 24.

Raj. Inf. 3. tab. 67. fig. 5. 6.

Sultz. Inf. tab. 3. fig. 22.

Habitat in nucibus coryli avellanae.

probosci- 78. **C. longirostris**, femoribus dentatis, griseus, rostro deus. corpore duplo longiore.

Habitat in America boreali. *Dom. Banks.*

Nimis affinis videtur **C. nucum**, at magis oblongus.

Rostrum cylindricum, ferrugineum, nitens, corpore fere duplo longiore. Corpus oblongum, griseum, strigis oblongis obscurioribus.

varius. 79. **C. longirostris**, femoribus omnibus dentatis, griseo nigroque varius, rostro pedibusque rufis.

Habitat Cayennae *D. Maller.*

Statura **C. nucum**, at magis oblongus. Rostrum longum, cylindricum, rufum, antennis tenuissimis.

Thorax elytraque cinereo fuscoque variegata. Pedes omnes rufi, femoribus acute dentatis, cingulique nigro.

Ceraforum. 80. **C. longirostris**, femoribus dentatis, fuscus, scutello elytrorumque fasciis obsoletis cinereis.

Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*

Statura **C. nucum**, at triplo minor. Rostrum cylindricum, glabrum, atrum. Thorax fuscus, linea dorsali obsoleta cinerea. Scutellum cinereum. Elytra striata fasciis duabus repandis cinereis fere obsoletis.

amoenus. 81. **C. longirostris**, femoribus dentatis, ater, thorace punctis duobus, coleoptris quinque niveis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura **C. nucum**, at triplo minor. Caput atrum, rostro cylindrico, longitudine corporis. Antennae clavatae, fuscae. Thorax ater, glaber, utrinque puncto baseos niveo. Elytra striata, nigra, in medio lineola suturali et postice punctis duobus niveis. Pedes atri, femoribus omnibus dentatis.

82. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris testaceis obsolete fasciatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 614. 62. *Druparum.*
Fn. Sv. 617.
Curculio flavescens, elytris luteo et rufo tessellatis.
Geoff. Inf. I. 296. 43.
Schaeff. Icon. tab. I. fig. II.
Sultz. Inf. tab. 3. fig. 21.
Habitat in cerasi padi nucleus.
83. *C. longirostris*, femoribus dentatis, thorace depresso: *depressus*, lateribus obtuse angulatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 612. 53.
Mus. Lud. V. 49.
Scb. Mus. IV. tab. 95. fig. 4.
Habitat in America.
84. *C. longirostris*, femoribus anticis dentatis, corpore *Pomorum.* griseo, nebuloso. *Linn. Syst. Nat.* II. 612. 46.
Fn. Sv. 612.
Curculio in floribus arborum. *Frisch. Inf.* I. p. 32. tab. 8.
Habitat in Pomonea floribus.
85. *C. longirostris*, femoribus dentatis, corpore testaceo, *Tortrix.* pectore fuscō. *Linn. Syst. Nat.* II. 615. 67. *Fn. Sv.* 622.
Curculio ferrugineus, elytris striatis, oculis nigris.
Geoff. Inf. I. 300. 51.
Habitat in populo tremula, folia contorquens.
86. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elytris flavo *Anchorago.* striatis, thorace elongato. *Linn. Syst. Nat.* II. 613. 56. *go.*
Mus. Lud. Ulr. 52.
Gronov. Zooph. 583. tab. 15. fig. 4.
Habitat in Indiis.
Statura et antennae proprium genus indicant.
87. *C. longirostris*, femoribus dentatis, elongatus, niger, *dispar.* elytris maculis quatuor rufescentibus.
Curculio dispar longirostris, femoribus dentatis, elytris emarginatis, rubro striatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 613. 55. *Mus. Lud. Ulr.* 50.
Curculio minutus. *Drury. Inf.* I. tab. 42. fig. 3. 7?
Habitat in America. *D. Drury.*
Statura exacte *C. anchoraginis* et ejusdem certe generis. Caput obscure rufum, nitidum, rostro elongato cylindrico. Antennae moniliformes, rufescentes.

rufescentes, rostro duplo longiores. Thorax ovatus, ater, nitidus, macula utrinque obscure rufa obsoleta. Elytra valde striata, nigra, maculis quatuor rufescentibus obsoletis longitudinaliter dispositis. Pedes rufescentes, femoribus valde dentatis.

Varietas. Aliud vidimus insectum, huic simillimum, at loco rostri adsunt maxillae duae prominentes unidentatae. An variat sexus?

Genus proprium constituere videntur species 86 et 87 distinctissimum, figura, antennis totis moniliformibus, at partes oris mihi haud rite notae. Ad Attelabos refert *Geoffroy*, at vix jure.

- 4 pustula-* 88. C. longirostris, femoribus dentatis, niger, elytris maculis duabus ferrugineis.
tus.

Habitat in Cap. B. S. *Muf. Dom. Banks.*

Affinis C. dispari, at antennae haud moniliformes, sed clavatae, nigrae, clava apice albida. Rostrum longum, cylindricum, atrum. Thorax ater, macula utrinque marginali albida. Elytra striata, truncata, nigra, maculis duabus ferrugineis, anteriori majore. Femora dente obsoleto.

- elongatus.* 89. C. longirostris, femoribus dentatis, thorace elongato, tibiis anticis bidentatis.

Habitat in Jamaica. *Drury.*

Statura C. anchoraginis, at duplo minor, niger. Elytra punctato striata, nigra, fasciis duabus ferrugineis.

* * * *Longirostres, femoribus posticis saltatoriis.*

- Alni.* 90. C. pedibus saltatoriis, niger, coleoptris testaceis, maculis duabus obscuris.

Habitat in Anglia.

Parvus, niger. Thorax testaceus, fascia abbreviata nigra. Elytra testacea, macula baseos oblonga, et postice majore transversali communi obscuriore.

- Salicis.* 91. C. longirostris, pedibus saltatoriis, elytris atris, fasciis duabis albis. *Linn. Syst. Nat. II. 611. 43.*
Fn. Sv. 610.

Habitat in salicis floribus.

92. C. longirostris, pedibus saltatoriis, corpore testaceo. *viminalis.*

Habitat in salice Germaniae.

Corpus magnitudine C. salicis. Elytra striata. Femora postica crassissima, unidentata.

93. C. longirostris, pedibus saltatoriis, corpore atro, *Fagi.*

femoribus pallidis. *Linn. Syst. Nat. II. 611. 44.*

Fn. Sv. 609. 21. Scar. III. Scop. Ent. carn. 73.

Habitat in foliis fagi sylvatici.

Affinis C. flavidipes, at saliens.

* * * * brevirostres femoribus muticis.

94. C. brevirostris, femoribus submuticis, corpore toto *argyreus.*

viridi, argenteo aureoque maculato. *Linn. Syst.*

Nat. II. 615. 74. Mus. Lud. Uhr. 54.

Habitat in Indiis.

95. C. brevirostris, femoribus muticis, corpore viridi *regalis.*

sericeo, fasciis aureis repandis. *Linn. Syst. Nat. II.*

616. 75.

Habitat in America meridionali.

Femora fusca, annulo aureo.

96. C. brevirostris, fuscus, elytrorum sutura abdominalis- *margina-*

que marginibus aureis. *tus.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Magnus. Antennae extrorsum crassiores. Caput nigrum, immaculatum, rostro plano. Thorax rotundatus, fuscus, pectore lineis duabus aureis. Elytra nigra, punctata, sutura basi aurea. Abdomen subtus nigrum, lateribus aureis. Pedes nigri, femoribus muticis.

97. C. brevirostris, canescens, thorace punctis nigris 19 *puncta-*

quatuor, coleoptris novendecim. *tus.*

Habitat in Cayenna. *D. Mauduit.*

Statura C. regalis. Caput coerulescens, oculis antennisque clavatis, nigris. Thorax cinerascens, punctis quatuor nigris, lateralibus minoribus. Elytra cinerea, punctis novem et uno communis, 1, 2, 2, 2, 2. tertio pari majori. Punctum commune puncto minutissimo cinereo notatum. Pedes coerulescentes.

punctata. 98. *C. brevirostris*, coerulescens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris duodecim. *Linn. Syst. Nat.* II. 618. 92. *Mus. Lud. Ulr.* 58.

Habitat in Indiis.

Caput fulcatum.

decorus. 99. *C. brevirostris*, supra fuscus, thorace coleoptrisque vittis duabus viridi-aureis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura C. regalis, at minor. Rostrum breve, crassum, fuscum, apice canaliculatum. Antennae longae, fuscae, primo articulo longissimo. Thorax rotundatus, fuscus, lineis duabus viridi aureis nitidis. Elytra striata, punctata, fusca, vitta in medio viridi aurea. Corpus subtus aureum, abdominis medio fusco. Pedes fusti, femoribus clavatis, muticis.

nitidulus. 100. *C. brevirostris*, femoribus muticis, viridi-tomentosus, elytris punctatis.

Habitat in Cajenna.

Affinis *C. argentato*, pulcherrimus. Rostrum sulcatum, cinereum. Thorax et elytra punctata, holofericea, viridi nitentia.

candidus. 101. *C. brevirostris*, femoribus muticis, elytris spinosis albis, macula laterali fusca.

Habitat in Cajenna. *D. Mallet.*

Statura C. albini. Caput aureo nitens. Thorax dorso fuscus, lateribus albis. Elytra spinis paucis sparsis elevatis, alba, postice macula magna laterali fusca. Pedes fusti, tibiis rufis.

viridis. 102. *C. brevirostris*, femoribus muticis, virescens, thoracis elytrorumque lateribus flavis.

Curculio viridis brevirostris, femoribus muticis, corpore viridi, supra obscurro, subtus flavidore. *Linn. Syst. Nat.* II. 618. 76.

Sultz. Ins. tab. 3. fig. 24.

Habitat in Europa.

Statura C. pyri. Subtus flavescens, uti et margo latus elytrorum.

103. C.

103. *C. brevirostris*, corpore ferrugineo, aureo maculato. *aurifer.*
Curculio aurifer. *Drury. Inf. I.* tab. 32. fig. 1.
 Habitat in America.
 Magnitudo et statura *C. nebulosi*. Rostrum planum, ferrugineum. Thorax laevis, ferrugineus, punctis duobus apicis aureis. Elytra striato-punctata, postice acuminata, ferruginea, punctis lineolatis plurimis vagis, aureis.
104. *C. brevirostris*, canus, elytris fasciis obliquis nigris. *nebulosus.*
Linn. Syst. Nat. II. 617. 84. *Fn. Sv.* 635.
Curculio albo nigroque varius, proboscide planiuscula, carinata, thoracis longitudine. *Geoff. Inf. I.* 278. 1. tab. 4. fig. 8.
Curculio brevirostris. *Frisch. Germ. II.* 32. tab. 23. fig. 5.
 Habitat in Europae campis.
 Rostrum valde carinatum.
105. *C. brevirostris*, cinereus, elytris lineis tribus elevatis, crenulatis, atris. *crenulatus.*
 Habitat in nova Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
Medius. Antennae griseae, articulo ultimo crassiore fusco. Caput cinereum, dorso fusco. Thorax cylindricus, cinereus, dorso fusco. Elytra cinerea, lineis tribus elevatis, glabris, atris, utrinque punctis impressis, crenulatis. Pedes fusci, femoribus muticis.
106. *C. brevirostris*, fuscus, oblongus, thoracis dorso *incanus.*
 plano.
Curculio incanus brevirostris, cinereus, oblongus, elytris obtusiusculis. *Linn. Syst. Nat. II.* 616. 81. *Fn. Sv.* 631.
Curculio cinereus, squamosus, alis carens, elytris striatis. *Geoff. Inf. I.* 282. 10.
Scarabaeus fuscus lanagine incanus. *Lister. Scarab. Angl.* 394. 30.
 Habitat in Europae pinetis.
107. *C. brevirostris*, fuscus, thorace margine punctisque duobus ferrugineis, pedibus anticis elongatis. *longimanus.*
 Habitat in Brasilia. *Muf. Dom. Banks.*
Statura C. incani. Rostrum breve, crassum, fuscum, dorso plano. Thorax globosus, lateribus margine-

que antico ferrugineis. Dorsum fuscum, punctis duobus ferrugineis. Elytra striata, fusca, viridi tincta. Abdomen subtus virescens. Pedes antici nigri, longiores femoribus incrassatis, muticis, tibiae serratae; quatuor postici ferruginei, tibiis fuscis, femora mutica.

Variat thorace elytrisque ferrugineis linea nigra. In thorace linea nigra dorsalis, in elytris ad marginem crassiorem. Pedes nigri.

griseus. 108. C. brevirostris, supra griseo fuscus, subtus cinereus, rostro canaliculato.

Habitat in Anglia. *D. Lee.*

Statura C. lineati, at paulo longior. Rostrum cylindricum, sulco longitudinali profundiore exaratum.

Supra totus obscure griseus, subtus cinereus, immaculatus. Femora simplicia.

3 guttatus. 109. C. brevirostris, nigricans, elytris griseis: maculis duabus albis; posteriori majori communi.

Habitat in Anglia: captus VI. Maj. in fabuletis Richmondenibus.

Statura et magnitudo C. tristis. Rostrum breve, canaliculatum, et thorax fuscus immaculatus. Elytra substriata, grisea, puncto parvo albo in medio et macula majori communi versus apicem.

Coryli. 110. C. brevirostris, cinereo-fuscoque varius, elytrorum futura dimidiata, atra.

Habitat in corylo Angliae: capt. d. XX. Maj.

Affinis C. cervino. Rostrum brevissimum, apice atrum. Thorax elytraque glabra, cinereo fuscoque varia; dimidia futurae pars basi proxima atra, glabra.

lineatus. 111. C. brevirostris, fuscus, thoraee striis tribus pallidioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 616. 80. *Fn. Sv.* 630.

Curculio rostro thoracis longitudine, thorace striis tribus pallidioribus. *Geoff. Inf.* I. 283.

Habitat in Europa.

lunatus. 112. C. brevirostris, coleoptris elevato striatis: fascia semicirculari maculaque postica albis; lunula nigra.

Habitat in Anglia: captus die VI. Maj. in arenosis Richmondenibus.

Parvus

Parvus. Statura C. lineati. Rostrum breve, crassum, cinereum, puncto frontis impresso. Elytra lineis tribus v. quatuor elevatis, acutis, quae tamen apicem elytri haud attingunt, cinerea, fascia alba ab angulo humerali ad medium suturae ducta, quae in coleoptris semilunarem constituit. Postice macula magna communi alba, in cuius medio lunula communis nigra. Pedes cinerei, fusco fasciati.

113. C. brevirostris, corpore cinereo hispido. *scabriculus.*

Curculio scabriculus brevirostris, femoribus muticis, *lus.*
cinereus, elytris hispidis. *Linn. Mantif. 531.*

Habitat in Sueciae arenosis.

Magnitudo C. cervini: totus cinereus. Caput et rostrum canaliculatum. Thorax punctis elevatis, scaber. Elytra striata, hispida.

114. C. brevirostris, griseis antennis basi rufescensibus. *cervinus.*

Linn. Syst. Nat. II. 615. 70. Fn. Sv. 627.

Habitat in Europa.

In rostris femora inermia.

115. C. brevirostris, ater, antennis rubris, thorace utrinque bituberculato. *ruficornis.*

*Linn. Syst. Nat. II. 616. 78.
Fn. Sv. 636.*

Habitat in Europa.

Thoracis tubercula utrinque duo. Elytra striata.

116. C. brevirostris, niger, antennis pedibusque rufis. *cloropus.*

Linn. Syst. Nat. II. 617. 82. Fn. Sv. 635.

Habitat in Europa.

Parvus et valde oblongus.

117. C. brevirostris, niger, elytris striatis cinereis. *tristis.*

Habitat in Suecia, Anglia.

Medius. Caput, thorax, abdomen et pedes obscure nigra. Elytra profunde striata, cinerea.

118. C. brevirostris, ater, elytris postice albo maculatis. *adspersus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Duplo minor C. tristi: ovatus. Antennae longitudine fere corporis, articulo ultimo crassiore. Rostrum breve, obtusum. Thorax subglobosus, ater, macula

cula utrinque obsoleta alba ad basin. Elytra erectato striata, atra, postice inprimis albo maculata. Pedes elongati.

punctatus. 119. C. brevirostris, fuscus, elytris punctis holofericeis elevatis: margineque flavo.

Habitat in Suecia.

Major, ovatus. Rostrum brevissimum. Thorax gibbus, glaber. Elytra striato punctata, et praeterea punctis elevatis, holofericeis, atris adspersa.

obscurus. 120. C. brevirostris, ovatus, ferrugineo fuscus.

Habitat in Suecia.

Totus obscure ferrugineus. Elytra lineis obsoletis elevatis.

niger. 121. C. brevirostris, ovatus, niger, seaber, pedibus rufis.

Habitat in Germania. v. *Hattorf.*

Corpus magnitudine et statura C. tristis, totum obscure nigrum, punctis parvis elevatis, seabrum. Antennae nigrae. Pedes rufi, genubus plantisque nigris.

variolosus. 122. C. brevirostris, niger, thorace carinato varioloso, elytris striatis.

Habitat in Saxonia.

Statura C. punctati: totus niger. Thorax punctis majoribus passim confluentibus excavatus. Elytra conata, postice acuminata.

valgus. 123. C. brevirostris, ater, nitens, elytris punctato striatis, femoribus annulo cinereo.

Habitat in America. *Muj. Tottianum.*

Medius. Statura C. pyri: totus ater, nitens. Femora mutica, apice annulo obsoleto cinereo.

vittatus. 124. C. brevirostris, ater, elytris striis albis rubrisque abbreviatis.

Curculio vittatus longirostris, elytris lineis albis luteisque. *Linn. Syst. Nat.* II. 610. 33.

Scarabaecus Curculio proboscide longa, dorsum arcuatum, elytris fasciis albis et luteis variegatis. *Sloan. Iam.* 2. pag. 210.

Habitat in America.

Rostrum

Rostrum crassum, supra planum, atrum: ideoque ad brevirostres numerandus. Thorax supra planus, laevis. Elytra striata, punctata, atra, stria alba ad suturam et rufa latiori impressa fere in medio, quae ambae abbreviatae a basi ultra medium haud extenduntur. Stria multo brevior, rubra, nigro subpunctata ad marginem exteriorem. Apex elytrorum parum cinerascit. Subtus ater, pectore albo maculato.

125. C. brevirostris, elytris flavis, lineis atris, glaberri- *Spengleri.*
mis, abbreviatis.

Curculio *Spengleri* longirostris, fuscus, elytris flavis,
lineis atris, glaberrinis, abbreviatis, inaequalibus,
pedibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 609. 32.

Habitat in America.

Rostrum crassum, thorace brevius, ideoque brevi-
rostris.

126. C. brevirostris, elytris acuminatis griseis: margine *Robrii.*
baseos flavescente.

Habitat in America. *D. v. Robr.*

Magnitudo et statura omnino C. *Spengleri*. Rostrum
nigrum, bisulcatum. Thorax fuscus, atomis albis,
marginaque flavescente. Elytra apice acuminata,
grisea. Pedes nigri.

127. C. brevirostris, niger, fronte anoque albis, tho-
race tuberculato. *Linn. Syst. Nat.* II. 616. 79.
Fn. Sv. 632.

Curculio niger, aculeis thoracis tribus, elytrorum sex.

Uddm. Diff. 27.

Curculio *albinus*. *Scop. Ent. carn.* 66.

Habitat in Europa.

128. C. brevirostris, rostro latissimo, explanato, elytris *latirostris*.
apice albis, punctis duobus nigris.

Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.*

Statura C. *albini*, at major. Corpus nigrum. Rostrum
latissimum, planum, album, apice nigrum. Tho-
rax niger, canaliculatus. Elytra nigra, striis inter-
ruptis glaucis, apice alba, punctis duobus nigris.
Pedes nigri, albo annulati. Abdomen subtus album,
lateribus nigris.

An varietas major C. *albini*?

- verruco-* 129. *C. brevirostris, aeneo - niger, elevato punctatus, elytris postice verrucosis.* *Linn. Syst. Nat. II. 618. 90.*
fus. *Mus. Lud. Ulr. 60.*
- Curculio verrucosus.* *Drury. Ins. I. tab. 32. fig. 5.*
Habitat in Aethiopia.
- Totus aeneus, minime splendens. Elytra striis tribus elevatis, punctis elevationibus adspersis. Inter singulas strias elevatas striae duae punctorum impressorum. Postice in singulo elytro verruca elevata, obtusa.*
- capensis.* 130. *C. brevirostris, ater, thorace elevato - punctato, elytris striis crenatis.* *Linn. Syst. Nat. II. 618. 82.*
Mus. Lud. Ulr. 59.
- Habitat ad Cap. B. S.*
- Vitulus.* 131. *C. brevirostris, niger, fronte bidentato, elytris unispinosis.*
Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*
- Statura C. verrucosi. Caput nigrum, rostro brevissimo, crassissimo, dorso canaliculato. Inter oculos dentes duo elevati, acuti. Thorax cylindricus, ater, rugosus, antice punctis duobus subelevatis. Elytra atra, carinata, rugosa, postice spina elevata, acuta. Pedes nigri, femoribus simplicibus.*
- acumina-* 132. *C. brevirostris, cylindricus, fuscus, elytris apice acuminatis.*
tus. *Habitat in nova Zelandia.* *Mus. Dom. Banks.*
- Statura longa et angusta. Antennae clavatae, fuscae, Caput et thorax elytris angustiora, longiora, cylindrica, glabra, fusca. Elytra striata, fusca, terminantur postice in spinam porrectam, acutam. Pedes ferruginei, femoribus muticis.*
- emeritus.* 133. *C. brevirostris, niger, thorace elytrisque spinosis, fronte excavata.* *Linn. Syst. Nat. II. 617. 87.* *Mus. Lud. Ulr. 35.*
- Habitat in Indiis.*
- Magnitudo C. barbari.*
- barbarus.* 134. *C. brevirostris, thorace subspinoso, elytris angulo dupli crispato.* *Linn. Syst. Nat. II. 617. 88.*
- Habitat in Africa, in Gallia: duplo minor.*

135. C. brevirostris, thorace spinoso, quinque sulcato, *globoſus*, elytris laevibus.

Curculio globosus. Drury. Inf. I. tab. 32. fig. 4.

Habitat in Indiis. *D. Drury.*

Statura C. barbari, at triplo minor: totus ater.

Rostrum breve, crassum, bisulcatum. Thorax utrinque spinosus, sulcisque quinque exaratus, quorum laterales in ipsa spinarum basi reliquis breviores. Elytra connata, glabra, atra. Pedes nigri, tibiis femoribusque apice annulo pallido.

136. C. brevirostris, thorace tuberculis duobus compressis, elytris tuberculatis, postice cinereis. *culturatus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Caput cinereum; rostro brevi crassiori atro.

Antennae clavatae, fuscae. Thorax scaber, niger, margine antico cinerascente. Antice tubercula duo approximata, elevata, compressa. Elytra crenato-striata, tuberculis sex v. septem elevatis, sparsis, nigra, postice cinerea, tuberculo nigro. Pedes grisei, simplices.

137. C. brevirostris, cinereus, thorace elytrisque subspinosis, capite cornuto. *Linn. Syst. Nat. II. 618. 91. Mus. Lud. Vlr. 57.* *cornutus.*

Habitat in Indiis.

Magnitudo praecedentis. Thorax spinosus. Elytra punctis elevatis striata, adjecto fasciculo pilorum.

138. C. brevirostris, cinereus, thorace scabro, antice impresso, elytris spinosis. *Tribulus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Medius. Caput fuso cinereum. Rostrum longitudine fere thoracis, apice incrassatum. Antennae articulo primo longissimo, reliquis brevibus pilosis, ultimo clavato. Thorax obscure cinereus, scaber, antice puncto majusculo impresso. Elytra connata, spinis plurimis erectis, acutis, posticis duabus ad suturam majoribus. Femora simplicia.

139. C. brevirostris, cinereus, thorace scabro, elytris spinosis: spinis quatuor posticis longioribus. *4 dens.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo C. Tribuli. Antennae cinereae, articulo ultimo crassiori, fuscō. Rostrum breve, crassum, cinereum, dorso canaliculato. Thorax punctis elevatis obtusissimis, scaber. Elytra spinosa, spinis quatuor posticis longioribus. Pedes cinerei, femoribus simplicibus.

Clavus. 140. C. brevirostris, albicans, thorace canaliculato, coleoptris spinosis, lineolis tribus baseos rubris.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura C. Tribuli. Caput cinereum, rostro brevi, crasso, dorso leviter carinato. Thorax cylindricus, scaber, dorso canaliculato rufescente. Elytra albida, spinis plurimis nigris, duabus lateralibus baseos, et duabus dorsalibus apicis longioribus. Lineola brevis lateralis rubra, et adhuc minor communis in sutura. Pedes albi, femoribus simplicibus.

nodulosus. 141. C. brevirostris, thorace lineis sex nodulosis, elytris spinosis.

Habitat in Capite Bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*

Statura C. Tribuli. Rostrum thorace vix brevius, crassum, dorso canaliculato, canali apice dilatato. Thorax griseus, lineis sex e nodulis elevatis, atris, nitidis consistentibus. Elytra grisea, spinis plurimis atris. Pedes cinerei, femoribus inermibus.

apterus. 142. C. brevirostris, thorace spinoso, cruce impresso, elytris ferrugineo punctatis.

Curculio apterus brevirostris, pedibus muticis, corpore atro, thorace spinoso, elytris coadunatis, ab domine punctato. *Linn. Syst. Nat. II. 619. 95.*

Habitat in India.

Rostrum crassissimum, planum, marginibus elevatis. Elytra nigra, lineis duabus punctorum ferrugineorum.

ocellatus. 143. C. brevirostris, thorace spinoso, antice excavato, elytris cinereis, punctis atris subspinosis.

Habitat in Madagascar. *Mus. Brit.*

Corpus magnum C. Barbari. Rostrum breve, crassum, obtusum, unisulcatum. Thorax utrinque acute spinosus, antice fouea lata excavatus, scaber, fuscus, lineis tribus longitudinalibus griseis. Elytra con-

nata

nata, grisea, punctis elevatis, glabris, nitidis striata.
Puncta vero duarum striarum reliquis elevationia,
subspinosa. Femora fusa, annulo albo cincta.

* * * * * *Brevirostris femoribus dentatis.*

144. *C. brevirostris, femoribus dentatis, corpore viridi spectabilis,*
nigroque variegato.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnus. Rostrum breve, obtusum, nigro viridi-
que varium. Antennae clavatae, clava ferruginea.
Thorax elytraque reticulata, nigro viridique varia.
Femora dentata.

145. *C. brevirostris, femoribus dentatis, corpore obscuro. Ligustici.*

Curculio brevirostris, femoribus subdentatis, abdo-
mine subovato, murino. Linn. Syst. Nat. II. 615. 68.

Fn. Sv. 621.

Habitat in Ligustico leuisticico.

Major. Thorax cinereus, scaber.

146. *C. brevirostris, femoribus dentatis, ater, elytris sulcatus,*
striatis, ferrugineo - maculatis.

Habitat in Saxonia.

Major. Totus ater. Elytra testaceo - maculata, cre-
nato - striata.

147. *C. brevirostris, femoribus dentatis, aeneo fuscus. Pyri.*

Linn. Syst. Nat. II. 615. 72. Fn. Sv. 623.

Curculio squamoso - viridis, rostro thorace breviore,
pedibus rufis. *Geoff. Inf. I. 282.*

Curculio viridis, opacus, pedibus antennisque magis
fuscis. *Linn. It. Scan. 355.*

Habitat in pyri foliis, in corollis declaratus.

148. *C. brevirostris, femoribus dentatis, corpore viridi-*
argenteo. *Linn. Syst. Nat. II. 615. 73.*

argentata-
tus.

Curculio squamosus, viridi auratus. Geoff. Inf. I. 293. 38.

Habitat in Europae urtica, betula.

149. *C. brevirostris, femoribus dentatis, viridis, ore*
antennisque nigris, oculis atris.

virida-
tius.

Habitat Tranquebariae. *Koenig.*

Statura

Statura et summa affinitas C. argentati. Corpus totum in junioribus laete viride, in adultioribus magis obscurum. Os s. apex rostri et antennae nigra. Oculi magni, atri.

oblongus. 150. C. brevirostris, femoribus dentatis, antennis elytris pedibusque ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 615. 21. *Fn. Sv.* 625.

Curelio oblongus niger, elytris pedibusque testaceis. *Geoff. Inf.* I. 294. 39.
Habitat in Europa.

ovatus. 151. C. brevirostris, femoribus dentatis, corpore nigro, pedibus antennisque rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 615. 69. *Fn. Sv.* 626.

Habitat in Europa.

attelaboides. 152. C. brevirostris, femoribus dentatis, rostro elytrisque unituberculatis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino Attelabi. Antennae clavatae, articulo primo longissimo ferrugineo. Rostrum breve, griseum, tuberculo magno elevato carinato. Frons canaliculatus, spina brevissima utrinque armatus. Thorax scaber, griseo fuscoque varius, antice attenuatus. Elytra scabra, fusco griseoque variegata, in medio ad suturam tuberculo magno elevato, carinato. Pedes variegati, femoribus clavatis, dentatis.

39. ATTELABVS. *Palpi* filiformes.

Maxilla bifida.

Labium corneum, palpos tegens.

Antennae moniliformes, insidentes rostro.

Coryli. I. A. niger, elytris rufis, reticulatis.

Attelabus Coryli niger, elytris rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 619. I. *Fn. Sv.* 638.

Curelio niger, elytris rubris, capite postice elongato. *Linn. It. oel.* 153.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. I.

β Atte-

1. Attelabus avellanae niger, elytris thorace pedibusque rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 619. 2.

Rhinomacer thorace elytrisque rubris, capite parce elongato. *Geoff. Inf.* I. 273. II.

Cureulio collaris. *Scopoli carn.* 71.

Habitat in coryli foliis, quae in cylindrum convergunt, et utrinque claudit.

2. A. niger, elytris striatis thoraceque rubris.

curculio-

Attelabus curculionoides niger, thorace elytrisque rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 619. 3.

Rhinomacer niger, thorace elytrisque rubris, pro-

boscide longitudine capitis. *Geoff. Inf.* I. 273. 10.

Curculio nitens. *Scopoli Ent.* 72.

Habitat in Europae corylo, salice.

3. A. ater, pedibus saltatoriis.

Betulae.

Attelabus Betulae pedibus saltatoriis, corpore toto atro. *Linn. Syst. Nat.* II. 620. 7. *Fn. Sv.* 640.

Habitat in betulae foliis, quae rodendo pulcre crispa reddit. *Linné.*

40. CLERVS. *Palpi* quatuor,

Anteriores filiformes,

Posteriores longiores, se-
curiformes.

Antennae moniliformes.

1. C. niger, elytris fascia triplici alba.

mutilla-

Habitat Halae Saxonum. *Dom. Schaller.*

rius.

Statura et summa affinitas C. formicarii, at paulo ma-

jor. Corpus nigrum, fronte hirsutie densa alba tecta.

Thorax niger, vix pubescens. Elytra nigra, basi

parum rufescentia, fasciisque tribus albis, quarum

prima interrupta, tertia in ipso apice elytrorum.

Subtus niger, abdomine rufo.

2. C. elytris fascia dupli alba basique rubris.

formica-

Attelabus formicarius niger, elytris fascia dupli alba, basique rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 620. 8.

rius.

Fn. Sv. 641.

Cantha-

Cantharis XXIX. *Raj. Inf.* 103. 29.

Sultz. Inf. tab. 4. fig. 8.

Habitat in Europa, America boreali.

sipylus. 3. *C. viridis*, clytris fascia duplice flava interrupta, thorace hirsuto. *Linn. Syst. Nat.* II. 620. 9. *Mus. Lud.* *Utr.* 63.

Habitat in Africa.

Magnitudo et statura praecedentis.

apiarius. 4. *C. elytris rubris*: fasciis tribus coerulescentibus. Clerus nigro violaceus, hirsutus, elytris fascia triplici coccinea. *Geoff. Inf.* I. 304. I. tab. 5. fig. 4. Attelabus apiarius coerulescens, elytris rubris, fasciis tribus nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 620. 10. *Sultz. Inf.* tab. 4. fig. 6. *Schaeff. elem.* tab. 46. Habitat frequens in Europae, Americae floribus.

41. NOTOXVS. *Palpi* quatuor securiformes.

Maxilla unidentata.

Antennae moniliformes.

mollis. 1. *N. pubescens*, elytris nigris: fasciis tribus pallidis. Attelabus mollis griseus, pubescens, elytris fasciis tribus pallidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 621. II. *Fn. Sv.* 642. Clerus fuscus, villosus, elytris flavis, cruce fusca. *Geoff. Inf.* I. 305. 3. Curculio oblongus ruber, elytris nigris, fascia triplici albicante. *Uddm. Diff.* 28. tab. I. fig. 9. Habitat in Europa.

monoceros. 2. *N. thorace in cornu supra caput protenso.* Meloe monoceros, alatus, thorace in cornu supra caput protenso. *Linn. Syst. Nat.* II. 681. 14. Attelabus monoceros. *Linn. Fn. Sv.* 638. Notoxus. *Geoff. Inf.* I. 356. tab. 6. fig. 8. Habitat in Europa.

42. SPONDYLIS. *Palpi subfiliformes.*

*Maxilla conica, crassa,
integra.*

Labium corneum, bifidum.

Antennae moniliformes.

1. *S. atra, thorace subgloboso.*

Attelabus buprestoides ater, elytris nervosis, thorace subgloboso. Linn. Syst. Nat. II. 621. 3. *buprestoi-*
des.

Scarabaeus arboreus, collo crasso. Frisch. Inf. 13. p. 23. tab. 19.

Habitat in Europae sylvis.

2. *S. atra, elytris rugosis, thorace latioribus.*

Attelabus ceramboides ater, elytris rugosis. Linn. ceramboi-
des. Syst. Nat. II. 621. 12. Fn. Sv. 643.

Curculio maximus, ater, oblongus, elytris irregulariter reticulatis. Uddm. Diff. 26. tab. I. fig. 1.

Habitat in boleto fomentario.

43. PRIONVS. *Palpi quatuor filiformes.*

Maxilla cylindrica, integra.

Labium brevissimum, membranaceum.

Antennae setacae.

1. *P. thorace spinis mobilibus, elytris basi unidentatis, apiceque bidentatis, antennis longis.* longima-
nus.

Cerambyx longimanus. Linn. Syst. Nat. II. 621. 1. Mus. Lud. Ulr. 64.

Merian. fur. tab. 28.

Scarabaeus capricornus maximus, nigricans, fasciis elytrorum coccineis et flavis. Sloan. Iam. 2. p. 209.

Nocoonaca. Grew. Mus. 161. tab. 13.

Roeß. Inf. 2. Scarab. 2. p. 11. tab. 1. fig. 2.

Aub. miscell. tab. 64. fig. 1.

Habitat in America.

In altero sexu tibiae anticae longissimae. Corpus supra rubro nigroque variegatum.

fuligino. 2. P. thorace marginato, crenato, unidentato, ater, elytris apice crenato dentatis.

Habitat in America. *Muf. Brit.*

Statura et summa affinitas P. lineati, uti suadent antennae, pedes et gibber sterni. Differt tamen dente thoracino magis versus posteriora inserto, et corpore atro immaculato.

lineatus. 3. P. thorace marginato, crenato, unidentato, niger, albo vittatus, elytris apice crenato-dentatis.

Cerambyx lineatus, thorace marginato, ferrato, dentato, elytris nigris, linea alba, antennis compressis brevioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 624. 14.

Sloan. Iam. 2. p. 209. tab. 237. fig. 34.

Brown. Iam. 430. tab. 43. fig. 7.

Habitat in America. *Muf. Brit.*

Antennae breves, compressae, ferrugineae. Caput nigrum, canaliculatum, canali villo albo repleto. Maxillae breves, inermes. Thorax niger, lineis tribus villoso, albis. Elytra nigra, vitta media lata et parva marginali albis. Sternum antice gibbere elevato, obtuso, postice bifidum. Pedes ferruginei.

mucronatus. 4. P. thorace marginato, bidentato, elytris rufis, mucronatis.

Habitat in America. *Drury.*

Corpus P. cervicorni paulo minus. Frons retusa, antennis brevibus, compressis. Thorax dorso bituberculato. Elytra rufescentia, holosericea, acuminata.

luzonum. 5. P. thorace marginato, multispinoso, maxillis porrectis, unidentatis, apice bifidis, pedibus anticis elongatis.

Petiv. Gazoph. tab. 47. fig. 1.

Habitat in insulis Luzonum. *Muf. Brit.*

Magnitudo P. cervicornis. Antennae nigrae, longitudo corporis, articulo 2. 3. 4. 5. subtus aculeatis. Maxillae prominentes, basi unidentatae, apiceque bifidae. Thorax niger, glaber, margine spinis duodecim ciliato. Elytra mucronata, pallide ferruginea,

ginea, basi subpunctata nervoque uno, alterove elevato. Pedes antici reliquis longiores, scabri, subtus aculeati. Reliqui subtus aculeati, supra glabri, nitidi.

6. P. thorace marginato, utrinque tridentato, maxillis porrectis, extus unispinosis, antennis brevibus. *cervicornis.*

Cerambyx cervicornis, thorace marginato, dentato, maxillis porrectis, corniformibus, utrinque spinosis, antennis brevibus. *Linn. Syst. Nat. II. 622. 3. Mus. Lud. Ulr. 65.*

Sloan. Iam. 2. tab. 237. fig. 6.

Merian. Sur. tab. 48.

Roeßl. Inf. 2. Scar. 2. p. 12. tab. 1. fig. 8.

Brown. Iam. 249. tab. 44. fig. 8.

Aubent. miscell. tab. 90. fig. 3.

Habitat in Americae ligno bombacis. Larva exempta edulis in deliciis.

Maxillae magnae, interne dentatae, externe versus apicem spina unica, valida, acuta, armatae.

7. P. thorace marginato, tridentato, corpore piceo, *coriarius.* elytris mucronatis, antennis brevibus.

Prionus. *Geoff. Inf. I. 198. tab. 3. fig. 9.*

Cerambyx coriarius. *Linn. Syst. Nat. II. 622. 7. Fn. Sv. 647.*

Cerambyx maxima cornubus magnis articulatis. *Raj. Inf. 95. I.*

Cerambyx cinereo nigricans, antennis et pedibus rufis. *Gad. sat. 79.*

Cerambyx niger antennis ferratis. *Frisch. Inf. 13. tab. 9.* *Schulz. inf. tab. 4. fig. 26.*

Roeßl. Inf. 2. Scar. 2. tab. 1. fig. 12.

Schaeff. Elem. tab. 103.

Habitat in Europae betulis putridis.

8. P. thorace utrinque tridentato, corpore nigro, elytris *giganteus.* ferrugineis, antennis brevibus.

Cerambyx giganteus. *Linn. Mant. I. 531.*

Aub. Miscell. I. tab. 64. fig. 2.

Habitat in Cajenna.

Maxillae bidentatae.

- armillatus.* 9. P. thorace marginato, utrinque quadridentato, elytris ferrugineis, nigro marginatis.
Cerambyx armillatus, thorace marginato, utrinque quadridentato, elytris ferrugineis, nigro marginatis, femoribus posticis unidentatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 622. 4.
Gronov. Zooph. 525. tab. 15. fig. 6.
Habitat in India.
Maximus, frons retusa. Maxillae emarginatae. Thorax lateribus rufescens. Elytra apice acuminata.
- damicornis.* 10. P. thorace marginato, denticulato, maxillis porrectis, bidentatis, antennis brevibus.
Cerambyx damicornis, thorace marginato, crenulato, angulato, maxillis porrectis, corniformibus, introrsum bidentatis, antennis mediocribus. *Linn. Mant.* 532.
Drury. Inf. I. tab. 37. fig. L
Habitat in America.
Duplo minor P. cervicorni. Maxillae porrectae, longitidine capitis, arcuatae, acutae, intus dentibus duobus validis armatae. Caput canaliculatum, punctatum, nigrum. Thorax planus, denticulis posticis paulo majoribus. Elytra mucronata.
- bifascia*. 11. P. thorace marginato, denticulato, corpore nigro, elytris rubris, fasciis duabus atris, antennis brevibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 624. 16.
Gronov. Zooph. 532. tab. 14. fig. 4.
Habitat in America.
Fascia elytrorum altera in medio, altera postica terminalis.
- Thomae.* 12. P. thorace marginato, crenulato, corpore nigro, elytris glabris, ferrugineis: margine luteo.
Cerambyx Thomae thorace marginato, denticulato, corpore nigro, elytris ferrugineis, margine luteo. *Linn. Syst. Nat.* II. 623. 9.
Habitat in insula St. Thomas Americae.
Elytra apice rotundata.

13. P. thorace marginato, crenato, albo, bilineato, elytris *bilineatus*.
ferrugineis, atomis albis, margineque luteo.

Habitat in America. *D. v. Rohr.*

Nimis affinis P. Thomae, a quo tamen differt thoracis
dorso lineis duabus albis, elytris atomis albis irro-
ratis, apice subspinosis.

14. P. thorace marginato, crenato, capite sub maxillis *spinibar-*
bis, spinoso, scabro, maxillis tridentatis.

Cerambyx spinibarbis thorace marginato, subcrenulato,
capite sub maxillis spinoso, scabro, antennis brevi-
bus. *Linn. Syst. Nat. II. 624. 4. Mus. Lud.*
Ulr. 67.

Merian. Surinam. 24. tab. 24.

Habitat in America.

Maxillae magnae, crassae, intus tridentatae, apiceque
emarginatae.

15. P. thorace marginato, crenato, maxillis porrectis: *maxillo-*
intus hirsutis, quadridentatis. *fus.*

Cerambyx maxillosus. *Drury. Inf. I. tab. 38. fig. 3.*

Habitat in America. *Mus. Brit.*

Minor P. melanopo, totus ater, nitens. Maxillae
porrectae, acutae, intus hirsutae, apice tridentatae,
basique unidentatae. Elytra apice mucronata.

Affinis videtur P. spinibarbi.

16. P. thorace marginato, denticulato, maxillis porrectis, *cinnamo-*
tridentatis. *meus.*

Cerambyx cinnamomeus, thorace marginato, denticu-
lato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis. *Linn.*
Syst. Nat. II. 623. 10. Mus. Lud. Ulr. 66.

Merian. Surinam. tab. 24.

Drury. Inf. I. tab. 40. fig. 2.

Statura P. cervicornis: at duplo minor.

44. CERAMBYX. *Palpi filiformes.*
Maxilla obtusa, unidentata.
Labium bifidum.
Antennae setaceae.

aedilis. 1. *C. thorace spinoso, punctis quatuor luteis, elytris obtusis, nebulosis, antennis longissimis.* *Linn. Syst. Nat. II. 628. 37. Fn. Sv. 653.*

Cerambyx nebulosus antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis. *Linn. It. oel. 8.*

Capricornus russicus. *Petiv. Gazoph. tab. 8. fig. 8.*

Mouf. Inf. 151. fig. 2.

Frisch. Inf. 13. tab. 12.

Sultz. Inf. tab. 4. fig. 27.

Habitat in truncis arborum Europae borealis.

Variat elytris punctato striatis nebulosis, et elytris glabris cinereis vix punctatis, umbra postica obsolete fusca. Vix tamen specie differt.

araneifor- 2. *C. thorace spinoso tuberculatoque, elytris porosis, antennis longis, articulo quinto unidentato.* *Linn. Syst. Nat. II. 625. 22.*

Sloan. Lam. II. tab. 237. fig. 24.

Dury. Inf. tab. 35. fig. 4.

Habitat in America.

Corpus statura C. aedilis. Caput inter antennas carinatum, basi circulo nigro cinctum. Antennae corpore longiores, articulo quinto denticulo parvo intus armato, cinereas in rostro, absque pilis. Thorax lateribus spinosis dorso tuberculatus, cinereus, parce nigro-punctatus. Elytra in primis basi porosa, cinerea, macula magna laterali fusca et apicibus obsolete fuscouscentibus. Pedes apice pilosi.

nodosus. 3. *C. thorace spinoso, elytris cinereis, nigro maculatis, antennis longissimis, articulo tertio apice nodofo.*

Habitat in Marylandia. *Mys. Brit.*

Statura et summa affinitas C. araneiformis. Antennae corpore quadruplo longiores, articulo tertio gibbere rotun-

rotundato, obtuso, prominente. Elytra plana, rotundata, cinerea, maculis aliquot oblongis nigris basi punctata.

4. C. thorace multidentato, dorso plano, elytris tibiisque anticus unidentatis. *canceriformis.*

Cerambyx pustulatus. Drury. Inf. 2. tab. 35. fig. 1.

Habitat in Jamaica.

Statura et magnitudo omnino C. araneiformis. Antennae longiores, articulo primo apice unidentato. Thorax cinereus, dorso valde explanato, margine dentibus quinque vel sex minoribus, in duabus seriebus collocatis, armato. Elytra cinerea, punctis elevatis fuscis irrorata, apice unidentata. Femora clavata, tibiis anticus unidentatis.

5. C. thorace quinquespinoso, glaucus, elytris muricatis, latere fasciaque nigris, antennis longis. *Linn. glaucus.*

Syst. Nat. II. 626. 28.

Habitat in America.

Elytra apice unidentata.

6. C. thorace subspinoso, elytris bidentatis, scabris, cinereo fuscis. *bidentatus.*

Habitat in America. *D. v. Rohr.*

Statura C. araneiformis, at triplo minor. Antennae corpore longiores, griseae, articulorum apicibus fuscis. Thorax inaequalis, utrinque unispinosus spina obtusa. Elytra bidentata, punctis elevatis acutis, scabra. Femora clavata. Color cinereo fusco-que nebulosus.

7. C. thorace spinoso, viridis, nitens, antennis cyaneis, mediocribus. *moschatus.*

Cerambyx moschatus thorace spinoso, elytris obtusis, viridibus, nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus. Linn. Syst. Nat. II. 627. 34. Fn. Sv. 652.

Cerambyx viridi coerulescens. Geoff. Inf. I. 203. 5.

Scarabaeus major viridis, odoratus. Raj. Inf. 81. 17.

Scarabaeus suaviter olens. Lister. Scar. Angl. 384. II.

Scarabaeus arboreus coeruleo viridis. Frisch. Inf. 13. tab. II.

Cerambyx tertius. Monff. Inf. 149. fig. ult.

Habitat in salice Europae.

Odorem spargit gratum et soporiferum, quem cum vita amittit. Ova candida, sapida. *Lister.*
Variat antennis pedibusque cyaneis et fuscis.

virens. 8. C. thorace rotundato, spinoso, corpore viridi, femoribus rufis.

Cerambyx virens, thorace spinoso, clytris obtusis, corpore viridi, antennis longioribus, femoribus unidentatis. *Linn. Syst. Nat. II. 627. 33.*

Drury. Inf. I. tab. 40. fig. I.

Habitat in America.

Corpus magnum, viride, femoribus solis rufis. Antennae nigrae.

Variat antennis corpore longioribus et brevioribus, femoribus dentatis et muticis.

afer. 9. C. thorace rotundato, spinoso, corpore viridi, antennis pedibusque rufis.

Cerambyx ater. *Linn. Mant. 532.*

Drury. Inf. I. tab. 39. fig. 4.

Habitat in Africa. *D. Solander.*

Statura C. virentis, at duplo minor. Caput viride, fronte subretusa, oculis nigris, antennisque corpore sublongioribus, rufis. Thorax rotundatus, spinosus, transverse striatus, viridis, nitens, immaculatus. Elytra subattenuata, viridia, futura nitidiores. Pedes omnes rufi, femoribus quatuor anticis clavatis.

festivus. 10. C. thorace spinoso, viridi, elytris violaceis, basi viridibus, femoribus ferrugineis, unidentatis.

Habitat ad fluvium Gaboon Africæ. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Antennæ mediocres, nigrae, primo articulo rufo. Caput viride, nitens, labio superiore subferrugineo. Thorax viridis, nitens, utrinque spinis duabus obtusis, posteriore majori. Elytra cyanea, nitida, basi viridia. Femora ferruginea, unidentata. Tibiae fuscescentes.

vittatus. 11. C. thorace spinoso, viridis, nitens, thorace elytris que nigro lineatis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura

Statura omnino praecedentis. Antennae nigrae, corpore sublongiores. Caput viride, nitens. Thorax inaequalis, spinosus, viridis, lineis duabus dorsalibus atris. Elytra obtusa, viridia, lineis longitudinalibus duabus atris. Femora rubra, inermia. Tibiae nigrae.

12. C. thorace spinoso, niger, vitta atra.

velutinus.

Habitat in America. *D. Schulze.*

Nimis affinis C. virenti. Antennae corpore paulo longiores. Corpus nigrum. Thorax rotundatus, spina valida, acuta. Elytra obtusa, nigra, vitta dorsali velutina atra s. obscuriore. Femora quatuor antica clavata, postica elongata. Tibiae posticae compressae, apice spinosae.

13. C. thorace subspinoso, niger, elytris viridibus, apice spinosis.

spinicor-nis.

Habitat in Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Antennae nigrae, longiores articulo tertio, quarto, quinto et sexto, apice spinosis. Thorax niger, tuberculis utrinque tribus lateralibus obtusis. Elytra viridia, nitida, apice spina acuta armata. Corpus nigrum. Pedes nigri, femoribus clavatis, subferrugineis.

14. C. thorace spinoso, rugoso, niger, antennis longis.

Cerdo.

Cerambyx Cerdo thorace spinoso, rugoso, nudo, corpore nigro, antennis longis, articulis quatuor primis clavatis. *Linn. Syst. Nat. II. 629. 39.*

Cerambyx ater, elytris rugosis integris, antennis corpore longioribus. *Geoff. Inf. I. 201. 2.*

Cerambyx Cerdo. *Scopoli Ent. 162.*

Frisch. Inf. 13. tab. 8.

Mouff. Inf. 149. fig. 2.

Drury. Inf. I. tab. 39. fig. 1.

β. Cerambyx Heros. *Scopoli Ent. 163. Var. maj.*

Cerambyx fusco niger, elytris rugosis, apice interiori spinosis, antennis corpore longioribus. *Geoff. Inf. I. 200.*

Habitat in Europa.

Vix specie differunt α et β.

- alpinus.* 15. C. thorace spinoso, coleoptris fascia maculisque quatuor atris, antennis longis. *Linn. Syst. Nat.* II. 628.
Fn. Sv. 654. *Iter. Scar.* 260.
Cerambyx cinereo coeruleo, elytrorum maculis sex fascis. *Geoff. Inf.* I. 202. 4.
Capricornis primus Monfeti coloris fere cinerei, cuius venter crura et cornua coerulea, articulis nigris interstincta, scapulae, cauda et elytra nigris quibusdam maculis variegata. *Scheuchz. Itin.* I. tab. I. fig. 5.
Ionß. Inf. tab. 15. fig. 3.
Sulz. Inf. tab. 4. fig. d.
Drury. Inf. 2. tab. 31. fig. 5.
Habitat in Europae montosif.
- succinctus.* 16. C. thorace bispinoso, rugoso, elytris fascia flava, antennis longioribus, compressis. *Linn. Syst. Nat.* II. 627. 32. *Muf. Lud. Ulr.* 72.
Quici. Marg. Bras. 254.
Drury. Inf. I. tab. 39. fig. 2.
Habitat in America, Brasilia.
- fasciatus.* 17. C. thorace spinoso, cyaneus, elytris fascia flava, antennis mediocribus ante apicem flavis.
Habitat Tranquebariae. Koenig.
Antennae compressae, cyaneae, articulis quatuor penultimis flavis, ultimo cyaneo. Thorax cyaneus, acute spinosus. Elytra cyanea, fascia lata flava. Pedes cyanei, postici compressi.
- barbicoris.* 18. C. thorace spinoso, antennarum quatuor primis articulis nigro-barbatis, corpore testaceo, nigro-variegato. *Linn. Syst. Nat.* II. 625. 18. *Muf. Lud. Ulr.* 68.
Habitat in Asia.
- farinosus.* 19. C. thorace spinoso, elytris punctis sparsis farinosis, antennis longis. *Linn. Syst. Nat.* II. 626. 24.
Merian. Surinam. tab. 24.
Habitat in radice Argemonae mexicanae.
Larva albicans, capite caudaque nigris.
- nebulosus.* 20. C. thorace spinoso, elytris punctis fasciisque nigris, antennis longioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 627. 29.
Fn. Sv. 650.

Ceram-

Cerambyx nebulosus. Scop. carn. 173.

Sultz. Inf. tab. 4. fig. c.

Habitat in abietum truncis.

21. C. thorace spinoso, elytris apice bidentatis, antennis hispidus, mediocribus hirtis.

Cerambyx hispidus thorace spinoso, elytris subpraemorsis, punctisque tribus hispidis, antennis hirtis longioribus. Linn. Syst. Nat. II. 627. 30. Fn. Sv. 651.

Cerambyx ovatus, fuscus, elytris antice cinereis, apice bidentatis. Geoff. Inf. I. 206. 9.

Scarabaeus antennis articulatis longis. Raj. Inf. 97. 4.

Frisch. Inf. 13. p. 22. tab. 16.

Habitat in Europa.

22. C. thorace inermi, elytris subtestaceis: margine marginatis, omni nigro.

Habitat in Cap. B. S. Mus. Dom. Banks.

Magnitudo C. Alpini. Antennae piceae, corpore vix longiores. Caput fuscum, palpis filiformibus, articulo ultimo obtuso. Thorax ovatus, inermis, fuscus, margine antico et postico nigris. Elytra subtestacea, laevia, futura marginibusque tenuissime nigris. Pedes nigricantes.

23. C. thorace inermi, viridi, elytris obscuris, antennis brevicornibus nigris.

Habitat in Sierra Leon Africae. Mus. Dom. Banks.

Statura C. afri, at duplo minor. Caput viride, nitens, antennis brevibus compressis, nigris. Thorax rotundatus, viridis, nitens, punctatus, inermis. Elytra glabra, laevia, viridia, obscura. Pedes nigri, femoribus clavatis, anticis quatuor rufis, posticis viridibus.

24. C. thorace inermi, rugoso, elytris acuminatis, nigris, lanuginoso - canescens, antennis longissimis.

Linn. Syst. Nat. II. 631. 53.

Habitat in America.

Statura omnino C. Cerdonis, at thorax haud spinosus.

Antennae corpore sesquiongiore. Thorax valde rugosus.

45. LAMIA. *Palpi quatuor filiformes.**Maxilla cornea, bifida.**Labium corneum, bifidum.**Antennae setaceae.*

Tribulus. 1. L. thorace quadrispinoso, scutello elytrisque spinosis, antennis longioribus.

Habitat ad fluvium Gaboon Africæ. *D. Solander.*
e mus. Dom. Banks.

Statura L. futoris, at paulo major. Antennæ corpore longiores, fuscae, articulorum basi cinerea. Caput fusco cinereoque variegatum, ore prominulo. Thorax rotundatus, spinis quatuor erectis lateralibus acuminatis, acutioribus. Puncta duo cinerea ad basin spinarum intermediarum. Elytra fusco cinereoque variegata, basi versus marginem exteriorem gibbere bispinoso armata, versus suturam spinae duae validæ, erectæ, acutæ. In medio elytri spina sensim elevata, valida, recumbens, acuta. Apex elytrorum acuminatus denticulo brevi acuto. Scutellum parvum, rotundatum, denticulis duobus brevibus, erectis. Pedes fusco nigroque variegati. Tibiae intermediae apice parvo notantur tubculo.

pedicornis. 2. L. thorace elytrisque spinosis, femoribus anticis cornutis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Caput griseum, antennis mediocribus villosis. Thorax rotundatus, griseus, spinis sex brevibus erectis dorsalibus. Scutellum inerme. Elytra grisea, macula marginali lunata fasciaque media cinerea, spinae plurimæ baseos breves, erectæ, atrae. Pedes grisei, femoribus anticis cornu elongato, arcuato, acuto.

erista. 3. L. thorace acute spinoso, grisea, elytris basi tuberculo compresso tridentato.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Minor. Antennæ corpore paulo longiores, cinereæ, articulorum apicibus nigris. Thorax rotundatus, utrinque spina acuta armatus, et sub spina punctum fulvum.

fulvum. Elytra antice grisea, tuberculo magno compresso tridentato, postice pallida, striga parva, obliqua nigra. Femora clavata, nigra, clava grisea. Tibiae griseae, apice nigrae.

4. L. thorace antice utrinque bispinoso, corpore nebuloso. *ambulator.*

Petiv. Gazoph. tab. 37. fig. 6.

Habitat in insulis Luzonum. *Mus. Brit.*

Statura L. textoris. Antennae, teste *Petiverio*, longitudine corporis, mihi haud visae. Thorax rotundatus, castaneo cinereoque nebulosus, antice spinis duabus brevibus, una supra alteram armatus. Elytra cinereo castaneoque nebulosa.

5. L. thorace spinoso, elytris convexis, atris, antennis *textori* mediocribus.

Cerambyx textor thorace spinoso, elytris obtusis, convexis, atris, punctatis, antennis mediocribus.

Linn. Syst. Nat. II. 629. 41. Fn. Sv. 656.

Cerambyx ater, elytris punctis elevatis, antennis corpore brevioribus. *Geoff. Inf. I. 201. 3.*

Cerambyx sordide niger, punctis elevatis, sparsis, antennis crassis, corporis longitudinem subaequantiibus. *Uddm. Diff. 29.*

Cerambyx textor. *Scop. carn. 164.*

Schaeffer. Icon. tab. 10. fig. 1.

Habitat in truncis arborum Europae.

6. L. thorace spinoso, nigra, antice fasciis, postice punctis viridibus, elytris basi mucronatis. *pulchra.*

Cerambyx pulcher. *Drury. Inf. I. tab. 32. fig. 6.*

Habitat in Africa. *Dom. Drury.*

Statura L. futoris: pulcherrima, nitida. Antennae nigrae, corpore paulo longiores. Caput nigrum, striis tribus viridibus, quarum laterales oculos ambiunt. Thorax rotundatus, obtuse spinosus, ater, strigis tribus viridibus, quarum intermedia curvata et in curvatura striga parva abbreviata ejusdem coloris. Elytra punctata, basi denticulis duobus elevatis, truncatis, mucronata, antice fasciis duabus, postice punctis numerosis sparsis viridi nitentibus. Subtus nigro viridique variegata.

sternuta- 7. L. thorace spinoso, elytris basi porosis, antennis mediocribus.
tor.

Habitat in insula Barbados. *D. Drury.*

Statura L. textoris, at paulo major. Antennae nigricantes, articulo ultimo acuto. Thorax valde spinosus, supra inaequalis. Elytra obtusa, nigra, basi punctis majoribus, inaequalibus, impressa. Subtus tomento flavo tecta.

guttura- 8. L. thorace spinoso, elytris testaceis, albo irroratis: basi punctis elevatis, glabris.
tor.

Habitat in Africa. *Mus. Brit.*

L. futori paulo major. Caput testaceum, linea longitudinali, glabra, nigra. Thorax rotundatus, spinosus, testaceus ruga media, transversali, elevata. Elytra obtusa, testacea, atomis flavicantibus irrorata; basi punctis aliquot elevatis, glabris, rubris. Antennae desunt.

ariolator. 9. L. thorace spinoso, lineato, elytris fuscis: linea semicirculari, alba.

Habitat in India.

Statura L. futoris, at paulo angustior. Antennae corpore longiores. Thorax rotundatus, spinosus, fuscus, linea dorsali lateralibusque albis. Elytra obtusa, fusca, linea alba, quae ab angulo humerali incipit, in medio cum sutura coit et versus apicem ad marginem exteriorem excurrit.

futor. 10. L. thorace spinoso, elytris atris, ferrugineo maculatis, scutello luteo, antennis longissimis.

Cerambyx futor thorace spinoso, elytris obtusis, atris, subnebulosis, scutello luteo, antennis longissimis.
Linn. Syst. Nat. II. 628. 38. Fn. Sv. 655. Scopoli carn. 162.

Cerambyx nigro nebulosus, scutello pallido, elytris fusco aceneis. *Gadd. Diff. 27.*

Habitat in Europae sylvis.

titillator. 11. L. thorace spinoso, elytris cinereo fusco glaucoque nebulosis, antennis longissimis, rufis.

Habitat in Carolina. *Mus. Brit.*

Statura et magnitudo L. futoris. Antennae corpore triplo longiores, excepto primo articulo fuso, rubrae.

rubrae. Thorax utrinque spinosus, antice tuberculis duobus minutissimis. Elytra punctata, cinerea, maculis fuscis glaucisque inordinatis sparsis. Tibiae rufescentes, secundi paris gibbere parvo superne notatae.

12. L. thorace spinoso, elytris cinereo pulverulentis; *vittator.*
vittis duabus flavis, nigro marginatis.

Petiv. Gazoph. tab. 24. fig. 6.

Habitat ad littora sinus Campechani. *Mus. Brit.*

Statura et magnitudo L. sutoris. Antennae mediocres cinereo fuscoque variegatae. Caput cinereo pulv-
erulentum, lineis duabus glabris, atris. Thorax spinosus, cinereus, lineis tribus longitudinalibus,
glabris, atris. Elytra cinerea vittis duabus flavis,
quarum margines elevati, glabri, atri. Maculae aliquot sparsae, atrae, ad basin elytrorum.

13. L. thorace spinoso, nigra, elytris sanguineis. *Kaehleri.*

Cerambyx Kaehleri thorace spinoso, niger, thorace elytrisque sanguineis: macula magna nigra. *Linn.*

Syl. Nat. II. 631. 50.

Cerambyx niger, elytris thoracisque lateribus rufis.

Geoff. Hist. des Inf. I. 204. 6.

Schaeff. Inf. tab. I. fig. I.

Habitat in Europa australi.

Thorax variat immaculatus, et macula lateralii rufa.

Elytra apice emarginata.

14. L. thorace bispinoso, nigra, elytris fasciis quatuor *capensis.*
rufis, antennis mediocribus.

Cerambyx Capensis thorace spinoso, niger, elytris
fasciis quatuor rufis, antennis mediocribus. *Linn.*

Syl. Nat. II. 628. 36.

Drury. Inf. I. tab. 39. fig. 3.

Habitat ad Cap. b. spei.

Statura et magnitudo L. textoris. Thorax scaber,
mucronibus utrinque duobus armatus.

15. L. thorace spinoso, rufo, elytris nigris, fascia macu-
lisque duabus marginalibus sanguineis. *botten-*
totta.

Habitat ad Cap. B. S. *D. Yeats.*

Statura

Statura omnino L. capensis, at duplo major. Caput nigrum, antennis longitudine corporis. Thorax spinosus, scaber, obscure rufus. Elytra nigra, aeneo tincta, fascia media maculisque duabus marginalibus sanguineis. Pedes nigri.

bumeralis. 16. L. thorace spinoso, elytris flavis, nigro-fasciatis, antice mucronatis.

Habitat in - - - - D. Drury.

Statura et magnitudo L. capensis. Antennae nigrae, corpore paulo longiores. Caput flavum, lineis quatuor nigris. Thorax rotundatus, spinosus, flavus, fasciis tribus nigris basi utrinque emarginatus. Elytra flava, fasciis variis passim confluentibus, nigris, basi mucronata. Sternum parum porrectum, apice bidentatum.

trifascia. 17. L. thorace subspinoso, atra, elytris fasciis tribus flavis, antennis mediocribus.

Habitat ad Sierra Leon Africæ. D. Solander ex Mus. Dom. Banks.

Statura L. capensis, at duplo major. Thorax rotundatus, ater, tuberculo tantum obsoleto laterali notatus. Elytra abdomine subbreviora, atra, fasciis tribus latis flavis. Pedes atri, tibiis intermediis apice tuberculatis.

bifasciata. 18. L. thorace spinoso, postice sinuato, elytris flavis, fasciis duabus maculaque rhombea cyaneis.

Habitat in Jamaica. Mus. Brit.

Statura et magnitudo L. capensis. Antennae corpore paulo longiores, atrae. Caput flavum, orbita oculorum cyanea. Thorax unispinosus, flavus, postice fascia cyanea sinibusque duobus erosus. Scutellum basi apiceque cyaneum. Pedes lutei, femoribus coeruleis.

aethiops. 19. L. thorace spinoso, atra, elytris fasciis duabus punctoque apicis luteis, antennis mediocribus.

Habitat ad Cap. Bon. Sp. Mus. Brit.

Statura L. capensis. Antennae nigrae, corpore sublongiores. Caput canaliculatum. Thorax obtuse spinosus, subrugosus. Elytra holosericea, atra, fasciis duabus

duabus flavis, quae tamen suturam dorsalem haud attingunt, puncto que parvo apicis luteis. Pedes compressi, atri.

- Punctum apicis fulvum interdum, at raro, deest.

20. L. fusca, thorace coleoptrisque ocellis quatuor atris. *curculionoides.*
Leptura nigro - cinerea, thorace elytrisque maculis oculiferis, atris, circulo cinereo, thorace subcylindrico. *Geoff. Inf. I. 210. 5.*

Cerambyx curculionoides thorace mutico, ocellis quatuor nigris, elytris ocello sesquialtero: antennis longis. *Linn. Syst. Nat. II. 634. 84.*

Schaeffer. Icon. tab. 39. fig. 1.

Habitat in Europa australiori.

L. Fuliginatori paulo major.

21. L. thorace spinoso, fusca, elytris maculis duabus atris, antennis mediocribus. *trifinis.*

Cerambyx trifinis thorace spinoso, niger, elytris fuscis, maculis duabus atris, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat. II. 629. 42.*

Habitat in ligno cupressi Galliae australioris.

Statura L. fuliginatoris, at paulo major. Antennae vix longitudine corporis.

22. L. thorace spinoso, cinerea, elytris subfasciatis, antennis mediocribus. *rotator.*

Habitat in India. *Mus. Dom. Banks.*

Media. Antennae longitudine corporis, articulis cinereis, apice fuscis. Caput sulcatum, cinereum, palpis nigris. Thorax rotundatus, spina utrinque armatus. Elytra cinerea, fusca, subfasciata.

23. L. thorace subspinoso, nigra, elytris ciperascentibus, *fuliginator.* antennis brevibus.

Cerambyx fuliginator. *Linn. Syst. Nat. II. 639. 43.*

Cerambyx ater, ovatus, antennis corpore dimidio brevioribus, elytris vellere cinereo albidis. *Geoff. Inf. I. 205. 8.*

Frisch. Inf. 13. tab. 19.

Habitat in Europa australiori.

coquus. 24. L. thorace subspinoso, hirsuto, elytris obtusis, sulcatis, atris, antice ferrugineis, antennis mediocribus.
Linn. Syst. Nat. II. 630. 44.

Habitat in America boreali.

Spinae thoracis minutissimae.

tornator. 25. L. thorace spinoso, quadripunctato, elytris rufis, maculis quatuor nigris, antennis brevibus.

Habitat in America.

Minor L. fuliginatori. Antennae nigrae, corpore breviores. Caput rufum, puncto elevato, nigro, ad basin antennarum. Thorax utrinque obtuse dentatus, rufus, punctis quatuor dorsalibus nigris. Elytra obtusa, punctata, rufa, maculis quatuor nigris, quarum prima ad marginem exteriorem baseos, duae approximatae in medio, quarta versus apicem. Subtus nigra, cinereo nitens.

Bankii. 26. L. thorace subbispinoso, grisea, elytris ferrugineo irroratis, fasciisque duabus cinereis.

Habitat ad Cap. B. S. *Mus. Dom. Banks.*

Parva. Caput cinereum, antennis mediocribus fusco cinereo varii. Thorax rotundatus, antice utrinque spinis duabus, anteriore brevissima armatus, griseus, ferrugineo irroratus. Scutellum nigrum. Elytra obtusa, punctata, grisea, atomis ferrugineis numerosis irrorata, fasciisque duabus cinereis, altera ad basin fere obsoleta, altera in medio obliqua futuram haud attingens. Pedes grisei.

pedestris. 27. L. thorace spinoso, atra, vitta integra alba, antennis mediocribus.

Cerambyx pedestris, thorace spinoso, apterus, niger, elytris tomentosis, atris: futura alba, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat. II. 631. 51.*

Cerambyx arenarius. *Scop. carn. 168.*

Cerambyx pedestris. *Pod. Inf. 34. 9.*

Habitat in Europa australiori.

molitor. 28. L. thorace subspinoso, fusca: vittis tribus integris albis, antennis mediocribus.

Habitat in India. *Mus. Brit.*

Valde

Valde affinis L. pedestri, cuius forte varietas. Corpus supra fuscum, vittis tribus albis, a capite ad apicem elytrorum ductis, intermedia in thorace subdidyma per futuram elytrorum excurrit. Lineola parva inter vittas ad basin elytrorum. Thorax tuberculo laterali notatus.

29. L. thorace spinoso, bimaculato, elytris bidentatis: *Rubus.*
basi scabris mucronatis.

Cerambyx rubus thorace spinoso, antennis subtus hispidis, longis, elytris bidentatis basique mucronatis, albo bimaculatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 625. 21.

Habitat in India.

Puncta elytrorum valde variant.

30. L. thorace acute spinoso, grisea, elytris apice bidentatis. *bidens.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

L. Rubo triplo minor. Antennae corpore longiores, fuscae. Caput griseum. Thorax rotundatus, griseus, utrinque acute spinosus. Elytra apice bidentata. Pedes inermes.

31. L. thorace subspinoso, nigro, elytris bidentatis, fuscis, *Solandri.*
cinereo irroratis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo L. bidentis. Antennae mediocres nigrae. Thorax cylindricus, subrugosus, niger, antice utrinque spinula brevissima, acuta. Scutellum nigrum. Elytra punctata, nigra, cinereo irrorata, basi punctata, humeri gibbo apice bidentata. Pedes nigri, planis fuscis.

32. L. thorace obtuse spinoso, maxillis basi cornutis, *cornutus.*
antennis longissimis.

Habitat in America. *Mus. Brit.*

Statura L. Rubi. Antennae nigrae, corpore longiores. Caput canaliculatum, nigrum, maxillis porrectis, acutis, basi tuberculo elevato, valido, corniformi. Thorax rotundatus, utrinque obtuse spinosus, niger, immaculatus. Elytra punctata, nigra, flavo maculata, basi mucrone parvo inflexo armata, apice rotundata, inermia.

leprosa. 33. L. thorace spinoso, elytris basi variolosis, cinereis, macula laterali nigra, antennis longis.

Habitat in America. *Dom. Drury.*

Statura L. rubi, at duplo minor. Antennae obscure rufae, corpore longiores. Thorax rotundatus, unispinosus, dorsoque inaequali. Elytra basi punctis majoribus concatenatis impressa, postice laevia cinerea, puncto parvo in medio, macula magna laterali, et puncto parvo apicis, nigris. Macula nivea utrinque sub basi abdominis. Pedes cinerei.

46. STENOCORVS. *Palpi* quatuor anteriores filiformes, posteriores clavati.

Antennae setaceae.

meridiana- 1. S. thorace subspinoso, elytris fastigiatis, pectore nitente.

Cerambyx meridiana thorace subspinoso, elytris subfastigiatis, fuscis, antice testaceis, pectore nitente. *Linn. Syst. Nat. II. 630. 47. Fn. Sv. 648.*

Cerambyx elytris spadiceis, ventre argenteo. *Raj. Inf. 96. I.*

Schaeffer. Icon. tab. 3. fig. 13. et tab. 79. fig. 7.

Habitat in Europa.

Foemina nigricans, mas testaceus. Larva sub terra, pedibus longissimis. *Raj.*

lamed. 2. S. thorace spinoso, pubescente, elytris fastigiatis, lividis: taenia obscura, longitudinali, sinuata.

Cerambyx lamed. *Linn. Syst. Nat. II. 630. 46. Fn. Sv. 649.*

Stenocorus niger, elytris rubescensibus, apice suturaeque medietate nigris. *Geoff. Inf. I. 226. 6.*

Habitat in Europa.

garganicus. 3. S. thorace spinoso, elytris bidentatis, testaceis: macula pallida, antennis longis.

Habitat in Marylandia. *Mus. Brit.*

Magni-

I. ELEVTERATA. Stenocorus. 179

Magnitudo media. Antennae fuscae, corpore longiores.

Thorax subvillosum, spinosum, castaneum. Elytra bidentata, testacea, lunula in medio alba.

4. S. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis, viridibus, linea laterali lutea. *festivus.*

Cerambyx festivus. Linn. Syst. Nat. II. 623. II.

Gronov. Zool. 541. tab. 16. fig. 5.

Drury. Ins. I. tab. 37. fig. 5.

Habitat in America.

5. S. thorace depresso, tuberculato, mutico, elytris bidentatis, fuscocinereaque nebulosus, antennis medioribus. *mariyan-*
dicus.

Habitat in Marylandia. *Mus. Brit.*

Statura oblonga S. garganici. Antennae mediocres, subaculeatae. Totum corpus cinereo fuscoque variegatum.

6. S. thorace mutico, elytris apice unidentatis, margine omni albo. *trilinea-*
tus.

Cerambyx trilineatus, thorace cylindrico, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, marginibus dentato albis, antennis longissimis. Linn. Mant. 532.

Drury Ins. I. tab. 41. fig. 1.

Habitat in America. *Drury.*

Statura omnino S. irrorati, at paulo major. Antennae longiores, articulo primo secundoque subtus subtilissime barbatis. Caput nigrum, linea laterali alba, dorsalique duplicata, flava. Thorax inermis, niger, flavo irroratus, lineis tribus albis. Elytra apice unidentata, nigra, flavo irrorata, margine exteriori futuraque albis.

7. S. thorace inermi, tuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis. *spinicor-*
nis.

Habitat in America. *D. Drury.*

Statura exacte S. trilineati. Antennae articulis (excepto primo) apice utrinque spina valida armatis. Corpus cinerascens, punctis elevatis fuscis. Elytra apice bidentata, testacea, cinereo irrorata.

- semipunctatus.* 8. S. thorace spinoso, inaequali, elytris bidentatis, basi punctatis, apice glabris.
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentium. Caput atrum, palpis posticis clavatis, ferrugineis. Antennae corpore paulo longiores, fuscae, articulis intermediis apice spinosis. Thorax tomentosus, ater, tuberculatus, utrinque unispinosus. Elytra basi nigro flavoque variegata, punctata: altera dimidia pars atra, glabra, nitida, macula apicis flava. Elytra terminantur dentibus duobus, interiore minore. Pedes fuscii.
- irroratus.* 9. S. thorace mutico, inaequali, elytris apice bidentatis, albo irroratis, antennis longioribus, aculeatis.
Cerambyx irroratus. *Linn. Syst. Nat. II. 633. 62.*
Habitat in America.
- glabratus.* 10. S. thorace mutico, cinereo, linea glabra, fusca, elytris bidentatis.
Habitat in insula St. Croix. *Dom. v. Rohr.*
Corpus cylindricum. *Statura* S. irrorati. Antennae mediocres fuscae, articulis tribus spinosis. Thorax cylindricus, griseus, linea dorsali glabra, fusca. Elytra bidentata, griseo fusoque varia.
- 4 maculatus.* 11. S. thorace scabro, spinoso, elytris bidentatis, maculis duorum parium glabris.
Cerambyx 4. maculatus. *Linn. Syst. Nat. II. 27.*
Sloan. Iam. 2. tab. 237. fig. 21.
Drury. Ins. I. tab. 37. fig. 3.
Habitat in America.
Femora quatuor postica, apice spinosa.
- annulatus.* 12. S. thorace lineato, elytris unidentatis, antennis longioribus: annulis tribus albis.
Habitat - - - - - *Mus. Dom. Banks.*
Statura praecedentis. Antennae corpore longiores, ferrugineae, fascia alba in articulo tertio, quinto et penultimo. Caput fuscum, lineis duabus albis. Thorax rotundatus, griseus, lineis quatuor albis. Elytra grisea, apice fusca, margine albo, truncata, unidentata. Pedes fuscii, cinereo annulati.

13. S. thorace subspinoso, quadrimaculato, elytris bidentatis, ferrugineis, flavo cinereoque maculatis. *10 maculatus.*

Habitat in America. *Dom. Banks.*

Statura S. quadrimaculati, at paulo major. Antennae corpore longiores, ferrugineae. Thorax tuberculis utrinque duobus lateralibus, ferrugineus, maculis quatuor cinereis. Elytra apice obsolete bidentata, ferruginea, macula glabra, solitaria, flava ad basin, dein macula orbiculata, cinerea; in medio maculæ duæ approximatae, glabrae, flavæ, et tandem linea cinerea, apice bifida, ab apice elytri fere ad medium ducta.

14. S. thorace subspinoso, elytris truncatis, bidentatis, *Drurii.* ferrugineis, cinereo fasciatis, antennis brevibus.

Habitat in America. *Dom. Drury.*

Statura et magnitudo S. quadrimaculati. Antennæ piccae, corpore breviores. Thorax rotundatus, utrinque spina parva armatus, et dorso lineis quibusdam transversis elevatis. Elytra apice truncata, bidentata, spina exteriori majori ferruginea, fasciis tribus cinereis, ad suturam connatis. Pectus ferrugineum, maculis utrinque duabus majoribus albis. Abdomen utrinque punctis tribus albis.

15. S. thorace spinoso, cinereus, elytris bidentatis, fascijs undatus, duabus undatis, nigris.

Habitat in America. *Drury.*

Statura et magnitudo S. gorganici. Caput cinereum, oculis nigris. Antennæ corpore parum longiores, villosæ, nigrae, articulorum apicibus cinereis. Thorax utrinque spinosus, cinereus, maculis aliquot dorsalibus glabris, nigris. Elytra punctata, apice bidentata, cinerea, fasciis duabus valde undatis, nigris, quarum posterior crassior.

47. CALOPVS. *Palpi* quatuor,
anteriores clavati,
posterores filiformes.
Maxilla bifida.
Labium membranaceum,
bifidum.
Antennae filiformes.

- serraticor. nis.* 1. *C. fuscus, antennis compressis.*
Cerambyx serraticornis, thorace mutico, subovali, cor-
pore lurido, fusco, antennis compressis, antice
ferratis, mediocribus. Linn. Syst. Nat. II. 634. 65.
Fn. Sv. 665.
Habitat in Europa boreali.
Animalculum elongatum, cylindricum, statura fere
Cleri.
- blandus.* 2. *C. violaceus, elytris antice luteis, antennis brevibus.*
Habitat in Indiis. Mus. Brit.
Hujus generis videtur, C. serraticorni paulo major,
totus cyaneus, elytris antice luteis, punctis duobus
fusciis impressis. Scutellum cyaneum.

48. RHAGIVM. *Palpi* quatuor capitati.
Maxilla unidentata.
Labium membranaceum,
bifidum.
Antennae setaceae.

- inquisitor.* 1. *R. thorace spinoso, elytris nebulosis, fusco sub-*
fasciatis,
Cerambyx inquisitor. Linn. Syst. Nat. II. 630. 49.
Fn. Sv. 659.
Stenocorus niger, vellere flavo variegatus, elytris lincis
duabus elevatis, thorace spinoso. Geoff. Ins. I. 223. 2.
Frisch. Ins. 13. tab. 14.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 10.

6. Steno-

6. *Stenocorus glaber*, e fusco niger, elytro singulo lineis tribus elevatis, maculis duabus luteis, thorace spinoso. *Geoff. Inf.* 1. 222. 1.

Schaeff. Elem. tab. 118. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 2. 3.

Habitat in Europae truncis arborum.

2. R. thorace spinoso, elytris rufis, futura lineaque cursor.
nigris.

Cerambyx cursor thorace spinoso, elytris obtusis,
rufis, margine lineaque nigris, antennis mediocri-
bus. *Linn. Syl. Nat.* 11. 630. 45. *Fn. Sv.* 658.

Cerambyx cursor. Scopoli carn. 167.

Habitat in Europa.

Margo exterior rufus.

3. R. thorace spinoso, elytris fuscis: fasciis duabus obli-
quis, flavis. bifascia-
tum.

Stenocorus glaber, e fusco niger, elytro singulo lineis
tribus elevatis, maculis duabus luteis, thorace spi-
noso. *Geoff. Inf.* 1. 222. 1.

Habitat in Anglia, Gallia.

Statura R. inquisitoris. Antennae ferrugineae, pri-
mo articulo nigrae, corpore breviores. Caput
atrum, canaliculatum, postice gibbum. Thorax
rotundatus, niger, subcanaliculatus, spina valida
utrinque armatus. Elytra fasciis duabus obliquis
flavis, quae tamen margines haud attingunt.
Pedes nigri, femorum basi tibiisque rufis.

4. R. thorace spinoso, nigrum, elytris fascia lata flava. ornatum.

Habitat in Pensylvania. *Muf. Dom. Banks.*

Minor R. inquisitori. Antennae breves, subferrugi-
neae. Caput nigrum, oculis testaceis. Thorax ro-
tundatus, niger, utrinque spina acuta, recurva.
Elytra nigra, in medio fascia lata flava. Margo ex-
terior et apex subferruginea. Pedes ferruginei,
femoribus basi nigris.

49. SAPERDA. *Palpi filiformes.*

Maxilla membranacea,
bifida.

Labium cordatum, trun-
catum.

Antennae setaceae.

carcharias. 1. *S. corpore griseo, nigro, punctato, antennis mediocribus.*

Cerambyx carcharias thorace mutico, cylindrico, cor-
pore griseo, nigro, punctato, antennis mediocribus.

Linn. Syst. Nat. II. 631. 52. Fn. Sv. 660.

Leptura cinerea, nigro punctata, thorace cylindraceo.

Geoff. Inf. I. 208. 1.

Capricornus norvegicus nigrescens, vaginis punctatis,
maculisque pallidis adspersis. Petiv. Gazoph. 5. tab.

2. fig. 1.

Gaed. Inf. 2. tab. 51.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 4.

Habitat in Europae sylvis.

scalaris. 2. *S. coleoptris, linea suturali dentata, punctisque flavis,*
antennis mediocribus.

Cerambyx scalaris. Linn. Syst. Nat. II. 632. 55. Fn. Sv.
697. Scopoli carn. 175.

Cerambyx elytris nigris, albo variegatis. Frisch. Inf.
12. p. 29. tab. 3. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 5.

Habitat in Europae populo.

oculata. 3. *S. thorace luteo, punctis duobus atris, elytris nigris.*

Cerambyx oculatus, thorace mutico, cylindrico, luteo,
punctis duobus nigris, elytris fastigiatis, linearibus,
nigris. Linn. Syst. Nat. II. 633. 60. Fn. Sv. 664.

Cerambyx ferrugineo rufus, elytris nigro cinereis,
punctis excavatis, nigris. Uddm. Diff. 31.

Habitat in Europae sylvis.

birva. 4. *S. grisea, villosa, scutello flavo.*

Habitat in nova Zelandia. Mus. Dom. Banks.

Magnitudo S. oculatae. Antennae setaceae, fuscae,
longitudine corporis. Caput griseum, maculis qua-
tuor

tuor baseos flavescentibus. Thorax cylindricus, griseus, villosus, immaculatus. Scutellum parvum, flavum. Elytra pilis griseis hirta, immaculata, apice obtusa. Pedes grisei.

Palporum articulus exterior oblique subtruncatus.

3. *S. cylindrica*, nigra, pedibus luteis, antennis mediocribus. *linearis.*

Cerambyx linearis, thorace mutico, cylindrico, niger, pedibus omnibus totis luteis, antennis mediocribus.

Linn. Syst. Nat. II. 632. 58. Fn. Sv. 663.

Leptura parallela. *Scop. carn. 153.*

Habitat in Europae sylvis.

6. *S. cylindrica* nigra, thorace linea albida, pedibus anticis luteis. *cylindrica.*

Cerambyx cylindricus, thorace mutico, cylindrico, linea albida, elytris fastigiatis, nigris, pedibus anticis pallidis. *Linn. Syst. Nat. II. 633. 59. Fn. Sv. 662.*

Leptura cylindrica. *Scopoli carn. 157.*

Roef. Inf. 2. scar. 2. tab. 3.

Habitat in pyri, pruni ramis.

7. *S. nigra*, thoracis lateribus, elytrorumque vitta late. *lateralis.*

rati ferrugineis.

Habitat in - - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnitudine fere *S. linearis*, nigrum. Antennae desunt. Thorax rotundatus, lateribus ferrugineis, qui color in vertice capitato coit. Elytra nigra, vitta laterali ferruginea. Margo tamen ipse niger. Pedes nigri.

8. *S. thorace atro*, punto utrinque ferrugineo, elytris griseis, acuminatis. *lyncea.*

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo *S. cylindrica*. Palpi filiformes, aequales. Caput nigrum, antennis setaceis, fuscis, longitudine corporis. Thorax cylindricus, laevis, ater, nitens, punto utrinque ferrugineo. Scutellum parvum, ferrugineum. Elytra grisea, basi punctato striata, apice acuminata, divergentia. Corpus atrum, abdome utrinque punctis quatuor ferrugineis. Pedes fusti, femoribus clavatis.

grisea. 9. S. *grisea*, scutello margine, elytris lineolis flavescentibus.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura omnino praecedentis. Antennae fuscae, corpore paulo longiores. Caput fuscum, palpis filiformibus, fuscis. Thorax cylindricus, griseus. Scutellum margine flavo. Elytra subvillosa grisea, lineolis aliquot brevissimis, flavis, basi punctis impressis, apice vix acuminatis. Pedes fusti, femoribus clavatis.

cardui. 10. S. *fusca*, thorace lineato, scutello flavo, antennis longis.

Cerambyx cardui thorace mutico, cylindrico, corpore fusco, linea longitudinali flavicante, antennis longioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 632. 56.

Habitat in Europae australioris carduis.

Corpus fuscum, flavo irroratum, lineae tres flavae in thorace. Scutellum flavum.

tristis. 11. S. thorace quadrispinoso, corpore fusco.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura S. cylindrica. Palpi quatuor filiformes, articulo ultimo globoso. Antennae breves, fuscae. Thorax rotundatus, niger, spinis quatuor mediis obtusis, lateralibus majoribus acutis. Elytra lacvia, fusca.

populnea. 12. S. thorace flavo, lineato, elytris punctis quatuor flavis, antennis mediocribus.

Cerambyx populneus. *Linn. Syst. Nat.* II. 632. 57.
Fn. Sv. 661.

Leptura nigra, thorace lineis tribus, elytrorumque maculis villoso-flavis, thorace cylindraceo, antennis corpori aequantibus. *Geoff. Inf.* I. 208. 3.

Cerambyx fusco-cinereus, antennis nigro alboque variegatis, elytrorum punctis octo luteis. *Gadd. Sat.* 79.

Habitat in Europae, Americae populeis.

tremula. 13. S. *viridis*, thorace punctis duobus, elytris quatuor nigris.

Habitat Halae. *D. Schreber.*

Statura S. *populneae*, cui valde affinis. Antennae mediocres, longitudine corporis.

14. S. thorace mutico, totus viridis, punctis nigris numerosis, antennis mediocribus. *punctata.*

Cerambyx punctatus thorace mutico, subcylindrico, totus viridis, punctis nigris, antennis mediocribus.

Linn. Syst. Nat. II. 1067. 7.

Habitat in Europa australiori.

Affinis S. tremulae, at major. Antennae et pedes nigri.

15. S. thorace cylindrico, inermi, corpore violaceo. *violacea.*

Habitat in regione Pedemontana. *D. Allioni.*

Statura et magnitudo S. cylindricae. Antennae nigrae, corpore vix longiores. Thorax rotundatus, subpubescens. Elytra laevissima, rugosa. Pedes nigri.

16. S. nigra, elytris flavis, apice nigris.

Leptura praenusta, thorace subgloboso, fusco, elytris

flavis, apice nigris, pedibus quatuor pallidis. *Linn.*

Syst. Nat. II. 641. 24.

Leptura nigra, elytris flavis, apice nigris. *Geoff. Ins.*

I. 209. 4.

Habitat in Europa.

50. CALLIDIVM. *Palpi* quatuor clavati.

Maxilla membranacea,
bifida.

Labium bifidum, laciniis
tenuissimis, acutis.

Antennae setaceae.

1. C. thorace villoso, tuberculis duobus, corpore fusco. *Bajulus.*

Cerambyx Bajulus, thorace mutico, subrotundo, villoso, tuberculis duobus, antennis brevibus. *Linn.*

Syst. Nat. II. 636. 76. Fn. Sv. 672.

Leptura Bajula. *Scopoli carn. 156.*

Frisch. Ins. 13. tab. 10.

Schaeff. elem. tab. 76. fig. 4.

Habitat in Europa,

Elytra in altero sexu pallida.

fennicum. 2. C. thorace tuberculato, rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus.

Cerambyx fennicus thorace mutico, subrotundo, tuberculis subferrugineo-obscuris, elytris violaceis, antennis longiusculis. *Linn. Syst. Nat.* II. 636. 77.
Fn. Sv. 674.

Leptura atra, thorace testaceo, femoribus crassis.
Geoff. Inf. I. 219. 19.

Cerambyx elytris nigro-coeruleis, apice abdominis ferrugineo. *Uddm. Diff.* 33.

Habitat in Europa.

clavipes. 3. C. nigrum, opacum, femoribus omnibus clavatis, antennis longioribus.

Habitat in Germania. *D. v. Hattorf.*

Magnitudo C. Bajuli, totum nigrum, opacum. Antennae corpore longiores, femora omnia valde clavata.

violaceum. 4. C. thorace subpubescente, corpore violaceo, antennis brevibus.

Cerambyx violaceus thorace mutico, subrotundo, pubescente, corpore violaceo, antennis mediocribus.
Linn. Syst. Nat. II. 635. 70. *Fn. Sv.* 667.

Cantharis nigra, thorace rotundato, elytris coerulecentibus. *Gadd. Diff.* 28.

Frisch. Inf. 12. tab. 3.

Habitat in Europa.

variabile. 5. C. thorace glabro, corpore fusco-aeneo, antennis pedibusque fuscis.

Cerambyx variabilis, thorace mutico, subrotundo, inaequali, glabro, pectore anoque ferrugineo, antennis ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 635. 74. *Fn. Sv.* 669.

Frisch. Inf. 12. 345. tab. 6. fig. 3. 4.

Habitat in Europa.

ruficicum. 6. C. thorace nudo, corpore lurido, antennis brevibus.

Cerambyx rusticus. *Linn. Syst. Nat.* II. 634. 67.
Fn. Sv. 666.

Sultz. Inf. tab. 4. fig. 9.

Schaeff. elem. tab. 76. fig. 1.

Habitat in Europae sylvis.

Majus reliquis.

7. C. thorace punctato, corpore atro, elytris laevibus, *stigma*.
stigmate albo.

Cerambyx stigma. *Linn. Syst. Nat. II. 635. 72.*

Habitat in America.

8. C. thorace rotundato, subtus utrinque macula tomentosa, ferruginea, antennis longioribus, barbatis.

Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*

Statura C. pagani, at paulo minus. Antennae corpore longiores, nigrae, tomento ferrugineo barbatae. Ad latera pectoris utrinque macula ocellari, tomento ferrugineo. Corpus nigrum.

9. C. thoracis dorso glabro, atro, lineis quatuor albis, *variegatum*.
elytris flavo irroratis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo C. Bajuli. Antennae longitudine corporis interdum longiores, nigrae, articulis ultimis duobus ferrugineis. Caput nigrum, lineis duabus strigaque transversali albidis. Thorax lateribus flavo irroratis, dorso glabro, atro, nitido, lineis quatuor albidis. Elytra lineolis tribus subelevatis atra, attonis flavescentibus numerosissimis irrorata. Abdomen atrum, utrinque punctis flavis. Pedes nigricantes, femoribus elongatis, posticis annulo albo.

10. C. thorace lineis duabus, elytris quatuor albis, *lineatum*.
diis coeuntibus, abbreviatis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura C. variegati, at triplo minus. Antennae breves, fuscae, articulo primo clavato, ferrugineo. Palpi omnes clavati. Caput nigrum, lineis duabus albis, labium albicans, lineis tribus nigris. Oculi sinu albicante impressi. Thorax ater, nitidus, lineis duabus albis. Scutellum albidum. Elytra obtusa, ferruginea, linea impressa villoso-alba ad marginem exteriorem, duabus in medio ante apicem coeuntibus, et quarta futurali. Abdomen albidum, medio nigrum. Pedes ferruginei, geniculis nigris.

11. C. thorace tomentoso, cinereo, elytris albo nigro-*fulcatum*.
que striatis.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura

Statura et summa affinitas C. lineati, at paulo minus.
 Antennae breves, fuscae. Caput cinereum, linea frontis elevata, glabra, atra. Thorax villis cincereis testus. Elytra sulcata lineis elevatis, glabris, atris, sulcis quatuor villosis, albis. Pedes grisei.

sanguineum. 12. C. thorace subtuberculato elytrisque sanguineis, antennis mediocribus.

Cerambyx sanguineus, thorace mutico, subrotundo, elytrisque sanguineis, corpore nigro, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 636. 80.

Leptura nigra, thorace coleoptrisque sericeo-rubris. *Geoff. Inf.* I. 220. 21.

Cerambyx minor. *Raj. Inf.* 97. 3.

Habitat in Europa.

testaceum. 13. C. thorace subtuberculato, corpore testaceo, antennis mediocribus, fuscis.

Cerambyx testaceus, thorace subrotundo, mutico, glabro, corpore testaceo, antennis mediocribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 635. 75. *Fn. Sv.* 670.

Leptura testacea, thorace glabro. *Geoff. Inf.* I. 218. 18.

Habitat in Europa.

Elytra pallidiora.

luridum. 14. C. thorace subtuberculato, nudo, nigrum, elytris testaceis.

Cerambyx luridus thorace mutico, subrotundo, corpore nigro, elytris luridis. *Linn. Syst. Nat.* II. 634. 68.

Habitat in Europa.

Simile C. Bajulo, at triplo minus.

hafniense. 15. C. thorace subvilloso, nigro, lineis quatuor albis, intermediis abbreviatiss, antennis brevibus.

Habitat Hafniae.

Statura C. striati. Elytra nigra, albedine irrorata.

aulicum. 16. C. thorace laevi, nitido, corpore nigro, opaco, elytris laevibus, antennis brevibus.

Habitat Hafniae.

Valde affine C. striati, at thorax nitidus et elytra haud striata.

17. C. thorace glabro, corpore nigro, elytris striatis, *striatum.*
antennis brevibus.

Cerambyx striatus. *Linn. Syst. Nat. II. 635. 73. Fn.*
Sv. 668.

Habitat in Europa sylvis.

18. C. thorace rotundato, subspinoso, villoso, nigrum, *lynceum.*
elytris macula subdidyma, fulva.

Habitat ad Cap. B. S. *D. Yeats.*

Statura C. Eajuli. Corpus totum nigrum. Thorax
villosum, rotundatum, spina parva utrinque armatus.
Elytra versus basin macula magna interne didy-
ma, fulva.

19. C. thorace subrotundo, mutico, corpore flavo, fe-
moribus clavatis, antennis mediocribus. *flavum.*

Habitat in America. *Mus. Tottianum.*

Statura C. striati. Palpi quatuor clavati. Antennae
longitudine corporis, flavae, oculis solis nigris. Fe-
mora omnia valde clavata.

20. C. thorace tuberculato, elytris nigris: fasciis duabus *undatum.*
undatis albis, antennis brevibus.

Cerambyx undatus, thorace mutico, subrotundo, tuber-
culato, elytris fasciis duabus undulatis, antennis
submediocribus. *Linn. Syst. Nat. II. 6. 36. 79.*
Fn. Sv. 675.

Schaeff. Icon. tab. 68. fig. 1.

Habitat in Europa.

21. C. thorace rotundato, elytris lividis, fasciis tribus *cololum.*
fuscis, antennis brevibus.

Habitat in Carolina.

Statura C. undati. Thorax ferrugineo-fuscus. Elytra
truncata, livida, fasciis tribus fuscis, quarum ultima
vix futuram attingit.

22. C. thorace rotundato, flavo-fasciato, elytris fasciis *flexuosum.*
septem flavis, anticis antrorsum, posticis retror-
sum arcuatis.

Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 3?

Habitat in America. *Dom. Drury.*

Statura

Statura et magnitudo C. arcuati. Antennae et pedes ferrugineae. Caput nigrum, fasciis tribus flavis. Thorax niger, etiam fasciis tribus semicircularibus, flavis.

minutum. 23. C. testaceum, elytris fascia abbreviata, alba.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Parvum. Antennae mediocres, primo articulo crassiori testaceo, reliquis basi albis, apice nigris. Caput testaceum, oculis fuscis. Thorax rotundatus, testaceus. Elytra testacea ante medium, fascia alba, quae suturum haud attingit. Pedes testacei, femoribus valde clavatis, basi albis.

angulatum. 24. C. thorace globoſo, nigro, flavo, fasciato, elytris nigris: fasciis sex flavis, secunda tertiaque angulatis.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Majus C. arcuato. Antennae longitudine corporis, fuscae. Thorax globosus, niger, triges quatuor flavis. Scutellum flavum. Elytra obtusa, nigra, fasciis sex flavis, prima recta, secunda et tertia angulata, reliquis interruptis. Abdomen atrum, fasciis flavis. Pedes ferruginei.

fulminans. 25. C. thorace globoſo, maculato, elytris nigris, fasciis undato angulatis, albis.

Habitat - - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Majus C. arcuato. Antennae breves, cinereae. Caput griseum. Thorax globosus, cinereus, maculis tribus atris, intermedia majori. Scutellum nigrum, margine cinereo. Elytra nigra, fasciis sex valde undatis, albis. Corpus fuscum.

arcuatum. 26. C. thorace rotundato, elytris fasciis quatuor flavis, prima interrupta, reliquis retrosum arcuatis.

Leptura arcuata, thorace globoſo, nigra, elytris fasciis linearibus flavis, tribus retrosum arcuatis, pedibus ferrugineis. *Linn. Syst. Nat. II. 640. 21. Fn. Sv. 696.*

Leptura nigra, elytrorum lineis quatuor arcuatis, punctisque flavis, pedibus testaceis. *Geoff. Inf. I. 212. 10.*

Cerambyx niger elytris, fasciis quatuor flavis, arcuatis. *Uddm. Diff. 30.*

Scarabaeus arboreus: luteo pictus. *Frisch. Inf.* 12. fig. 3.
Cerambyx niger, elytris fasciis quatuor flavis, arcuatibus. *Lechenon. sp.* 30.

Scarabaeus major corpore longo, angusto, nigro, cum tribus in utraque ala lineis transversis, lutescentibus. *Raj. Inf.* 83. 23.

Habitat in Europae hortis.

27. *C. thorace rotundato*, nigro, elytris nigris, fasciis flavis, secunda antrosum arcuata, pedibus ferrugineis. *arietis.*

Leptura arietis. *Linn. Syst. Nat.* II. 640. 23. *Fn. Sv.* 695.

Leptura nigra, elytrorum lineis tribus transversis, punctisque flavis, pedibus testaceis. *Geoff. Inf.* I. 214. II.

Scarabaeus medius niger, lineolis et maculis luteis, pulchre variegatis. *Raj. Inf.* 82. 22.

Scarabaeus niger, lineolis quibusdam luteis distinctis.

List. Scarab. Angl. 385. 14.

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 6.

Frisch. Inf. 12. 32. tab. 3. fig. 5.

Habitat in Europa.

28. *C. thorace globoso*, immaculato, elytris nigris: *rustica*, fasciis linearibus albis.

Leptura rustica thorace globoso, tomentoso, elytris cinereis, fasciis linearibus, albidis, undatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 17. *Fn. Sv.* 692.

Leptura nigra, elytrorum lineis transversis, punctisque albis. *Geoff. Inf.* I. 215. 12.

Scarabaeus niger, elytris lineis duabus albis. *Raj. Inf.* 83. 25.

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 5.

Habitat in Europa.

29. *C. thorace rotundato*, maculato, elytris mucronatis, *mucronata*, nigris, strigis tribus arcuatis, flavis, basi ferrugineis. *tum.*

Habitat in America. *Dom. D. Solander.*

Statura omnino C. arcuati. Caput fuscum, lineis duabus flavis. Antennae breves, ferrugineae, apice fuscescentes. Thorax globosus, niger, striga antica flava et macula utrinque ferruginea. Scutellum fuscum, margine flavo. Elytra nigra, basi ferruginea,

ginea, dein fasciae tres flavae, quarum anterior antrorsum, posteriores retrorsum arcuatae. Apex elytrorum rotundatus, mucronatus.

- acuminata-* 30. C. thorace rotundato, subspinoso, elytris bidentatis, fuscis: strigis quatuor flavis, femoribus clavatis, compressis.

Habitat in America. *D. Solander.*

Statura omnino C. mucronati, at duplo minor. Caput, thorax, antennae, obscure ferruginea, immaculata. Thorax rotundatus, tuberculis aliquot dorsalibus elevatis, acutis, subspinosis. Elytra nigra, strigis quatuor rectis, flavis, apice bidentata. Pedes ferruginei, femoribus clavatis, compressis.

- detritum.* 31. C. thorace rotundato, flavo, fasciato, elytris nigris, fasciis quinque flavis, pedibus ferrugineis.

Leptura detrita thorace globose, nigricante, elytris fuscis, fasciis quatuor transversis flavis, pedibus rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 640. 20. *Fn. Sv.* 694.

Leptura nigra, elytris pallido fuscis, signaturis flavis, *Geoff. Inf.* I. 216.

Schaeff. elem. tab. 76. fig. 2.

Habitat in Europa.

- Verbasci.* 32. C. thorace rotundato, nigro, maculato, elytris subvirescentibus, fasciis tribus nigris, prima lunari.

Leptura Verbasci thorace subovato, nigro, elytris fasciis tribus nigris, prima semiannulata. *Linn. Syst. Nat.* II. 640. 22.

Habitat in verbasco Europae australioris.

- aegyptia-* 33. C. thorace rotundato, ferrugineo, elytris cinerascentibus, fasciis tribus fuscis, prima annulari.

Habitat in Oriente. *D. Prof. Forskäbl.*

Statura et affinitas C. Verbasci, at duplo minor, et thorax ferrugineus, immaculatus.

- mysticum.* 34. C. thorace rotundato, elytris fuscis, fasciis apiceque cinereis, basi rufis.

Leptura mystica thorace globose, tomentoso, elytris fusco cinereis, antice rufis: fasciis linearibus, arcuatis, lateque canis. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 18. *Fn. Sv.* 693.

Leptu-

*Leptura nigra, elytris maculis testaceis, nigris, albidis,
lineisque nigris et albicantibus variegatis.* *Geoff. Inf.*
I. 217. 15.

*Scarabaeus parvus, elytris triplici colore, rufo, albo,
nigro.* *Raj. Inf.* 83. 26.

Cerambyx quadricolor. *Scop. Ent. carn.* 177.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 9.

Habitat in Europae hortis.

35. *C. thorace rotundato, nigrum, elytris fasciis duabus
albis, elytrorum basi antennis tibiisque ferrugincis.* *Alni.*

Leptura Alni. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 19.

Habitat in Europa, Anglia.

Affinis *C. mystico*, at quadruplo minus.

51. DONACIA. *Palpi filiformes.*

Maxilla unidentata.

*Labium membranaceum,
integrum.*

Antennae setaceae.

1. *D. femoribus posticis clavatis, dentatis.*

*Leptura aquatica deaurata, antennis nigris, femori-
bus posticis dentatis.* *Linn. Syst. Nat.* II. 637. I.
Fn. Sv. 677.

Stenocorus deauratus, femoribus posticis dentatis.
Geoff. Inf. I. 229. 12.

Cantharis arundines frequentans, prima. *Raj. Inf.*
100. I.

Scarabaeus arboreus, purpuro aureus, medius. *Frisch.*
Inf. 12. p. 33. tab. 6. fig. 2.

Habitat in plantis aquaticis, Nymphaeis, Phel-
landriis.

2. *D. femoribus simplicibus.*

Habitat in Anglia. *simplex.*

*Antennae nigrae, longitudine corporis. Abdominis
apex et pedes rufi.* Nimis affinis praecedenti.

52. LEPTURA. *Palpi filiformes.*

Maxilla unidentata, apice setosa.

Labium membranaceum, bifidum.

Antennae setaceae.

melanura. 1. *L. nigra, elytris rubescensibus lividisve, futura apiceque nigris.* *Linn. Syst. Nat. II. 637. 2. Fn. Sv. 671.*

Stenocorus niger, elytris rubescensibus lividisve.

Geoff. Inf. I. 226. 7. tab. 4. fig. 1.

Cerambyx niger, elytris flavis, extremitatibus nigris.

Raj. Inf. 97. 6.

Capricornis exiguus, vaginis rubescensibus, apice nigro.

Petiv. Gazoph. tab. 30. fig. 5.

Leptura thorace nigro, nitido, elytris obsolete fordinaque flavescensibus. *Gadd. Diff. 27.*

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 4.

Habitat in Europa: frequens in floribus.

sanguino-lenta. 2. *L. nigra, elytris sanguineis.* *Linn. Syst. Nat. II. 638. 4.*

Fn. Sv. 679.

Leptura sanguinolenta. *Scop. carn. 150.*

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 9.

Habitat in Europa.

villica. 3. *L. ferruginea, antennis elytrisque fuscis.*

Habitat in Anglia. *Mus. Brit.*

L. melanurae paulo major. Antennae nigrae, articulo primo rufo. Caput rufum, oculis nigris. Thorax rufus, angulis posticis acutis, subspinosus. Abdomen et pedes ferruginea.

rubra. 4. *L. thorace, elytris tibiisque purpureis.* *Linn. Syst.*

Nat. II. 638. 3. Fn. Sv. 500.

Scarabaeus arboreus major, purpureo ruber. *Frisch.*

Inf. 12. tab. 3. Ic. 6. fig. 6.

Sultz. Inf. tab. 5. fig. 30.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 2.

Habitat in Europa.

Simillima L. testaceae.

5. L. nigra, elytris testaceis, tibiis rufis, thorace postice rotundato. *Linn. Syst. Nat.* II. 638. 5. *Fn. Sv.* 680.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 3.
 Habitat in Europae arboribus.
6. L. sericeo-virens, antennis fusco viridiique variis. *virens.*
 Leptura virens viridi-flava, antennis luteo viridiique flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 638. 7. *Fn. Sv.* 682.
 Habitat in Europae arboribus.
7. L. corpore toto nigro. *atra.*
 Stenocorus totus niger. *Geoff. Inf.* I. 228. 10.
 Habitat in Germania.
 Minor L. nigra. Tota nigra. Abdomen serico albo nitet.
 Variat pedibus testaceis et nigris.
8. L. elytris attenuatis, corpore nigro, nitido, abdome rubro. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 14. *Fn. Sv.* 689.
 Stenocorus niger nitidus, abdomine fusco-rubente. *nigra.*
Geoff. Inf. I. 227. 9.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 7.
 Habitat in Europa.
9. L. lutea, thorace lineis duabus, elytris fasciis quatuor nigris. *luticornis.*
 Habitat in Carolina. *Mus. Brit.*
 Statura L. attenuatae, at triplo minor. Caput cum antennis mediocribus luteum. Thorax antice attenuatus, luteus, lineis duabus longitudinalibus nigris. Pedes flavi, femoribus posticis annulo nigro.
10. L. nigra, elytris lividis, maculis quatuor nigris. *4 maculata.*
Linn. Syst. Nat. II. 638. 9. *Fn. Sv.* 684.
Schaeff. elem. tab. 118. fig. 2.
 — — *Icon.* tab. I. fig. 7.
 Habitat in Europa.
11. L. nigra, coleoptris testaceis, maculis sex nigris, margin'e connexis. *6 maculata.*
Linn. Syst. Nat. II. 638. II. *Fn. Sv.* 686.
 Scarabaeus elytris pallidis, nigris maculis pictis. *Raj.*
Inf. 81. 18.
 Habitat in Europa.

- attenuata.* 12. L. elytris attenuatis, flavis: fasciis quatuor nigris, pedibus testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 13. *Fn. Sv.* 688.
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 6.
 Habitat in Europa.
 Fasciae elytrorum variant, in primis anterior. Interdum plane deest, interdum interrupta, interdum integra.
- 4 fascia-* 13. L. nigra, elytris testaceis, fasciis quatuor dentatis, nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 12. *Fn. Sv.* 687.
Cerambyx fasciatus. *Scopol. carn.* 172.
 Habitat in Europa.
 Foeminam praecedentis credit *Scopoli.*
- sex gut-* 14. L. nigra, elytris maculis tribus flavis.
tata. Habitat in Germania. *D. v. Hattorf.*
 Corpus statura L. attenuatae, totum nigrum, elytris solis maculis tribus flavis, quarum anterior baseos ad futuram, reliquae duae in medio.
- sericea.* 15. L. viridi-coerulea, elytris subfastigiatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 638. 8. *Fn. Sv.* 683.
Schaeff. Icon. tab. 84. fig. 1.
 Habitat in Europa.
- collaris.* 16. L. thorace globoso, abdomineque rubris, elytris nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 16. *Fn. Sv.* 691.
Scop. carn. 159.
Stenocorus niger, thorace rubro. *Geoff. Ins.* I. 228. II.
Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 9.
 Habitat in Europa.
- virginea.* 17. L. thorace globoso, nigro, elytris violaceis, ab domine rufo. *Linn. Syst. Nat.* II. 639. 15. *Fn. Sv.* 690.
 Leptura nigra, elytris coerulecentibus, toto ab domine rubro. *Gadd. Diff.* 26.
Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 8.
 Habitat in Europa.

18. L. elytris dimidiatis, ferrugineis, immaculatis, antennis brevibus. *abbreviata.*

Necydalis major. *Linn. Syst. Nat.* II. 641. 1.

Musca Cerambyx major. *Schaeff. monogr.* 1753. fig. 1. 2.
elem. tab. 13. fig. 2. *Icon.* tab. 10. fig. 10. 11.

Habitat in Europa.

19. L. elytris abbreviatis, abdomine atro: fasciis fulvis. *variegata.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo L. abbreviatae. Antennae fuscae, longitudo corporis. Caput atrum, fronte flavescente. Thorax rotundatus, niger, margine antico et postico lineaque dorsali fulvis. Scutellum parvum, fulvum. Elytra fusca, ad suturam grisea, apice nigra. Pectus atrum, fulvo maculatum. Abdomen atrum, supra fascia baseos, pone hanc subtus fascia, versus apicem annulus totum abdomen cingens, pone hunc fascia dorsalis, et tandem anus puncto fulvo terminatus. Pedes ferruginei, plantis fuscis.

20. L. elytris dimidiatis, testaceis: apice lineola alba, *dimidiata.*
antennis longis.

Necydalis minor. *Linn. Syst. Nat.* II. 641. 2. *Fn.*
Sv. 837.

Musca Cerambyx minor. *Schaeff. monogr.* 1753. fig. 6. 7.
Icon. tab. 95. fig. 5.

Sultz. Inf. tab. 7. fig. 51.

Habitat in Europa.

21. L. elytris dimidiatis, testaceis, immaculatis, antennis longis. *umbellatarum.*

Necydalis umbellatarum. *Linn. Syst. Nat.* II. 641. 3.

Necydalis minima. *Scop. carn.* 180.

Necydalis elytris apice nigris. *Schreb. Inf.* 4.

Schaeff. Icon. tab. 95. fig. 4.

Habitat in Germaniae umbellatis.

L. dimidiata duplo minor.

53. LAMPYRIS. *Palpi* quatuor anteriores
subclavati, posteriores securiformes.

Maxilla bifida.

Labium corneum.

Antennae filiformes.

noctiluca. 1. *L. oblonga*, fusca, clypeo cinereo. *Linn. Syst. Nat.* II. 643. 1. *Fn. Sv.* 699.

Cantharis mas coleopterus. *Leche nov. sp.* p. 23. 47.

Habitat in Europae borealis iuniperetis.

*splendi-
dula.* 2. *L. oblonga*, fusca, clypeo apice hyalino.
Lampyris splendidula oblongula, fusca, clypeo supra oculos fenestrato. *Linn. Syst. Nat.* II. 644. 3.
Lampyris foemina aptera. *Geoff. Inf.* I. 166. 1.
Scarabaeus *Lampyris* sordide nigricans, corpore longo, angusto. *Raj. Inf.* 78. 15.
Noctiluca terrestris, *Colum ecphr.* I. p. 38. f. 36.
Mouff. Inf. p. 109. f. 1. *Mas.* f. 2. *foemina.*
Bradl. nat. tab. 26. fig. 3. *A. mas* *B. foemina.*
Habitat in sylvaticis, tempestate pluviosa in primis lucem spargens.

obscura. 3. *L. nigra*, clypeo utrinque macula rufa.

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo omnino *L. noctilucae*. Clypeus rotundatus, integer, niger, lateribus depresso, macula magna rufa. Elytra fusca, immaculata. Abdomen et pedes nigra, immaculata.

pyralis. 4. *L. clypeo rufo*, medio nigro, elytris nigris, marginibus abdomineque albis.

Lampyris pyralis, oblonga, fusca, elytris marginibz rufescentibus, clypeo intra marginem purpurascente. *Linn. Syst. Nat.* II. 644. 4. *Mus. Lud. Ulr.* 78.

Habitat in America meridionali.

Margo clypei ipse rufescens, uti margo elytrorum.

5. L. oblonga, nigra, thoracis clytrorumque margine *margina-*
omni, scutello abdominalisque postice flavis. *Linn. ta.*
Syst. Nat. II. 644. 5.
Habitat in America.
Antennae fuscae, basi flavae. Pedes variegati.
6. L. ovata, elytris fuscis, macula marginali triangulari, *Hespera.*
flava. *Linn. Syst. Nat. II. 644. 6.*
Habitat in America.
Clypeus flavus, macula antica fusca. Anus flavus.
7. L. ovata, elytris fuscis, macula marginali ovata, lutea. *ignita.*
Linn. Syst. Nat. II. 645. 7.
Habitat in America.
Clypeus maculis duabus anticis fuscis. Abdomen flavum.
8. L. oblonga, elytris fuscis, margine exteriore luteis, *lucida.*
abdomine flavo. *Linn. Syst. Nat. II. 645. 8.*
Cantharis lucida. Sutz. Inf. tab. 5. fig. 22?
Habitat in America.
Nimis affinis videtur *L. noctilucae.*
9. L. oblonga, subtestacea, abdomine atro, postice fla- *phospho-*
vissimo. *Linn. Syst. Nat. II. 645. 9.* *rea.*
Habitat in America.
Antennae nigrae.
10. L. livida, thorace flavescente, abdomine postice *caperensis.*
flavissimo.
Habitat in Cap. Bon. Spei. *Muf. Dom. Banks.*
Magnitudo *L. noctilucae.* Antennae filiformes, fuscae.
Caput nigrum, ore livido. Thorax transversus,
flavescentia. Scutellum flavum. Elytra livida, ma-
cula baseos fusca, margineque flavescente. Alae
nigrae. Subtus livida, abdominalis ultimis duobus
segmentis flavissimis. Pedes lividi, plantis fuscis.
Variat thorace maculis duabus fuscis.
11. L. flavicans, capite clytrisque fuscis. *australis.*
Habitat in nova Hollandia. *Muf. Dom. Banks.*
Statura et magnitudo *L. italicae.* Caput atrum, an-
tennis filiformibus. Thorax marginatus, laevis,
nitidus, rufus. Scutellum ferrugineum. Elytra
nigra. Subtus flavicans, abdominalis ultimis segmen-
tis flavissimis. Pedes flavescentes, plantis nigris.

- italica.* 12. L. elytris fuscis, thorace transverso, rufo.
Lampyris italicica elytris fuscis, clypeo antice transverso, rufo, medio nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 645. II.
 Habitat in Italiae arboribus.
 In nostra thorax immaculatus, ultima duo segmenta abdominis alba.
- mauritana.* 13. L. elytris lividis, corpore flavo. *Linn. Syst. Nat.* II.
 645. 10.
 Habitat in Africa.

54. PYROCHROA. *Palpi* quatuor subfiliiformes.

Maxilla integra.

Labium cornuum, lineare, integrum.

Antennae filiformes.

- coccinea.* 1. P. nigra, thorace elytrisque sanguineis, immaculatis.
Lampyris coccinea nigra, thorace elytrisque sanguineis, elytris striatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 646. 18.
Fn. Sv. 705.
Pyrochroa. *Geoff. Inf.* I. 338. I. tab. 6. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 4.
 Habitat in Europae sepibus.
 Variat capite nigro aut rufo. Elytra in nostris nullo modo striata.

- sanguinea.* 2. P. nigra, thoracis lateribus elytrisque sanguineis.
Lampyris sanguinea. *Linn. Syst. Nat.* II. 646. 17.
Fn. Sv. 704.
Lampyris elytris rubris, thorace rubro, nigra macula.
Geoff. Inf. I. 168. 3.
Cassida sanguinea. *Scopoli Ent.* 119.
Cantharis prioribus similis, quarta. *Raj. Inf.* 101.
Scarabaeus arboreus, parvus, ruber, elytris longis, clypeo pectorali linea nigra. *Frisch. Inf.* 12. p. 41.
 tab. 3. *Icon.* 7. fig. 2.
Schaeff. Icon. tab. 24. fig. 1.
 Habitat in Europae lapidosis.

3. P. sanguinea, elytris postice violaceis. *bicolor.*
Lampyris bicolor. Linn. Syst. Nat. II. 646. 16.
Cantharis bicolor. Amoen. acad. 6. 395. 21.
 Habitat in Africa.
4. P. atra, thoracis margine flavo, elytris flavis, fascia *reticulata*.
 apiceque nigris.
 Habitat in New York Americae.
 Statura P. bicoloris, at duplo major. Antennae ferratae, compressae, atrae. Clypeus rotundatus, planus, niger, margine lato, flavo. Elytra plana, postice latiora, nervis elevatis quatuor striisque numerosis transversis reticulata, flava, fascia media apiceque late nigris. Subtus atra, sterno flavo.
5. P. flava, elytris macula marginali posticeque nigris, *latissima*.
 margine laterali maximo, dilatato.
Lampyris latissima. Linn. Syst. Nat. II. 646. 14.
 Habitat ad Sierra Leon. *D. Drury.*
 Macula nigra in medio margine elytrorum. Os cylindricum, prominens; rostrum simulans.
6. P. elytris coriaceis, latissimis, testaceis, apice nigris. *palliata.*
 Habitat in Cap. B. Sp. *D. Yeats.*
 Statura et summa affinitas P. latissimae. Corpus nigrum. Rostrum cylindricum, uti in congeneribus. Thorax niger, antice macula utrinque testacea. Elytra striata, latissima, coriacea, testacea, apice nigra. Alae apice fuscae.
7. P. nigra, thoracis lateribus elytrisque flavis, posticeque nigris. *rostrata.*
Lampyris rostrata elytris testaceis, antice posticeque nigris. Linn. Syst. Nat. II. 646. 15. Mus. Lud. Ulr. IO. 78.
 Habitat in Africa.
 Rostrum exacte praecedentis, exsertum, cylindricum.
 Margo thoracis testaceus.
8. P. nigra, thorace elytrisque rufescientibus, elytris *ferraticornis.*
 apice nigris.
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Statura

Statura praecedentis, at triplo minor. Antennae valde compressae, ferratae, nigrae. Thorax rufescens, marginibus subreflexis. Elytra sulcata, sulcis rugosis, rufescens, apice nigra. Abdomen et pedes nigra. Femora basi testacea.

55. LYMEXYLON. *Palpi* extrorsum crassiores.

Maxilla bifida.

Labium lineare, apice rotundatum.

Antennae moniliformes.

dermestoi. 1. L. testaceum, oculis, alis pectoraque nigris.

des. Cantharis dermestoides testacea, oculis alis pectoraque nigris, antennis longitudine thoracis. *Linn. Syst. Nat.* II. 650. 25. *Fn. Sv.* 702.

Habitat in Europa, media.

navale. 2. L. luteum, elytris margine apiceque nigris.

Cantharis navalis, thorace teretiusculo, corpore luteo, elytris margine apiceque nigris. *Linn. Syst. Nat.* 3. 650. 26. *Fn. Sv.* 718. *It. Wgoth.* 155. tab. 2. *Frisch. Ins.* 13. pag. 24. tab. 20.

Habitat intra quercus lignum, quod destruit.

56. CVCVIVS. *Palpi* aequales, articulo ultimo truncato, crassiori.

Labium breve, bifidum, laciniis linearibus, distantibus.

Antennae moniliformes.

depressus. 1. Cucujus.

Habitat in Germania. *D. v. Hattorf.*

Statura depressa, et magnitudo Cantharidis. Antennae nigrae, moniliformes, pilosae, articulis undecim, ultimo acuto. Caput depresso, planum, rufum, ore

ore oculisque nigris, postice utrinque angulo obtuso globoſo auctum. Thorax planus, subsulcatus, rufus, margine denticulato, tenuissime nigro. Elytra plana, rigida, rufa. Corpus subtus et pedes nigra.

57. CANTHARIS. *Palpi securiformes.*

Maxilla bifida.

Labium integrum.

Antennae filiformes.

1. *C. thorace marginato, rubro, macula nigra, clytris fuscis.* *Linn. Syst. Nat. II. 647. 2. Fn. Sv. 700.*

Cantharis sepiarius major, elytris nigricantibus. *Raj.*

Inf. 84. 29.

Cicindela elytris nigricantibus, thorace rubro, nigra macula. *Geoff. Inf. I. 170. I.*

Frisch. Inf. 12. tab. 3. Icon. 6. fig. 5.

Sultz. Inf. tab. 5. fig. 33.

Schaeff. Elem. tab. 123. fig. 1.

Habitat frequens in Europae sepibus.

Saevit in propriam speciem.

2. *C. thorace marginato, tota testacea.* *Linn. Syst. Nat. II. 647. 3. Fn. Sv. 701.*

Cicindela thorace rubro, immaculato, geniculis posticis nigris. *Geoff. Inf. I. 171. 2.*

Cantharis sepiarius major, e rufo flavicans, elytris non maculatis. *Raj. Inf. 84. 28.*

Habitat in Europa, America boreali.

Nimis affinis praecedenti.

3. *C. thorace marginato, marginibus rubris, corpore obscura, nigro.* *Linn. Syst. Nat. II. 648. 5. Fn. Sv. 706.*

Aet. Nidros. 3. p. 396. tab. 6. fig. 5.

Habitat in Europa.

Variat thoracis margine rubro et pallide fusco, pedibus rubris et nigris.

lateralis. 4. *C. thorace marginato, rubro, corpore fusco, elytris margine exteriori flavescentibus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 648. 6. *Fn. Sv.* 707.

Habitat in Europa.

Affinis praecedentibus.

atra. 5. *C. thorace marginato, corpore toto atro.* *Linn. Syst. Nat.* II. 649. 16.

Habitat in Europa boreali.

margina- ta. 6. *C. thorace marginato, nigra, thoracis elytrorumque marginibus rubris.*

Habitat in America. *D. Eaton.*

Statura et fere magnitudo *C. lividae.* Antennae filiformes, nigræ. Caput nigrum, margine laterali maculaque antica rufis. Thorax marginatus, niger, latere exteriori rufo. Elytra nigra, margine omnino rufa. Alæ nigræ. Pedes nigri, femoribus rufis.

ruficollis. 7. *C. atra, thorace abdomineque rufis.*

Habitat in Anglia.

Summa affinitas *C. fuscae*, at duplo minor. Caput cum antennis ferratis atrum. Thorax marginatus, rufus, immaculatus. Elytra, alæ et pectus atra. Abdomen rufum. Pedes nigri.

2 puncta- ta. 8. *C. thorace marginato, punctis duobus nigris, elytris testaceis, apice nigris.*

Habitat Lipsiae.

Caput et antennæ nigra, fronte testacea. Thorax marginatus, marginibus reflexis, testaceis, punctis duobus nigris. Elytra serico aureo splendentia, apice nigra. Abdomen nigrum, apice ferrugineum. Pedes testacei, geniculis posticorum nigris.

melanura. 9. *C. thorace rotundato, corpore luteo, elytris apice nigris.* *Linn. Syst. Nat.* II. 651. 27. *Fn. Sv.* 719.

Cicindela rubra, elytris testaceis, apice nigris. *Geoff. Inf.* I. 173. 5.

Cantharis sepiarius elytrorum apicibus nigris. *Raj. Inf.* 84. 27.

Habitat in Europæ hortis.

10. C. thorace marginato, rufo, macula nigra, corpore *minima*, fuscō, elytris apice flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 649.

12. *Fn. Sv.* 713. *Scop. carn.* 128.

Necydalis elytris puncto flavo. *Geoff. Inf.* I. 372. I.
Habitat in Europa.

11. C. thorace marginato, flavo, macula nigra, corpore *testacea*, nigro, elytris pedibusque lividis. *Linn. Syst. Nat.* II. 649. 15. *Fn. Sv.* 714.

Scop. carn. 123.

Habitat in Europa.

12. C. thorace marginato, medio atro, elytris abbreviatis, nigris, apice flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 648. II.
Fn. Sv. 712.

Cicindela fusca, elytris apice flavis, thorace fuscō.
Geoff. Inf. I. 176. II.

Habitat in Europa.

58. MALACHIVS. *Palpi* filiformes, articulo ultimo setaceo.

Maxilla unidentata.

Labium rotundatum,
membranaceum.

Antennae filiformes.

1. M. corpore viridi-aeneo, elytris extrorsum sanguineis. *aeneus.*

Cantharis aenea thorace marginato, corpore viridi-aeneo, elytris extrorsum undique rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 648. 7. *Fn. Sv.* 708.

Cicindela viridi-aenea, elytris extrorsum rubris.
Geoff. Inf. I. 174. 7.

Scarabaeus minor corpore longiusculo, elytris rubicundis. *Raj. Inf.* 77. 12.

Schaeff. monog. 1754. tab. 2. fig. 10. II.

— — *Icon.* tab. 19. fig. 12. 13.

Habitat in Europae plantis.

Exserit tentacula duo, basi connata, obtusa, sanguinea utrinque ad basin abdominis et duo alia ad apicem thoracis.

2. M.

- bipustula.** 2. M. aeneo-viridis, elytris apice rubris.
tus. *Cantharis bipustulata* thorace marginato, corpore
 aeneo-viridi, elytris apice rubris. *Linn. Syst. Nat.*
 II. 648. 8. *Fn. Sv. 709.*
- Cicindela aeneo-viridis*, elytris apice rubris. *Geoff.*
Inf. I. 175. 8.
- Cantharis vix $\frac{3}{8}$ unciae longa.* *Raj. Inf. 101.* 7.
 Habitat in Europa.
 Larva rapax minimorum insectorum.
- pedicula-** 3. M. ater, elytris apice rubris.
rius. *Cantharis pedicularia* thorace marginato, corpore
 atro, elytris apice rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 648.
 9. *Fn. Sv. 710.*
 Habitat in Europa.
 Pediculo paulo major.
- fasciatus.** 4. M. elytris nigris, fasciis duabus rubris.
Cantharis-fasciata thorace subrotundo, virescente,
 elytris nigris, fasciis duabus rubris. *Linn. Syst.*
Nat. II. 648. 10. Fn. Sv. 711.
- Cicindela elytris nigris*, fasciis duabus rubris. *Geoff.*
Inf. I. 177. 12.
- Cantharis valde exigua.* *Raj. Inf. 102.* 22.
 Habitat in Europae muscis.

59. NECYDALIS. *Palpi* subfiliformes.
Maxilla unidentata.
Labium membranaceum,
 late emarginatum.
Antennae filiformes.

- viridiss-** 1. N. thorace teretiusculo, corpore viridi.
ma. *Cantharis viridissima.* *Linn. Syst. Nat.* II. 650. 23.
Fn. Sv. 717.
- Cicindela viridi-coerulea.* *Geoff. Inf. I. 177.* 14.
 Habitat in Europae hortis frequens.
- coerule-** 2. N. thorace teretiusculo, corpore coeruleo, subopaco.
scens. *Cantharis coerulea.* *Linn. Syst. Nat.* II. 650. 22.
Fn. Sv. 716.
 Habitat in Europa cum praecedente.

3. N.

3. N. elytris subulatis, nigra, femoribus omnibus clavatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 642. 5.
 Habitat in Europa australi.
 Tota nigra, opaca, immaculata.
4. N. elytris subulatis, nigris, basi flavis. *Cantharis nigra*, elytris attenuatis, antice flavis. *Geoff. Inf.* I. 342. 2. *bunurana-*
Habitat in Anglia.
 Duplo major N. Podagrariae. Corpus nigrum.
 Elytra subulata, nigra, basi flavescentia absque lineis aut margine elevatis. Pedes simpllices, nigris.
5. N. elytris subulatis, nigra, femoribus omnibus clavatis, elytris antennisque rufis. *Necydalis rufa* elytris subulatis, nigra, femoribus omnibus clavatis, elytris antennisque rufis. *Linn. Syst. Nat.* II. 642. 6.
 Leptura nigra, elytris pedibusque rubescientibus, lividis, coleoptris attenuatis. *Geoff. Inf.* I. 220. 22.
Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 8.
 Habitat in Europa.
 Elytra basi puncto nigro. Scutellum album.
6. N. elytris subulatis, coerulea, femoribus posticis clavatis, arcuatis. *Necydalis coerulea*. *Linn. Syst. Nat.* II. 642. 4.
 Cantharis viridi-coerulea, elytris attenuatis, femoribus posticis globosis. *Geoff. Inf.* I. 342. 3.
Cantharis nobilis. *Scopoli Ent.* 145.
Schaeffer. Icon. tab. 94. fig. 7.
 Habitat in Oriente.
 Variat pedibus simplicibus.
7. N. elytris subulatis, testaceis, corpore nigro, femoribus posticis clavatis, basi testaceis. *Necydalis Podagrariae*. *Linn. Syst. Nat.* II. 642. 9.
 Cantharis nigra, elytris attenuatis, fulvis, femoribus posticis globosis. *Geoff. Inf.* I. 343. 4.
Cantharis femorata. *Scopoli Ent.* 144.
Schaeffer. Icon. tab. 85. fig. 7?
 Habitat in Aegopodio Podagraria.

simplex. 8. N. elytris subulatis, testaceis, pedibus simplicibus.

Necydalis simplex. *Linn. Syst. Nat.* II. 643. 10.

Cantharis phthysica. *Scop. carn.* 144.

Habitat in Europa.

Forte praecedentis varietas.

60. ELATER. *Palpi* securiformes.

Maxilla unidentata, obtusa.

Labium bifidum.

Antennae filiformes.

speciosus. 1. E. albus, nigro maculatus.

Elater speciosus albus, lineis punctis maculisque nigris.

Linn. Syst. Nat. II. 652. 2.

Habitat in India.

Antennae breves, nigrae.

oculatus. 2. E. thorace oculis duobus atris, corpore nigro, albo maculato.

Elater oculatus thorace ocellis binis atris, iridibus albis, corpore nigricante. *Linn. Syst. Nat.* II. 651. 3.

Scarabaeus elasticus major, capite bimaculato. *Petiv. Gazoph. tab.* 10. fig. 4.

A&T. Angl. 246. p. 396. 13. et 271. p. 842. 32.

Habitat in America septentrionali.

noctilucus. 3. E. thoracis lateribus macula flava, glabra.

Elater noctilucus. *Linn. Syst. Nat.* II. 657. 4. *Muf. Lud. Ulr.* 82.

Elater major fuscus, phosphoricus. *Brown. Iamaic.* 432. tab. 44. fig. 10.

Scarabaeus medius fuscus, thorace angulato, lucem emittente. *Sloan. Iam.* 2. 206. tab. 237. fig. 1.

Cocujas. *Mouff. Inf.* 112.

Habitat in America.

phosphorus. 4. E. thorace postice maculis duabus flavis.

Elater phosphoreus. *Linn. Syst. Nat.* II. 652. 5.

Habitat in America.

Nimis affinis praecedenti, quamvis duplo minor.

5. *E. ater*, antennis pedibusque fuscis. *fusipes.*
Habitat in India orientali. Koenig.
Magnus, ater totus, solis antennis et pedibus fuscis.
Elytra striata.
6. *E. ferrugineus*, elytris mucronatis, antennis nigris. *ligneus.*
Linn. Syst. Nat. II. 652. 7. Amoen. acad. 6. 395. 24.
*Elater testaceus, thorace antice truncato, elytris posti-
ce acuminatis. Gronov. Zooph. 477?*
Habitat in America meridionali.
7. *E. thorace elytrisque ferrugineis, corpore thoracis-
que margine postico nigris.* *ferrugi-
neus.* *Linn. Syst. Nat. II. 654. 20.* *Fn. Sv. 729.*
Elater thorace elytrisque rubris. Geoff. Inf. I. 130. 1.
tab. 2. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 1.
Habitat in Europa.
8. *E. viridi-aeneus, elytris sulcatis, sulcis villoso-albis.* *porcatus.*
*Elater porcatus, fuscus, elytris nigris, porcatis, sulcis
elevatis, glabris. Linn. Syst. Nat. II. 652. 6?*
Habitat in America.
Pectoris futura atria, nitida.
9. *E. thorace atro, nitido, elytris nigris, striatis.* *aterrimus.*
*Elater aterrimus, ater, thorace opaco, punctato, elytris
striatis. Linn. Syst. Nat. II. 653. 17.* *Fn. Sv. 726.*
Elater totus niger, nitidus. Geoff. Inf. I. 136. 13.
Habitat in Europa.
10. *E. thorace obscure cinereo, elytris cinereo-nebu-
lofis, plantis rufis.* *murinus.* *Linn. Syst. Nat. II. 655. 22.*
Fn. Sv. 738.
Elater niger, elytris villoso-murinis. Geoff. Inf. I.
135. 10.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 6.
Habitat in Europa.
11. *E. elytris aeneis, maculis pallidioribus confertis,* *tessellatus.*
unguibus rubris. Linn. Syst. Nat. II. 655. 25.
Fn. Sv. 739.
Elater niger, villoso-undatus. Geoff. Inf. I. 135. 9.
Elater thoracicus. Scopoli Ent. 282.

Elater niger, pilis minimis flavo-aeneis, junctim intermixtis. *Gadd. Sat.* 80.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 7.

Habitat in Europa.

- fasciatus.* 12. E. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigricantibus, fascia alba undulata. *Linn. Syst. Nat.* II. 655. 27. *Fn. Sv.* 737. *Scopol. carn.* 281. Habitat in Europa.

- aeneus.* 13. E. thorace elytrisque aeneis, pedibus sanguineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 655. 31. *Fn. Sv.* 740. *Elater nitens.* *Scopol. Ent.* 279. Habitat in Europa.

- pectinicornis.* 14. E. thorace elytrisque aeneis, antennis maris pectinatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 655. 32. *Fn. Sv.* 741. *Elater fuscoviridi-aeneus.* *Geoff. Inf.* I. 133. 7. *Scarabaeus* antennis articulatis septimus. *Raj. Inf.* 92. 7. *Scarabaeus* e nigro virens, corniculis altero tantum versu pectinatis. *Lister. Angl.* 387. 19. *Sultz. Inf.* tab. 5. fig. 36. *Schaeff. Icon.* tab. 2. fig. 4. — — *Elem.* tab. II. fig. 1. et tab. 60. Habitat in Europa.

- cypreus.* 15. E. cypreus, elytris dimidiato-flavis. Habitat in Anglia. Statura omnino et magnitudo E. pectinicornis, obscure cupreus, seu rufo-aeneus. Antennae nigrae, pectinatae. Elytra striata, basi testacea, apice cuprea.

- cruciatus.* 16. E. thorace nigro, lateribus ferrugineis, coleoptris flavis, cruce margineque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 653. 12. *Fn. Sv.* 722. *Elater* thorace nigro, circulo rubro, elytris fulvis, cruce nigra. *Geoff. Inf.* I. 133. 6. Habitat in Europa.

- syriacus.* 17. E. thorace rufo, elytris fascia duplice alba, corpore nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 653. 11. *Muf. L. Utr.* 83. Habitat in Oriente. Minor. Fascia elytrorum altera ad basin, altera in medio.

18. E. thorace testaceo, pubescente, elytris flavis, apice *castaneus*.
nigris, corpore atro. *Linn. Syst. Nat.* II. 654. 18.
Fn. Sv. 727.
Elater thorace villoso, elytris testaceis, apice nigris.
Geoff. Inf. I. 132. 4.
Scarabaeus antennis articulatis. *Raj. Inf.* 92. 6.
Scarabaeus ex fusco rufescens, s. *castaneus*. *List.*
loqu. 387.
Schaeff. Icon. tab. II. fig. 9. et tab. 31. fig. 4.
Habitat in Europae campis.
19. E. niger, thorace glaberrimo, rubro, elytris testaceis. *lucens*.
Linn. Syst. Nat. II. 654. 19. *Fn. Sv.* 728.
Schaeff. Icon. tab. II. fig. 8.
Habitat in Europa.
Caput, scutellum, corpus et pedes nigra.
20. E. thorace rufo, medio fusco, elytris testaceis, linea-
ribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 655. 13. *Fn. Sv.* 723.
Habitat in Europa.
Caput, corpus et scutellum nigra. Os antennarum,
basis et tibiae pallidae.
21. E. piceus, thorace elytrisque obscure nigris. *obscurus*.
Elater *obscurus* thorace fusco, obscuro, elytris obscure
testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 655. 25. *Fn. Sv.* 735.
Habitat in Europae plantis.
22. E. thorace obscure-nigro, elytris striatis, fuscis, *flavipes*.
pedibus testaceis.
Habitat in America. *Dom. v. Rohr*.
Simillimus E. *obscuro*, pedibus tamen *flavescentibus*
facillime distinguitur.
23. E. thorace atro, nitido, elytris, basi margineque *tristis*.
exteriore lucidis. *Linn. Syst. Nat.* II. 655. 26.
Fn. Sv. 736.
Habitat in ligno putrescente.
24. E. thorace fusco, elytris testaceis, margine undique *margina-*
nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 654. 23. *Fn. Sv.* 733. *tus*.
Habitat in Europa.

mesomelus. 25. E. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore elytrisque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 653. 16.
Fn. Sv. 725.

Habitat in Europa.

thoraci- 26. E. niger, thorace toto rufo.

eius. Elater niger, thorace rufo. *Geoff. Inf.* I. 132. 5.

Habitat prope Henly Anglorum.

Nimis affinis videtur E. ruficollis, at paulo major.

Caput atrum, antennis nigris, ferratis. Thorax pubescens, totus rufus, nec uti in ruficollis postice niger, sola linea intermedia pectoris nigra. Elytra subpubescentia, striata, atra. Pedes nigri, plantis piceis. An mera varietas E. ruficollis?

ruficollis. 27. E. niger, thorace postice rubro, nitido.

Elater ruficollis thorace rubro, nitido, antice nigro, elytris corporeaque nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 653. 14. *Fn. Sv.* 724.

Scarabaeus elytris nigris, scapulis rubris. *Raj. Inf.* 92. 8.

Elater gramineus. *Scopol. Ent.* 290.

Habitat in Europae graminosis.

brunneus. 28. E. thorace rufo, medio nigro, elytris corporeaque ferrugineis.

Elater brunneus thorace nigro, utrinque rufo, elytris corporeaque ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 653. 10. *Fn. Sv.* 721.

Habitat in Europa.

sanguineus. 29. E. ater, elytris sanguineis.

Elater sanguineus thorace atro, elytris rubris, corpore nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 654. 21. *Fn. Sv.* 731. *Scop. carn.* 287.

Elater niger, elytris rubris. *Geoff. Inf.* I. 131. 2.

Schaeff. Ikon. tab. 2. fig. 6.

Habitat in Europa.

Elytrorum summus apex niger.

30. E. thorace atro, elytris antice dimidiato rufis, *balteatus*.
corpore nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 654. 22.
Fn. Sv. 732.
Scarabaeus minor, elytris bicoloribus e fulvo et nigro,
saltatrix. *Raj. Inf.* 78. 23.
Habitat in Europa.
31. E. thorace fusco, nitido, elytris cinereis, corpore *sputator*.
nigro. *Linn. Syst. Nat.* II. 654. 24. *Fn. Sv.* 734.
Scop. carn. 583.
Habitat in Europa.
32. E. niger, elytris fuscis, lineatis. *striatus*.
Habitat in Suecia.
Medius. Caput et thorax obscure nigra. Elytra fusca,
lineis quatuor pallidis, ad apicem coeuntibus. An-
tennae ferrugineae. Pedes fuscii.
33. E. thorace atro, nitido, elytris nigris. *Linn. Syst. minutus*.
Nat. II. 656. 34. *Fn. Sv.* 744.
Habitat in Europa.
Parvus, niger, nitidus.
34. E. capite thoraceque atris, elytris nigris: maculis *pulchellus*.
flavanticibus, pedibus flavis. *Linn. Syst. Nat.* II.
656. 35. *Fn. Sv.* 745.
Habitat in Europa.
35. E. thorace ferrugineo, elytris atris, fasciis duabus *festivus*.
flavis.
Habitat in Aegypto. *D. Forstkähl.*
Parvus. Statura E. pulchelli. Caput fuscum. Thorax
laevis, rufescens. Elytra striata, nigra, fasciis
duabus flavis, altera ad basin, altera versus apicem.
36. E. niger, nitidus, elytris puncto baseos rubro. *Linn. 2 pustula-*
Syst. Nat. II. 652. 9.
Elater niger, elytrorum basi maculis rubris. *Geoff.*
Inf. I. 136. 15.
Habitat in Germania.

61. BUPRESTIS. *Palpi filiformes, articulo ultimo truncato, obtuso.*

Maxilla unidentata, obtusa.

Labium cylindricum, acuminate.

Antennae filiformes, serratae.

unidentata. 1. *B. elytris unidentatis, aeneis, margine aureo.*

Habitat - - - - - Mus. Dom. Banks.

Magna, Antennae breves, nigrae. Caput viride, fronte canaliculato, aureo, Thorax viridis, lineis tribus latis, cupro-aureis. Elytra glabra, viridia, nitida, margine aureo, apice unidentata. Corpus viride, nitens, plantis fuscis.

gigantea. 2. *B. elytris bidentatis, rugosis, thorace laevi, corpore inaurato.* Linn. Syst. Nat. II. 659. 1. *Mus. L. U. 85.*

Cantharis maxima, elytris cuprei coloris, sulcatis. Sloan, Iam. 2. p. 210. tab. 236. fig. 1. 2.

Cerambyx Indiae orientalis maximus. Grew. Mus. 165. tab. 13.

Sulzr. Inf. tab. 6. fig. 38.

Merian. Sur. tab. 50. fig. inf.

Seb. M's. 3. tab. 84. fig. 12.

Habitat in America, Asia,

vittata. 3. *B. elytris bidentatis, punctatis: lineis elevatis quatuor, viridi-aeneis, vitta lata, aurea.*

Habitat in India. Dom. Banks.

Statura B. ignitac. Caput canaliculatum, viride, fronte aureo antennisque nigris. Thorax punctatus, macula utrinque aurea baseos. Elytra apice bidentata, subaenea, nitida, tomento ferrugineo tecta,

fasciata. 4. *B. elytris truncatis, bidentatis, variolosis, viridibus; futura aurea.*

Habitat in America septentrionali. Dom. Banks.

Minor B. vittata, at statura eadem; oblonga. Caput planum, scabrum, antice aureum, emarginatum. Thorax rotundatus, punctatus, viridi-aeneus. Elytra bidentata, viridia, splendida, futura aurea, punctis

punctis majoribus cicatrisantibus impressis, at lineae elevatae nullae. Subtus aeneus, punctatus, sterno antice posticeque emarginato.

5. B. elytris bidentatis, cupreis, punctis violaceis numerosis. *punctatis-simia.*

Habitat in Sierra Leon Africae. *Drury.*

Magnitudo et statura B. mariana. Corpus cupreum, nitidum, maculis plurimis violaceis sparsis.

6. B. elytris truncatis, bidentatis, viridibus, vitta coerulecente marginibusque aureis. *decora.*

Habitat in America. *Dom. Banks.*

Simillimus B. fastuosae, at duplo minor. Caput viride aureo - nitens, scabrum. Thorax aureus, postice rotundatus. Elytra truncata, subbidentata, viridia, vitta coerulecente in medio, margine exteriori et sutura aureis. Subtus aureus, punctatus, sterno antice posticeque emarginato.

7. B. elytris bidentatis, obscura, ano tridentato. *lurida.*

Habitat in America. *Mus. Dom. Banks.*

Statura B. rusticæ. Thorax elytraque rugosa, aeneo cinereoque variegata. Elytra apice bidentata, subtus aenea.

8. B. elytris truncatis, subbidentatis, cupreis: lineis elevatis quatuor. *striata.*

Habitat in Pennsylvania. *Mus. Dom. Banks.*

Media, Antennæ breves, nigrae. Caput et thorax obscure cuprea, scabra. Elytra lineis quatuor elevatis, quarum exteriore apice coeunt, interiores abbreviatae.

9. B. elytris tridentatis, thorace impresso, corpore inaurato. *Linn. Syst. Nat. II. 659. 3. Mus. L. U. 86. ignita.*

Beetle. *Grew. Mus. 166. tab. 13.*

Petiv. Gazoph. tab. 20. fig. 8.

Rumpf. Iap. I. p. 132. tab. 10. fig. 7.

Habitat in Indiis,

10. B. elytris truncatis, subtridentatis, nigro-aeneis: vittis duabus ferrugineis. *lineata.*

Habitat in America. *Dom. Banks.*

Statura et magnitudo B. rusticae. Caput obscure aeneum, margine antico pallido, fasciaque media rufa. Thorax punctatus, aeneus, margine exteriori antice rufo. Elytra terminata denticulis tribus obsoletis, obscure aenea, vittis duabus rufis, quarum exterior ad basin flexuosa, interior basi latior apicem clytri haud attingit. Subtus aenea, gula rubra. Sternum antice posticeque emarginatum. Primum abdominis segmentum sulco exaratum.

ocellata. II. B. viridi-nitens, elytris tridentatis, maculis duabus aureis ocellariisque flava.

Habitat in Indiis.

Statura B. ignitae. Caput canaliculatum. Thorax punctatus, aureus, linea longitudinali coerulescente. Elytra tridentata, lineis tribus elevatis, viridia, maculis duabus aureis, altera ad basin, altera ad apicem, in medio vero macula magna subocellaris, flava, quae in quibusdam in fasciam fere excurrit, margines tamen haud attingit.

sternicor- nis. 12. B. elytris serrato-tridentatis, viridibus, punctis cinereis impressis, sterno porrecto, conico. *Linn. Syst. Nat.* II. 660. 5. *Mus. Lud. Ulr.* 88.

Carabus orientalis, crassius. *Grew. Mus.* 167. tab. 13.

Habitat in India.

Corpus viridi-aeneum, nitens. Thorax variolosus.

Varietatem vidi elytrorum punctis consolidatis, vix conspicuis, excepto puncto latiori baseos. Subtus aurea, laevis, macula ferruginea utrinque in pectore et duabus in ultimo abdominis segmento. An distincta?

Chrysis. 13. B. elytris serrato-tridentatis, castaneis, sterno conico, porrecto.

Buprestis sternicornis β. *Linn. Syst. Nat.* II. 660. 5. *Mus. Lud. Ulr.* 88.

Habitat in India.

Simillimus B. sternicorni, cuius etiam varietatem Cl. *Linnaeus* dicit. Differt tamen elytris totis castaneis, immaculatis, laevibus. Subtus viridi-aurea, immaculata.

14. B. elytris ferratis, sulcatis, corpore depresso, obscuro. *depressa.*
 Habitat in Oriente. *D. Prof. Forskäbl.*
 Major E. chrysostigmate. Thorax canaliculatus, punctatus, obscurus, utrinque angulatus. Elytra apice subtilissime ferrata, sulcis octo exarata, subitus magis cuprea.
15. B. elytris ferratis, longitudinaliter rugosis: maculis *marianna.* duabus impressis, thorace sulcato. *Linn. Syst. Nat.* II. 660. 6. *Fn. Sv. 754. Mus. Lud. Ulv. 89.*
 Cantharis mariannus viridis, perelegans, vaginis sulcatis, signaturis flavescentibus notatis. *Petiv. Gazoph. tab. 2. fig. 2.*
Schaeff. Icon. tab. 49. fig. 1.
 Habitat in Europa, America,
16. B. elytris ferratis, viridibus: sulco abbreviato suturali impresso. *farinosa.*
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Magnitudo media. Antennae nigrae. Caput canaliculatum, fuscum, orbita oculorum aurea. Thorax obseure aeneus, dorso canaliculato, marginibus lunula impressis. Elytra rugosa, viridia, sulco longitudinali a medio ad apicem impressa. Corpus aeneum, polline ferrugineo adspersum.
17. B. elytris ferratis, porcatis, thorace angulato, corpore fuscō, nitido. *poreata.*
 Habitat in Oriente. *Forskäbl.*
 Paulo major B. rustica. Thorax punctatus, dorso valde impresso lateribusque prominentia obtusa angulatis. Elytra ferrata, porcata vel lineis elevatis tribus spatio interjecto punctis concatenatis, in dupli serie striatis. Color totus fuscus, cupreornitidus.
18. B. elytris setratis, longitudinaliter sulcatis, maculis duabus aureis impressis, thorace punctato. *Linn. Syst. Nat. II. 660. 7. Fn. Sv. 755. chrysostigma.*
 Cucuius aureus elytrorum fossulis quatuor impressis, intentibus. *Geoff. Ins. I. 125. 1.*
Sultz. Ins. tab. 6. fig. 39.
 Habitat in Europa.

- impressa.* 19. B. elytris serratis, aeneis, punctis tribus impressis.
 Habitat in Indiis: e *Museo D. Bernoulli* Basiliensis.
 Magnitudo et statura B. rusticae. Totum corpus obscure aeneum. Punctum thorace utrinque impressum. Elytra margine toto ferrata, punctis tribus distinctis impressis. Linea unica ad suturam elevata.
- ornata.* 20. B. elytris serratis, obscuris, albo-maculatis.
 Habitat in Pennsylvania. *Mus. Dom. Banks.*
 Minor. Antennae breves. Caput et thorax nigra, immaculata, punctata. Elytra margine toto ferrata, punctata, striata, obscura, maculis plurimis albis sparsis. Corpus nigrum.
- cylindri-ca.* 21. B. elytris serratis, striatis, corpore cylindrico, nigro.
 Habitat in Oriente. *Forstkäbl.*
 Parva. Oculi testacei. Thorax laevis, fuscus, cupreο parum nitens. Elytra ferrata, striata, nigra. Corpus magis cylindricum, quam in reliquis.
- scabra.* 22. B. elytris integris, fronte sulcato, corpore scabro, aureo.
 Habitat in Indiis. *D. Mallet.*
 Magnitudo fere E. ignitae. Corpus totum cupreο aureum, scabrum, immaculatum. Caput fulco profundo exaratum. Oculi testacei.
- & guttata.* 23. B. elytris integris, maculis quatuor albis, corpore coeruleo. *Linn. Syst. Nat. II. 659. 2. Fn. Sv. 753.*
 Cucuius viridi-aeneus, punctis quatuor impressis albis. *Geoff. Inf. I. 126. 2.*
Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 1.
 Habitat in Europa.
- fascicula-*
ris. 24. B. elytris integerrimis, striatis, punctis fasciculato-villoso, corpore inaurato, hirsuto. *Linn. Syst. Nat. II. 661. 12. Mus. Lud. Utr. 90.*
Scarabaeus amboinensis. Seb. Mus. 2. p. 22. tab. 20. fig. 5.
Scarabaeus viridis, aureus, papillis pilis albis obtusis, undique hirtus. Petiv. Gazoph. 4. tab. 13. fig. 5.
Sulz. Inf. tab. 6. fig. 4.
 Habitat ad Cap. B. S. Variat corpore nigro. *Mus. Dom. Banks.*

25. B. elytris integrimis, pedibus ferrugineis, corpore *hirta*.
hirsuto. *Linn. Syst. Nat.* II. 661. 13. *Mus. L. U.* 91.

Habitat in Africa.

Varietatis huius a colore plures.

26. B. elytris integris, fulcatis, aeneis, capite thorace- *austriaca*.
que viridibus.

Buprestis austriaca elytris striatis, bidentatis, capite
thoraceque viridi, abdomine violaceo. *Linn. Syst.*
Nat. II. 661. 9.

Mordella gigantea. Scopoli carn. 187.

Habitat Idriae. *D. Scopoli.*

Elytra in nostra truncata, nec bidentata.

27. B. clytris integris, viridibus, margine omni aureo, *splendens*.
lineisque tribus elevatis.

Habitat in China.

Magnitudo B. rusticae. Corpus viride, nitens, elytro-
rum margine et futura aureis.

28. B. elytris emarginatis, striatis, obscure aeneis. *rufifica.*

Buprestis rustica elytris striatis, fastigiatiss., thorace
punctato. *Linn. Syst. Nat.* II. 660. 8. *Fn. Sv.* 756.

Cucuius viridi-auratus, oblongus, thorace punctato,
elytris striatis. *Geoff. Inf.* I. 126. 3.

Mordella rustica. Scopoli carn. 188.

Habitat in Europa.

29. B. atra, elytris integris, truncatis, thorace vario-
loso, dilatato. *Tenebrio-*
nis.

Buprestis Tenebrionis atra, elytris integris, lineato-
punctatis, thorace varioloso, dilatato. *Linn. Syst.*
Nat. II. 661. II.

Habitat in Europa, Africa.

Thorax punctis elevatis, nitidis, planis, distinctus
utrinque angulo rotundato prominet.

30. B. nigra, elytris fasciis cinereis, undulatis. *Linn. Rubi.*
Syst. Nat. II. 662. 14.

Habitat in Rubo, Cichorio.

- bimaculata.* 31. B. elytris integerrimis, striatis, macula rubra, corpore fuscō - viridi. *Linn. Syst. Nat.* II. 662. 16. *Mus. Lud. Ulr.* 92.
 Habitat in India.
 Macula magna rubra in medio elytrorum.
- triflisis.* 32. B. elytris integerrimis, marginatis, corpore cupreō, abdomine punctis decem nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 662. 18. *Mus. L. U.* 93.
 Habitat in Indiis.
 Abdomen in singulo segmento utrinque puncto nigro.
- cuprea.* 33. B. elytris integerrimis, thoracis lateribus scabris, scutello tuberculari, corpore cupreō. *Linn. Syst. Nat.* II. 662. 20. *Mus. L. Ulr.* 94.
 Habitat in America.
 Thoracis latera depressa, scabra. Scutellum puncto elevato prominet.
- nobilis.* 34. B. elytris integerrimis, fasciis linearibus duabus undatis, inauratis, corpore fuscō. *Linn. Syst. Nat.* II. 662. 21.
 Habitat in Indiis.
- 4 punctata.* 35. B. elytris integerrimis, punctatis, thorace punctis quatuor impressis, corpore obscuro. *Linn. Syst. Nat.* II. 662. 22. *Fn. Sv.* 759.
 Habitat in Europae floribus frequens in Caltha palustri.
- cruciata.* 36. B. coleoptris integerrimis, aureis, punctis duobus cruceque postica nigris.
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
 Corpus parvum. Caput aureum, splendens, canaliculatum, antennis nigris. Thorax aureus, nitens, immaculatus. Coleoptera integra, antice punctis duobus et postice cruce lata nigris. Corpus subtus viridi - aureum.
- biflriata.* 37. B. elytris integris, obscuris, thorace aureo, striis duabus nigris.
 Cucuius aeneus, elytris fuscis, thorace rubro, fasciis fuscis. *Geoff. Ins.* I. 127. 4.
 Habitat Lutetiis Parisiorum. *D. Mallet.*

Affinis

Affinis videtur B. festivae. Caput aureum, oculis nigris. Elytra integra, obscura, parum cupro-nitentia, striata. Thorax rufo-aureus, striis duabus latis, nigris.

38. B. elytris integerrimis, transverse rugosis, thorace subtrilobo, laevi, corpore ovato, nigro. *Linn.* *Syst. Nat.* II. 663. 24. *Fn. Sv.* 760.

Cucuius fuscо-cupreus, triangularis, fasciis undulatis, villoso-albidis. *Geoff. Inf.* I. 128. 6.

Habitat in Europa, saepius capta in coryli foliis.

39. B. elytris integerrimis, linearibus, punctatis, corpore viridi, elongato. *Linn. Syst. Nat.* II. 663. 25. *Fn. Sv.* 762.

Habitat in Europae betula alba.

40. B. elytris integerrimis, linearibus, corpore elongato, atro. *Linn. Syst. Nat.* II. 663. 26.

Habitat in Germania.

Simillima B. viridi, ut vix distinguitur nisi colore.

41. B. elytris integerrimis, maculis sex coeruleis, corpore viridissimo, elongato. *Linn. Syst. Nat.* II. 663. 27.

Habitat in Africa.

Statura praecedentis. Thorax punctis duobus, elytra sex coeruleis.

42. B. elytris integris, linearibus, viridibus, capite thoraceque aureis. *laeta.*

Habitat Halae. *Schaller.*

Corpus lineare, magnitudine et statura B. viridis.

Caput et thorax rubra, aurea, nitida. Elytra viridia, integerrima, sutura aurea. Pedes rufescentes.

43. B. elytris integerrimis, rugosis, corpore cyaneo. *cyanea.*

Habitat Halae. *Schaller.*

Statura et magnitudo B. viridis. Corpus totum cyanum, nitidum, oculis testaceis.

44. B. elytris integerrimis, nigris, maculis tribus flavis. *9 maculata.*

Buprestis 9 maculata elytris integerrimis, maculis tribus longitudinalibus, fronte thoracisque lateribus luteis. *Linn. Syst. Nat.* II. 662. 17?

Habi-

Habitat in - - - - *Mauduit.*

Videtur B. 9 maculata *Linnæi*, quamvis caput et thorax nigra, immaculata. Macula interior elytrorum parva, reliquæ duae majores transversales. Variat capite thoraceque maculatis.

62. CICINDELA. *Palpi sex filiformes: postici pilosi.*

Labium corneum, tridentatum.

Antennæ setaceæ.

campestris. 1. *C. viridis*, punctis quinque albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 657. 1. *Fn. Sv.* 746. *Scop. carn.* 181.

Buprestis inauratus, supra viridis, coleoptris punctis duodecim albis. *Geoff. Inf.* I. 153. 27.

Cantharis quarta. *Mouff. Inf.* 145. fig. infim.

Scarabaeus viridis, cui decem maculae albae supra alarum thecas. *Lift. Sc. Angl.* 386. 17.

Cantharis Mouffeti minor, quarta. *Ionst. Inf.* tab. 15. *Schaeff. Icon.* tab. 34. fig. 8. 9.

Habitat in Europæ campis arenosis.

Larva mollis, alba, capite pedibusque sex ferrugineis, foveam magnitudine corporis in terra excavat, in qua latens insecta arripit. *Geoff.* Larvas etiam hirsutas venatur. *Raj.*

hybrida. 2. *C. subpurpurascens*, elytris fascia lunulisque duabus albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 657. 2. *Fn. Sv.* 747. *Scop. carn.* 183.

Schaeff. E'm. tab. 43.

— — *Icon.* tab. 35. fig. 10.

Habitat in Europæ fabulosis.

sylvestris. 3. *C. nigra*, elytris fascia undata punctisque duobus albis. *Linn. Syst. Nat.* II. 658. 8. *Fn. Sv.* 748.

Buprestis inauratus, supra fusco-viridis, coleoptris fasciis sex undulatis, albis. *Geoff. Inf.* I. 155. 28.

Habitat in Europæ pinetis.

4. C. elytris fuscis puncto baseos, fasciis tribus interrup-
tis lineolaque apicis flavis. *interrup-*
tra.

Habitat in Sierra Leon. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo C. campestris. Caput fuscum, antennis maxillisque porrectis, nigris. Oculi magni, testacei. Thorax rotundatus, fuscus, immaculatus. Elytra laevia, fusca, nitidula, puncto baseos flavo. Fascia prima consistit e lunula puncto que ad suturam, secunda e striga puncto que ad suturam et tertia denique e maculis duabus parvis. Lineola parva ad apicem. Subtus aenea, nitida.

5. C. subaetnea, elytris albis, linea fusca triramosa. *capensis.*
Linn. Syst. Nat. II. 657. 3. Mus. Lud. Ulr. 84.

Habitat ad Caput B. Sp.

6. C. cuprea, elytris viridibus, puncto lunulaque apicum albis. *Linn. Syst. Nat. II. 657. 4. Scopoli ca.*
Carn. 182.

Buprestis inauratus, supra fusco-viridis, coleoptris punctis sex albis. *Geoff. Ins. I. 155. 29.*

Cicindela obscurior viridis, elytris punctis 4. lineolaque alba. *Schreb. Ins. 10. 5.*

Habitat in Germaniae arenosis.

7. C. thorace fusco, bituberculato, elytris fusco viridi-
que variis: margine tridentato, albo. *tuberu-*
lata.

Habitat in nova Zelandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo C. capensis. Caput fuscum, labio albido.
Thorax fuscus, tuberculis duabus magnis, obtusis,
dorsalibus. Elytra fusca, punctis atomisque viridi-
bus impressis variegata. Margo lunulis tribus con-
catenatis, albis, quarum media in medio strigam
exserit, quae tamen suturam haud attingit. Sub-
tus aenea.

8. C. subpurpurea, labio elytrisque puncto albo. *unipun-*
ctata.

Habitat in America. *D. Drury.*

Statura et summa affinitas C. hybridae. Labium rotun-
datum, sinuatum, album. Corpus purpurascens,
elytris puncto unico laterali, albo. Subtus vi-
rescens.

Sex punctata. 9. C. viridi-aenea, elytrorum disco obscuriore, punctis tribus albis.

Habitat ad littora Malebarica. Drury.

Statura et magnitudo C. campestris. Caput viridinens, vertice obscuriore. Thorax supra fuscus, lateribus, viridi pectore, coeruleo-nitidis. Elytra obliqua, disco fusco, punctis tribus albis. Abdomen et pedes viridia.

Sex guttata. 10. C. viridis, nitida, elytris punctis tribus marginalibus, albis.

Habitat in Virginia.

Corpus viride, nitidissimum. Antennarum apex fuscus. Labium superius flavum.

Catena. 11. C. viridi-aenea, elytris albidis, punctis sex viridibus, concatenatis.

Habitat in India orientali. Koenig.

Statura et magnitudo C. germanicae. Caput mihi deest. Thorax rotundatus, obscurus, subtus aeneus, tomento albo tectus. Elytra albida, punctis tribus in medio et tribus ad futuram, omnibus concatenatis et inter se et cum futura. Abdomen aeneum, lateribus lana albissima. Pedes aenei.

marginalta. 12. C. viridis, elytris margine fascia undata punctisque duobus albis.

Habitat in Virginia.

Corpus statura C. campestris, viride. Labium flavum. Margo elytrorum albus, qui dentes quatuor ad fasciam valde undatam et flexuosam exserit. Puncta adhuc duo alba ad basin.

carolina. 13. C. viridis, nitida, elytrorum apicibus, ore, antennis pedibusque flavis. Linn. Syst. Nat. II. 657. 6.

Habitat in Carolina.

aequinoctialis. 14. C. flava, elytris fasciis duabus nigris, latis. Linn. Syst. Nat. II. 658. 7. Amoen. acad. 6. 395. 22.

Habitat Surinami.

maura. 15. C. nigra, elytris punctis sex albis, tertio et quarto parallelo. Linn. Syst. Nat. II. 658. 9.

Habitat in Oriente.

63. ELAPHRVS. *Palpi sex filiformes.*
Labium rotundatum, acuminatum, integrum.
Antennae setaceae.

1. E. viridi-aeneus, elytris punctis latis, excavatis. *riparius.*

Cicindela riparia. *Linn. Syst. Nat. II. 658. 10. Fn.*
Sv. 749.

Buprestis viridi-aeneus, elytris punctis latis, excavatis, mammilosis. *Geoff. Inf. I. 156. 30.*

Scarabaeus parvus, inauratus. *Lift. loqu. 385.*
Schaeff. Icon. tab. 86. fig. 4.

Habitat in Europae humentibus.

Colore saepius variat.

2. E. obscure aeneus, elytris subnebulosis, pedibus luteis. *flavipes.*

Cicindela flavipes. *Linn. Syst. Nat. II. 658. 11. Fn.*
Sv. 750.

Habitat in Europa ad littora riparum.

3. E. nigra, coleoptris punctis duobus fasciaque ferrugineis. *rupestris.*

Linn. Syst. Nat. II. 658. 12.

Habitat in Sueciae rupibus.

4. E. aeneus, nitidus, capite striato.

Cicindela aquatica. *Linn. Syst. Nat. II. 658. 14. Fn.*
Sv. 752.

Buprestis fusco-aeneus, capite profunde striato, elytrorum stria prima remotissima. *Geoff. Inf. I. 157. 31.*

Cicindela pusilla. *Schreb. Inf. 6.*

Lift. mut. tab. 31. fig. 13.

Habitat ad Europae aquas.

5. E. aeneus, nitidus, elytris punctatis, dorso glaberrimo. *semipun.*

Habitat Halae Saxonum. *Schaller.*

Statura et summa affinitas E. aquatae. Corpus totum aeneum, nitidum. Elytra striato-punctata, in medio ad futuram quasi polita, glaberrima. Pedes nigri.

64. HYDROPHILVS. *Palpi filiformes.**Maxilla bifida.**Labium corneum, sub-*
*emarginatum.**Antennae clava perfo-*
liata.

- piceus.* 1. *H. niger*, sterno canaliculato, postice spinoso.
Hydrophilus niger, elytris sulcatis, antennis fuscis.
Geoff. Inf. 1. 182. 1. tab. 3. fig. 1.
Dytiscus piceus antennis perfoliatis, corpore laevi,
sterno carinato, postice spinoso. *Linn. Syst. Nat.* II.
664. 1. *Fn. Sv.* 764.
Lyonet. Leff. tab. 1. fig. 15. 16. 17.
Frisch. Germ. 2. tab. 6.
Schaeff. Icon. tab. 33. fig. 1. 2.
Habitat in Europae aquis: piscibus infestus.
- caraboi-*
des. 2. *H. niger*, nitidus, elytris substriatis.
Hydrophilus niger, elytrorum punctis per strias di-
gestis, antennis nigris. *Geoff. Inf.* 1. 183. 2.
Dytiscus caraboides antennis perfoliatis, corpore gla-
bro, striis aliquot recurvis. *Linn. Syst. Nat.* II.
664. 2. *Fn. Sv.* 765.
Hydrocantharis aquaticus, niger, subrotundus. *Raj.*
Inf. 95. 7. *Roef.* 2. *aqu.* 1. tab. 4. fig. 1. 2.
Frisch. Inf. 13. p. 24. tab. 21.
Sultz. Inf. tab. 6. fig. 41.
Habitat in Europae aquis.
- lateralis.* 3. *H. niger*, nitidus, thoracis elytrorumque margini-
bus flavis.
Habitat in America. *Mus. Tottianum.*
Statura *H. caraboidis*, at duplo minor. Totus ater,
laevis, nitidus, solo margine flavo. Subtus niger,
sterno postice porrecto, acutissimo, puncto medio
flavo. Pedes ferruginei.
- scarabae-*
oides. 4. *H. niger*, elytris striatis, pedibus piceis.
Scarabaeus aquaticus muticus, piceus, elytris striatis,
antennis flavescentibus, filiformibus. *Linn. Syst. Nat.*
Edit. X. n. 56.

Scara-

Scarabaeus piceus. *Geoff. Inf.* I. 85.

Dytiscus scarabaeoides ovalis, convexus, ater, laevissimus, antennis filiformibus, triarticulatis. *Linn.*

Syst. Nat. II. 664. 212. 3.

Habitat in Europae aquis.

H. caraboidi duplo minor. Antennae omnino perfoliatae, at palpi prominentes, triarticulati, filiformes.

5. *H. subrotundus, corpore glabro, atro.*

orbicularis.

Habitat in aquosis Germaniae.

Statura fere *H. scarabaeoidis*, at minor, et fere orbiculatus. Totus laevissimus, nitens.

6. *H. niger, ore, thoracis lateribus lineisque elytrorum collaris ferrugineis.*

Habitat in America. *Mus. Tottianum.*

Statura gibba, elevata, *H. luridi*. Corpus atrum, nitidum. Os lateraque thoracis ferruginea. Elytra nigra, margine lineisque aliquot abbreviatis, ferrugineis. Antennae perfoliatae et pedes fusci.

7. *H. elytris striatis, corpore cinereo, fusco.*

luridus.

Dytiscus luridus antennis perfoliatis, luridis, elytris punctis tribus fuscescentibus, thorace lateribus flavicante. *Linn. Syst. Nat.* II. 665. 5. *Fn. Sv.* 767.

Habitat in Europae aquis.

8. *H. ovatus, niger, elytris, pedibus, thoracisque lateribus griseis, minutus.*

Chrysomela minuta. *Linn. Syst. Nat.* II. 593. 50.

Fn. Sv. 533.

Scarabaeus totus rufo-niger, maculis nigrioribus.

Geoff. Inf. I. 85. 27?

Habitat in Europae aquis.

9. *H. thorace atro, margine griseo, elytris fuscis, puncto bipunctatus postico albido.*

Habitat in aquis Upsaliae.

Parva. Statura omnino hujus generis. Caput atrum, puncto utrinque marginali griseo. Thorax ater, nitidus, margine griseo. Elytra fusca, margine pallidiori et puncto distincto griseo versus apicem.

65. DYTISCVS. *Palpi sex filiformes.*
Labium corneum, truncatum, integrum.
Antennae setaceae.

latissimus. 1. *D. niger*, elytrorum marginibus dilatatis, linea flava.
Linn. Syst. Nat. II. 665. 6. Fn. Sv. 768.

Scarabaeus aquaticus, magnus, niger, margine luteo.
Frisch. Inf. 2. tab. 7. fig. I. 2.
Habitat in Europae aquis.

costalis. 2. *D. niger*, capitis fascia, thoracis margine, elytrorumque stria costali ferruginea.

Habitat Surinami. D. Yeats.

Statura et magnitudo D. marginalis. Caput nigrum, fascia supra os puncto utrinque impressa, ferruginea. Thorax niger, glaber, margine ferrugineo. Elytra glabra, striis tribus punctatis remotis, nigra, stria costali ferruginea.

marginalis. 3. *D. niger*, thoracis marginibus omnibus, elytrorumque exteriori flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 665. 7. Fn. Sv. 769. Geoff. Inf. I. 186. 2.*

Hydrocantharis nostras. Raj. Inf. 93. I.

Hydrocantharis. Monff. Inf. 164.

Koeff. Inf. 2. aquat. 2. p. 7. tab. I. fig. 9. 10.

Lift. mut. tab. 5. fig. 2.

Sultz. Inf. tab. 6. fig. 42.

Schaeff. Elem. tab. 7. fig. I.

Habitat in Europae aquis.

Agilis in dorso incubans saltu se restituit. Si diu inficco detineantur, aegre se immergunt. Ova oblonga, magna, alba.

limbatus. 4. *D. niger*, thoracis elytrorumque margine exteriori flavo.

Habitat in China. Mus. Dom. Banks.

Statura et summa affinitas praecedentis, a quo tamen specie differre videtur. Thoracis margo posticus et anticus haud flavi. Elytra absque striis punctatis, margine flavo, apicem haud attingente. Sternum postice

postice abbreviatum, in praecedenti porrectum, emarginatum, subspinosum. Pedes nigri, femoribus anticis flavis.

5. D. fuscus, elytris sulcis dimidiatis decem. *Linn. Syst. Nat. II. 665. 8. Fn. Sv. 772. Geoff. Inf. II. 187. 3.* *semistriatus.*

Hydrocanthus elytris striatis five canaliculatis.

Raj. Inf. 94. 2.

Frisch. Inf. 2. tab. 7. fig. 4.

Roef. Inf. 2. aquat. I. tab. I. fig. 10.

Braull. nat. tab. 26. fig. 2.

Habitat in Europae aquis.

An foemina D. marginalis?

6. D. elytris sulcis decem longitudinalibus, villofis. *fulcatus.*

Linn. Syst. Nat. II. 666. 13. Fn. Sv. 773.

Geoff. Inf. I. 189. 5.

Hydrocanthus minor, corpore rotundo, plano.

Raj. Inf. 94. 3 et 10.

Frisch. Inf. 13. p. 13. tab. 7.

Roef. Inf. 2. aquat. I. tab. 3. fig. 7.

Bradl. nat. tab. 26. fig. 2. A.

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 3.

Habitat in Europae, - Americae aquis.

Maris elytra glabra.

7. D. fuscus, elytris transversim subtilissime striatis. *striatus.*

Linn. Syst. Nat. II. 665. 9. Fn. Sv. 770.

Habitat in Europae aquis.

8. D. niger, ore verticis punctis duobus thoracisque *Lanio.*

marginibus rufis, elytris fuscis.

Habitat in Maderae aquis. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo D. striati. Caput nigrum, ore punctisque duobus inter oculos rufis. Thorax niger, margine rufescente. Elytra fusca, lineis duabus punctorum impressorum.

9. D. cinereus, elytrorum margine thoracisque medie-

tate flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 666. 11. Fn. Sv. 771.* *cineraceus.*

Geoff. Inf. I. 188. 4.

Hoeffnag. Inf. 2. tab. 12.

Roef. Inf. 2. aqu. I. tab. 3. fig. 6.

Lift. mut. tab. 5. fig. 1.

Petiv. Gazoph. tab. 70. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 7.

Habitat in Europae aquis.

sticticus. 10. D. pallens, elytris griseis, puncto oblongo laterali nigro, impresso. *Linn. Syst. Nat.* II. 666. 12.

Habitat in Africa,

Magnitudo D. cinerei. Lineae duae elytrorum e punctis fuscis, vix conspicuae.

10 puncta. 11. D. ater, glaber, elytris punctis albis quinque. *tus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo D. erythrocephali. Antennae breves, ferrugineae. Caput atrum, fronte pallescente. Thorax ater, glaber, macula utrinque marginali pallida. Elytra atra, glaberrima, punctis quinque albis 2. 2. 1. Pedes fuscii,

bipustula- 12. D. ater, laevis, capite postice punctis duobus, rubris. *tus.*

Linn. Syst. Nat. II. 667. 17.

Habitat in Europa boreali.

cinctus. 13. D. capite thoraceque flavis, elytris nigris, margine omni albo.

Habitat in America. *D. Mauduit.*

D. cinereo minor. Caput et thorax flava, immaculata. Elytra nigra, margine et sutura albis.

Herrman- 14. D. gibbus, elytris fascia undata baseos ferruginea. *ni.*

Habitat in aquis stagnantibus Alsatiae. *Prof. Herrmann.*

Statura D. erythrocephali. Caput obscure ferrugineum. Thorax niger, marginibus ferrugineis. Elytra laevia, nigra, fascia lata undata baseos ferruginea, quae ad marginem exteriorem paulo ulteriori extenditur. Punctum parvum, versus apicem ferrugineum.

uliginosus. 15. D. ater, nitidus, antennis, pedibus elytrorumque latere exteriore ferrugineis. *Linn. Syst. Nat.* II. 667. 20. *Fn. Sc.* 776.

Habitat in Europae aquis.

16. D. testaceus, nigro - irroratus, capite pectore - *irroratus*.
que nigris.

Habitat in America.

Statura et magnitudo D. cinerei. Caput nigrum, ore
testaceo. Thorax glaber, laevis, nitens, testaceus,
punctis duobus dorsalibus nigris. Pectus nigrum.
Abdomen et pedes testacei.

17. D. niger, thorace nigro, fascia pallida, elytris albo
nigroque variis. *Linn. Syst. Nat.* II. 666. 15. *Fn. Sv.* 777. *macula-*
tus.

Uddm. Diff. 43.

Habitat in Europae aquis.

18. D. ovato - oblongus, capite pedibusque rufis. *Linn. erythroce-*
Syst. Nat. II. 660. 14. *Fn. Sv.* 774. *phalus.*

Habitat in Europae aquis.

19. D. thorace rufo, elytris cinereo nigroque striatis. *varius.*

Habitat in Patagoniae aquis. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo D. pallustris. Caput nigrum, ore anten-
nisque rufis. Thorax glaber, laevis, rufus. Ely-
tra striis numerosissimis approximatis, nigris cine-
reisque variegata. Sutura nigra, margo exterior
cinereus. Subtus piceus, pedibus ferrugineis.

20. D. thorace ferrugineo, punctis duobus baseos nigris, *depressus*.
elytris fuscis, ferrugineo - maculatis.

Habitat in Sueciae aquis.

Corpus parvum, depresso. Caput ferrugineum,
oculis nigris. Thorax ferrugineus, margine an-
tico, maculisque duabus baseos nigris. Elytra
fusca, maculis tribus marginis et quibusdam disci
ferrugineis.

21. D. laevis, elytris lituris duabus lateralibus, albis. *pallidus.*
Linn. Syst. Nat. II. 667. 19. *Fn. Sv.* 775.

Habitat in Europae aquis.

Thorax ferrugineus.

22. D. ovatus, fuscus, capite thoraceque ferrugineis. *ovatus.*
Linn. Syst. Nat. II. 667. 18. *Fn. Sv.* 2282.

Habitat in Europae aquis.

Caput et thorax picea, aut minus nigra. Subtus
ferrugineus.

- signatus.* 23. D. niger, capite thoraceque rufis, signaturis nigris.
Habitat in aquis Patagoniae. *Mus. Dom. Banks.*
Affinis D. ovato. Caput rufum, fascia in medio inter oculos nigra. Thorax laevis, rufus, lineola transversali nigra, margines haud attingente. Elytra nigra, margine subrufescente. Pedes ferruginei.
- granula-* 24. D. niger, elytris lineis duabus flavescentibus, pedibus rufis. *Linn. Syst. Nat. II. 667. 22.*
Habitat in Europa boreali.
- lineatus.* 25. D. ferrugineus, coleoptris fuscis, lineis quatuor flavescentibus.
Habitat in aquis stagnantibus Alsatiae. *D. Prof. Herrmann.*
Caput ferrugineum, basi parum nigricans. Thorax laevis, ferrugineus. Coleoptera fusco cinereoque mixta (vel cinerea *Linnæi*) margine pallidiore. Per medium dorsi lineae quatuor distinctae, albitantes.
- minutus.* 26. D. flavesiens, elytris fuscis, margine flavo, maculato. *Dytiscus minutus elytris fuscis, basi lateribusque pallidis, thorace flavo, immaculato, corpore ovato.* *Linn. Syst. Nat. II. 667. 23. Fn. Sv. 778.*
Habitat in Europa aquofis.

66. GYRINVS. *Palpi filiformes.**Maxilla cornea, unidentata, acutissima.**Labium emarginatum.**Antennae cylindricæ.*

- natator.* 1. G. substriatus. *Geoff. Inf. I. 194. tab. 3. fig. 3. †. Linn. Syst. Nat. II. 567. I. Fn. Sv. 779.*
Scarabaeus aquaticus, subrotundus, e coeruleo-viridi colore splendente undique tinctus. *Raj. Inf. 87. 10.*
Dytiscus natator. Scopoli Ent. 299.
Scarabaeus niger, nostras, supra aquam velociter circumnatans. *Petiv. Gazop. 21. tab. 13. fig. 9.*

Pulex

Pulex aquaticus. *Mervet. pin.* 203.

Roef. Inf. 3. p. 195. tab. 31.

Sultz. Inf. tab. 6. fig. 43.

Schaeff. Elem. tab. 57.

Habitat in Europae lacubus.

Velocissime supra aquam per orbēs currit, dum
vero urinatur, bullam aeream hydrargyri coloris
secum trahit.

2. *G. virescens*, substriatus, elytris abbreviatis, uni-dentatis. *australis.*

Habitat in novae Hollandiae aquis. *Muf. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo omnino praecedentis. Supra
virescens, obscure nitens. Elytra substriata, ab-
domine breviora, truncata, dente unico lateralī
armata. Subtus corpus atrum, pedibus quatuor
posticis ferrugineis.

3. *G. ater*, laevis, opacus. *Linn. Syst. Nat.* II. 568. 2. *americanus.*

Habitat in America. *Muf. Tottianum.*

Affinis praecedenti, at paulo major, et multo ob-
scurior.

67. CARABVS. *Palpi sex*, articulo ulti-
mo obtuso.

Labium integrum, trun-
catum.

Antennae filiformes.

* *Majores.*

1. *C. apterus*, ater, violaceo-nitens, elytris punctis *coriaceus.*
intricatis, subrugosis. *Linn. Syst. Nat.* II. 668. I.
Scop. carn. 265.

Buprestis ater, elytris rugosis. *Geoff. Inf.* I. 141. I.

Sultz. Inf. tab. 6. tab. 44.

Schaeff. Icon. tab. 36. fig. 1.

Habitat in Germania.

Affinis *C. violaceo.*

2. *C.*

violaceus. 2. *C. alatus, niger, thoracis elytrorumque marginibus violaceis.*

Carabus violaceus alatus, elytris laeviusculis, nigris, margine aureo, thorace subviolaceo. *Linn. Syst. Nat. II. 669. 8. Fn. Sv. 787.*

Scarabaeus major, e purpuro nigricans. *Raj. Inf. 96. I. Scarabaeus maximus, ex viola nigricans.* *Lift. Scar. Angl. 389. 22.*

Scarabaeus terrestris, nigricans. *Frisch. Inf. 13. tab. 23.*

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 1. et tab. 88. fig. 1.

Habitat in Europae sylvis.

10 gutta. 3. *C. apterus, thorace angustato, ater, coleoptris novem sulcatis punctisque decem albis.* *Linn. Syst. Nat. II. 669. 10. Mus. Lud. Ulr. 96.*

Habitat in Africa.

Maximus in hoc genere.

6 gutta. 4. *C. apterus, thorace postice angustato, elytris laevibus, atris, punctis duobus griseis.*

Habitat in Suratte Indiae. *Mus. Dom. Banks.*

Magnus in hoc genere. Caput magnum, atrum, clypeo quadrato, integro. Maxillae corneae, porrectae, arcuatae, acutiae. Antennae nigrae. Oculi testacei. Thorax obcordatus, postice attenuatus, niger, utrinque puncto magno griseo, piloso. Elytra connata, laevissima, atra, punctis duobus magnis pilosis, griseis. Pedes atri.

quadriguttatus. 5. *C. apterus, thorace postice attenuato, elytris sulcatis, atris: maculis duabus griseis remotis.*

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo C. 10 guttati. Antennae articulis undecim, filiformes. Caput magnum, atrum, fronte sulcis duobus impressa. Oculi testacei. Thorax canaliculatus, submarginatus, postice valde attenuatus, niger, tuberculis duabus magnis dorsalibus, piceis, et puncto parvo griseo utrinque ad marginem anticum. Elytra connata, sulcata, lineis elevatis carinatis, atra, maculis duabus parvis, griseis, altera ad basin, altera ad apicem. Corpus subtus atrum, ab domine basi utrinque impresso.

6. C.

6. C. apterus, thorace postice angustato, ater, elytris *tabidus*.
rugoso-fuscatis.

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at triplo minor. Antennae filiformes, nigrae, articulis undecim. Caput magnum, atrum, fronte utrinque sulcato. Thorax cordatus, postice angustatus, lineisque duabus dorsalibus elevatis, quae tamen marginem anticum haud attingunt. Elytra connata, sulcata sulcis rugosis, atra, immaculata, postice ad suturam subacuminata. Corpus atrum.

7. C. apterus, niger, elytris laevibus, punctis aeneis, *hortensis*.
excavatis, triplici serie. *Linn. Syst. Nat.* II. 668. 3.

Fn. Sv. 783.

Stroem. Act. Nidros. 3. p. 401. tab. 6. fig. 7.

Cerambyx purpurea, punctata. *Raj. Inf.* 96. 2. *List.*
mut. tab. 8. fig. 4.

Habitat in Europae hortis et sylvis.

8. C. apterus, niger, elytris crenato-striatis, punctisque *calidus*.
aureis, excavatis, triplici serie.

Habitat in America. *D. v. Robr.*

Affinis C. hortensi, at elytra haud laevia, sed inter strias punctorum aureorum striae tres elevatae, crenatae. Antennae apice rufescentes.

9. C. apterus, elytris striatis, virescentibus, punctis *retusus*.
aeneis, excavatis, triplici serie, basi retusis.

Habitat ad littora Patagoniae. *Mus. Dom. Banks.*

Summa affinitas C. hortensis. Antennae filiformes, fuscae; basi atrae. Caput virescens, ore atro. Thorax cordatus, viridis, basi utrinque impressus. Elytra crenato-striata, viridia, punctis aeneis, excavatis, triplici serie: basis elytrorum retusa. Corpus atrum.

10. C. apterus, ater, elytris basi retusis. *Maderae.*

Habitat in Madera. *Mus. Dom. Banks.*

Summa affinitas et magnitudo praecedentis. Antennae filiformes, nigrae, apice fuscae. Thorax cordatus, basi utrinque impressus. Elytra vix striata, punctisque triplici serie viridibus minutissimis, impressa. Basis elytrorum retusa. Pedes nigri.

- convexus.* 11. C. apterus, ater, convexus, laevis, thorace postice emarginato.
Habitat in Germania.
Corpus C. violaceo duplo minus, totum atrum, laeve.
- auratus.* 12. C. apterus, elytris porcatis, laevibus, auratis, antennis pedibusque rufis.
Carabus auratus apterus, elytris porcatis: striis sulcis que laevibus, inauratis. *Linn. Syst. Nat.* II. 669. 7. *Fn. Sv.* 786.
Buprestis viridis, elytris obtuse sulcatis, non punctatis, pedibus antennisque ferrugineis. *Geoff. Inf.* I. 142. 2. tab. 2. fig. 5.
Cerambyx dorso in longas regulas diviso; omnium pulcherrimus. *Raj. Inf.* 96. 6.
Schaeff. Icon. tab. 51. fig. 1.
Habitat in locis suffocatis, sylvis.
- futuralis.* 13. C. apterus, elytris striatis, viridibus, sutura aurea.
Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*
Statura C. aurati. Antennae fuscae, basi ferrugineae.
Caput viride, laeve, nitens, ore fuscō. Thorax cordatus, viridis, margine aureo. Elytra substriata, viridia, striis tribus fere obsoletis punctorum convexorum ferrugineorum. Sutura aurea, nitens. Pectus virescens. Abdomen atrum. Pedes ferruginei, plantis nigris.
- granulatus.* 14. C. apterus, nigricans, elytris aeneis, striatis, interjectis punctis elevatis, longitudinalibus.
Carabus granulatus apterus, elytris longitudinaliter convexe punctatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 668. 2. *Fn. Sv.* 780.
Habitat in Europa.
Nimis affinis C. clatrato, at elytra haud porcata five lineis tribus elevatis, sed striis plurimis exarata. Thorax postice emarginatus.
- clatratus.* 15. C. apterus, nigricans, elytris aeneis porcatis, interjectis punctis excavatis longitudinalibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 669. 5. *Fn. Sv.* 782.
Habitat in Europa.
Thorax obscure aeneus.

16. *C. apterus*, ater, elytris striatis, apice granulatis. *porcatus.*
Habitat in nova Hollandia. Mus. Dom. Banks.
Medius. Antennae filiformes, nigrae. Thorax marginatus marginibus rotundatis, ater, immaculatus. Elytra nigra, striata, striis ad marginem exteriorem apicemque granulis elevatis, oblongis, interruptis. Corpus atrum, nitidum.
17. *C. apterus*, elytris porcatis, scabris, viridibus, margine aureo. *nitens.*
Carabus nitens apterus, elytris porcatis: striis paucis interruptis sulcisque scabriusculis inauratis. Linn. Syst. Nat. 11. 669. 6. Fn. Sv. 185.
Carabus nitens. Scop. carn. 262.
Habitat in Europae sylvis.
18. *C. alatus*, elytris striatis, viridi-aeneis: punctis triplici ordine. *Inquisitor.*
Habitat in Europa.
Thorax lateribus rotundatus, postice integer.
Variat rarius elytris totis nigris.
19. *C. alatus*, elytris striatis, viridibus, punctis triplici serie, thorace cyaneo: margine reflexo, inaurato. *Scrutator.*
Habitat in Virginia. Mus. Dom. Banks.
Simillimus praecedenti. Thorax violaceus, margine rotundato, subreflexo, aureo. Elytrorum margo aureus. Abdomen viride, aureo-maculatum.
Variat interdum abdomine toto violaceo.
20. *C. alatus*, violaceo-nitens, elytris aureis, striatis. *sycophanta.*
Carabus sycophanta aureo-nitens, thorace coeruleo, elytris aureo-viridibus, striatis, abdomine subatro. Linn. Syst. Nat. 11. 670. 12. Mus. L. U. 95. Fn. Sv. 790.
Buprestis nigro-violaceus, elytris latis, aeneis, e viridi purpureis, singulo striis sexdecim. Geoff. Inf. 1. 144. 5.
Reaum. Inf. 2. tab. 37. fig. 18.
Rob. Icon. tab. 20. fig. 2.
Schaeff. Elem. tab. 2. fig. 1.
— — Icon. tab. 66. fig. 6.
Habitat in Europa.
Striae elytrorum crenatae.
Larva nigra vicitat larvis Phalenaæ processioneæ aliarumque.

rostratus. 21. C. apterus, elytris laevibus, nigris, thorace angustiori, capite angustissimo.

Tenebrio rostratus apterus, niger, elytris laeviusculis, uniangulatis, thorace angustiore, capite angustissimo. *Linn. Syst. Nat. II. 577. 20. Fn. Sv. 823.*

Habitat in Europa.

Elytra deflexa, uti in Tenebrionibus.

cephalotes. 22. C. apterus, ater, laevissimus, thorace orbiculato, convexo.

Carabus cephalotes apterus, elytris atris, laevibus, thorace exerto, oblongo. *Linn. Syst. Nat. II. 669. 9. Fn. Sv. 188.*

Scarabaens. *Frisch. Inf. 13. p. 25. tab. 22.*

β. Tenebrio gibbus apterus, laevis, thorace orbiculato, convexo, antice truncato. *Linn. Syst. Nat. II. 676. 18. Fn. Sv. 824.*

Habitat in Europa.

Affinis Scarites.

leucophtal- 23. C. apterus, ater, elytris striatis.
mus.

Carabus leucophtalmus elytris laevibus, striis obsoletis octo. *Linn. Syst. Nat. II. 668. 4. Fn. Sv. 784.*

Buprestis ater, elytro singulo striis octo laevibus, pedibus nigris. *Geoff. Inf. I. 146. 7.*

Scarabaeus ex toto niger. *Lift. Scar. Angl. 390. 23.*

Habitat in Europae quisquiliis.

* * Minores.

striatus. 24. C. niger, thoracis basi utrinque puncto impresso, elytris striatis, medio glabris.

Habitat in Patagoniae littoribus. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo C. leucophtalmi. Caput atrum, nitidum, lineola parva utrinque supra os impressum. Thorax cordatus, postice attenuatus, puncto utrinque impresso. Elytra striata striis mediis sensim abbreviatis, unde discus elytrorum glaber.

caligino- 25. C. ater, thorace quadrato, laevi, antennis piceis.
sus.

Habitat in America. *Dom. Lewin.*

Major C. leucophtalmo. Corpus atrum, antennis piceis. Thorax quadratus, planus. Elytra striata. Femora linea punctorum impressorum exarata. Digi

26. C.

26. *C. pallidus*, clytris maculis duabus dorsalibus atris. *arenarius.*
Habitat in arena mobili Cambriae. Dom. Banks.
Statura omnino C. caliginosi. Maxillae exsertae, pal-
lidae, apice nigrae. Caput pallidum, oculis testa-
cis. Thorax obcordatus, antice posticeque triun-
catus, pallidus, immaculatus. Elytra striata, pal-
lida, maculis duabus communibus angulatis, atris.
Pedes pallidi.
27. *C. ater*, clytris sulcatis, laevibus, antennis pedibus-
que rufis. *ruficornis.*
Buprestis niger, elytro singulo striis octo laevibus,
pedibus ferrugineis. Geoff. Inf. I. 146. 8.
Scarabaeus niger, pedibus corniculisque croceis. Lister.
Scar. Angl. 390. 24.
Frequens in sylvis Europae.
Similis C. leucophtalmo, at paulo minor. Elytra
interdum colore fugaci-aureo nitent.
28. *C. supra niger*, subtus ferrugineus. *bicolor.*
Habitat in America. Dom. Lewin.
Statura et summa affinitas C. ruficornis, at corpus to-
tum subtus cum pedibus et antennis ferrugineum.
Elytra striata.
29. *C. thorace obcordato*, antennis tibiisque piccis, *piceus.*
elytris striatis.
Habitat in Europa.
Pedes haud rufi, sed picci, femoribus nigris.
30. *C. capite thoraceque aeneis*, clytris striatis, obscu-
rioribus, femoribus rufis. femoralis.
Habitat in Sierra Leon Africæ. Mus. Dom. Banks.
Magnitudo C. ruficornis. Caput aeneum, nitidum.
Antennæ filiformes, fuscae, articulo primo rufo.
Thorax aeneus, nitidus, utrinque lineola baseos
impressus. Elytra nigra, aeneo-splendentia, striata.
Corpus atrum, femoribus rufis.
31. *C. thorace postice utrinque impresso*, niger, femo-
ribus rufis. madidus.
Habitat in Anglia: captus die VI. Maji in nemore
Richmondensi.

Statura et magnitudo C. leucophtalmi. Corpus atrum, quasi humore inunctum. Antennae apice fuscescentes. Thorax basi puncto majori utrinque excavatus. Abdomen obtusum.

Variat femoribus nigris; an distinctus?

- interrup-* 32. C. ater, thorace postice rotundato abdomineque remotis.

Habitat in Oriente. *Forskahl.*

Minor C. leucophtalmo. Corpus totum atrum. Caput latitudine thoracis. Thorax antice emarginatus, postice rotundatus, ab abdomine remotus. Elytra striata.

- complanata-* 33. C. thorace orbiculato, rufus, elytris fasciis duabus nigris.

Carabus complanatus pallidus, elytris fasciis duabus undulatis, nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 671. 17.*

Habitat in St. Domingo.

Statura et magnitudo C. crepitantis. Caput prominens cum antennis rufum. Thorax rotundatus, canaliculatus, rufus, immaculatus. Elytra striata, truncata, rufa, fasciis duabus magnis undulatis, nigris.

- america-* 34. C. niger, thorace, pedibus antennisque ferrugineis. *nus.* Carabus americanus. *Linn. Syst. Nat. II. 671. 19.*

Habitat in America.

Affinis C. crepitanti, at quadruplo major et caput nigrum.

- crepitans.* 35. C. thorace, capite pedibusque ferrugineis, elytris nigris.

Carabus crepitans. *Linn. Syst. N. II. 671. 18. Fn. Sv. 272.* Buprestis capite, thorace pedibusque rubris, elytris coeruleo-nigris. *Geoff. Ins. I. 151. 19.*

Cicindela capite, thorace pedibusque rufis, elytris nigro-coeruleis. *Roland. act. Holm. 1750. p. 292.* tab. 7. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 13.

Habitat in Europae nemoribus.

36. C. niger, capite, thoracis maculis duabus elytris-
que puncto baseos fasciaque media ferrugineis. *bimacula-*
tus.
Carabus bimaculatus niger, fascia communi flava inter-
rupta, antennis pedibusque testaceis. *Linn. Mant.* 532.
Habitat in India orientali.
Statura C. crepitantis, at paulo major. Caput cum
antennis ferrugineum, maxillis maculaque verticis
nigris. Thorax oblongus, niger, macula utrinque
magna ferruginea. Elytra striata, postice
truncata, puncto parvo baseos et fascia lata in me-
dio ferrugineis, quae tamen fascia futuram haud
attingit. Apex elytrorum parum ferrugineus.
Pedes ferruginei.
37. C. thorace orbiculato, cyaneus, ore, antennis tibiis-
que rufis. *spinibar-*
bis.
Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*
Statura C. cuprei. Differt ab hoc genere maxilla su-
periori basi dilatata, et inferiori dorso spinis ciliato.
Caput prominens, ore antennisque rufis.
38. C. thorace rotundato, elytris striatis punctisque im-
pressis, antennis pilosis. *pilicornis.*
Habitat in Anglia. *Muf. Dom. Banks.*
Statura praecedentis. Antennae pilis longioribus hir-
tae, ferruginae; primo articulo aeneo. Thorax
rotundatus, aeneus, postice utrinque impressus.
Elytra aenea, striata, punctisque tribus impressis.
Pedes rufi, femoribus nigris.
Variat colore nigro et aeneo.
39. C. nigro-coerulescens, elytris striatis. *coerule-*
scens.
Carabus coerulescens nigro-coeruleus, antennis basi
rubris. *Linn. Syst. Nat.* II. 672. 28. *Fn. Sv.* 800.
Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 3. 4.
Habitat in Europa.
Affinis C. vulgari.
40. C. cupreus, antennis basi rubris. *cupreus.*
Carabus cupreus. *Linn. Syst. Nat.* II. 672. 29. *Fn. Sv.* 801.
Buprestis totus viridi-cupreus, antennis nigris. *Geoff.*
Ins. I. 161. 40.
Habitat in Europae sylvis.
Color exacte cupri fusi.

- Carnifex.* 41. *C. alatus*, viridi-aeneus, antennis pedibusque rufis, thorace angustato.
 Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Dom. Banks.*
- Parvus.* Caput aeneum, nitens, ore antennisque ferrugineis. Thorax quadratus, antice posticeque truncatus, glaber, aeneus, postice utrinque impressus. Elytra aenea, striata, apice subretusa. Pedes omnes ferruginei.
- vulgaris.* 42. *C. nigro-aeneus*, pedibus antennisque nigris.
Carabus vulgaris. *Linn. Syst. Nat.* II. 672. 27. *Fn. Sv.* 799. *Scopoli carn.* 268.
Buprestis fusco-aeneus, elytris striatis, punctis quatuor impressis. *Geoff. Inf.* I. 158.
Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 2.
 Habitat in Europa.
- azureus.* 43. *C. cyaneus*, antennis pedibusque rubris.
 Habitat in collibus arenosis Lipsiae.
 Statura C. lati. Elytra striata.
- latus.* 44. *C. niger*, elytris striatis, crenatis, antennis pedibusque ferrugineis.
Carabus latus. *Linn. Syst. Nat.* II. 672. 24.
 Habitat in Europa.
 Affinis *C. ruficorni*, at duplo minor.
- lineola.* 45. *C. thorace subaequali*, ferrugineus, elytris linea-
 la nigra.
 Habitat in America septentrionali. *Mus. Dom. Banks.*
 Statura et summa affinitas *C. ferruginei*. Elytra striata, thorace pallidiora, macula linearis nigra.
- ferrugi-
neus.* 46. *C. ferrugineus*, elytris striatis, obscurioribus.
Carabus ferrugineus, thorace glaberrimo. *Linn. Syst. Nat.* II. 672. 25. *Fn. Sv.* 798.
 Habitat in Europa.
 Statura C. lati.
- pallens.* 47. *C. pallidus*, elytris striatis.
 Habitat Dresdae.
 Statura et magnitudo *C. vulgaris*. Totus pallidus.
 Elytra striata.

48. *C. subaeneus*, elytris punctis vagis plurimis impressis. *Carabus multipunctatus*. *Linn. Syst. Nat.* II. 672. 32. *Fn. Sv.* 805. Habitat in Europa.
49. *C. ferrugineus*, thorace elytrisque aeneis. *Carabus aeneus*. Habitat in Lipsiae hortis. Statuta et magnitudo *C. cuprei*. Caput cum antennis ferrugineum, oculis verticeque nigris. Thorax transversus, canaliculatus, aeneus, nitens. Elytra striata, aenea, nitida, immaculata. Subtus totus pallide ferrugineus.
50. *C. capite thoraceque viridibus*, elytris cupreis. *Carabus sex punctatus subaeneus*, elytris punctis longitudinalibus sex impressis. *Linn. Syst. Nat.* II. 672. 35. *Fn. Sv.* 807. *Buprestis nitens*, capite thoraceque viridibus, elytris cupreis, punctatis. *Geoff. Inf.* I. 149. 14. *Goed. Inf.* 2. 126. tab. 31. Habitat in Europa, America boreali.
51. *C. viridis*, elytris, margine tibiisque testaceis. *Carabus marginatus*. *Linn. Syst. Nat.* II. 670. 16. *marginalis.* *Fn. Sv.* 804. *Buprestis viridis*, pedibus elytrorumque margine exteriori pallidis. *Geoff. Inf.* I. 162. 41. Habitat in Europa. Variat colore nigro et viridi.
52. *C. niger*, thorace pedibusque ferrugineis. *Carabus melanocephalus* thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque atris. *Linn. Syst. Nat.* II. 671. 22. *Fn. Sv.* 795. *Buprestis niger*, thorace, antennis pedibusque ferrugineis. *Geoff. Inf.* I. 162. 42. Habitat in Europae suffocatis. Variat antennis ferrugineis et fuscis.
53. *C. thorace pedibusque ferrugineis*, elytris capiteque cyaneis. *Carabus cyanocephalus*. *Linn. Syst. Nat.* II. 671. 21. *Fn. Sv.* 794.

Buprestis capite elytrisque coeruleis, thorace rubro.
Geoff. Inf. I. 149.

Cantharis elytris et capite coeruleis, scapulis croceis.
Raj. Inf. 89. I.

Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 14.
Habitat in Europae sylvis.

flexuosus. 54. *C. niger, elytris ferrugineis; macula media sinuata punctoque apicis nigris.*

Habitat in India orientali. Koenig.

Parvus. Statura sequentis: corpore depresso. Thorax marginatus, niger, antice valde excisus pro receptione capitinis. Scutellum nigrum. Elytra ferruginea, basi versus scutellum nigricantia; in medio macula flexuosa et postice puncto parvo nigra.

crux ma- 55. C. thorace orbiculato, rubro, coleoptris truncatis,
jor. rubris, cruce nigra.

Carabus crux major thorace capiteque nigro, rubescente, coleoptris ferrugineis, cruce nigra. Linn. Syst. Nat. II. 673. 39.

Buprestis niger; thorace pedibusque rubris, elytris rubris, cruce nigra. Geoff. Hist. Inf. I. 150.

Schaeff. Icon. tab. I. fig. 13.

Habitat in Europae sylvis.

Antennae nigrae, basi rufae. Caput glabrum, atrum, nitens. Thorax glaber, rufus. Elytra apice truncata, abdomine paulo breviora, rufa, macula scutellari, fascia lata in medio, futura et margine postico nigra.

erux mi- 56. C. thorace orbiculato, rufo, coleoptris apice nigris:
nor. macula rufa.

Carabus crux minor thorace luteo, glabro, elytris postice nigris: maculis duabus flavis. Linn. Syst. Nat. II. 673. 40. Fn. Sv. 809.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 8. et tab. 41. fig. 13.

Habitat in Anglia. D. Lee.

Statura praecedentis, at paulo longior et angustior.

Caput atrum, nitidum. Thorax glaber, ruber, basi utrinque lineola parva impressa. Elytra striata, rufa, apice nigra, macula magna communis rufa. Abdomen atrum. Pedes toti rufi.

57. C. nigricans, antennis pedibusque pallidis, elytris obtusissimis. *Linn. Syst. Nat. II. 672. 213. 31. Fn. Sv. 803.*

Habitat in Europae arena.

Elytra striata, obtusissima et fere truncata.

58. C. thorace rotundato, ferrugineus, vertice ano- que nigris. *rufescens.*

Habitat in Anglia. *Mus. D. Hunter.*

Parvus, totus ferrugineus, solo vertice capitis ano- que nigris.

59. C. thorace orbiculato elytrisque nigris, maculis duabus rufis. *2 pustula- tus.*

Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*

Statura omnino et magnitudo C. crucis majoris. Antennae thorace longiores, nigræ. Thorax rotundatus, ater, villosus, punctatus. Elytra obtusa, crenato-striata, villosa, nigra, maculis duabus magnis rubris, quarum anterior major ad marginem exteriorem, posterior orbiculata.

60. C. thorace orbiculato, rufo, elytris flavis: maculis tribus nigris. *lunatus.*

Habitat in Anglia. *Dom. Lee.*

Antennæ nigræ, basi ferrugineæ. Caput cyaneo-nigrum, nitens. Thorax orbiculatus, subcanaliculatus, laevis, glaber, rufus. Elytra glabra, substriata, flava, puncto minori orbiculato ad basin et duobus majoribus margine exteriori connatis ad apicem. Abdomen atrum. Pedes rufi, femoribus apice nigris.

61. C. thorace, elytris antice margineque, antennis pedibusque ferrugineis. *vaporariorum.*

Carabus vaporariorum. *Linn. Syst. Nat. II. 671. 23.*

Fn. Sv. 796.

Habitat in Europa.

62. C. niger, elytris antice pedibusque testaceis. *meridiana-*
Carabus meridianus. *Linn. Syst. Nat. II. 673. 36. nus.*

Habitat in Europa.

Parvus est, a C. vaporariorum diversissimus.

Comma. 63. C. niger, thorace fusco, elytris griseis, macula linearis nigra.

Habitat in America. Dom. Drury.

Statura C. quadrimaculati, Caput atrum, nitidum.

Thorax orbiculatus, ferrugineo-fuscus. Elytra striata, grisea, macula longa linearis nigra versus futuram. Pedes pallidi.

4 macula- 64. C. thorace ferrugineo, glabro, elytris obtusissimis, fuscis: maculis duabus albis,

Carabus quadrimaculatus. Linn. Syst. Nat. II. 673. 40.
Fn. Sv. 809.

Buprestis niger, thorace plano, ferrugineo, clytris laevibus, maculis quatuor albis. Geoff. Inf. I. 152. 24.

Habitat in Europae quisquiliis.

4 gutta- 65. C. thorace rotundato, atro, elytris nigris, punctis quatuor albis.

Habitat in Anglia.

Differit manifeste a C. quadrimaculato. Elytra haud obtusa, thorax valde rotundatus, ater. Tibiae pallidae.

ustulatus. 66. C. thorace nigro, elytris obscuris, pallido-bifasciatis.

Carabus ustulatus. Linn. Syst. Nat. II. 673. 38. Fn. Sv. 810.

Habitat in Europa.

Fascia postica undata.

Variat maculis magnis obsoletis, rubro-pallidis.

atricapil- 67. C. thorace rotundato, rufo, elytris obtusis, testaceis, capite atro.

Carabus atricapillus flavus, capite nigro, clytris obtusissimis. Linn. Syst. Nat. II. 673. 42.

Habitat in Europa.

testaceus. 68. C. capite thoraceque ferrugineis, elytris testaceis.

Carabus testaceus pallide testaceus, elytris glabris.
Linn. Syst. Nat. II. 673. 37. Fn. Sv. 812.

Buprestis testaceus, capite nigro. Geoff. Inf. I. 153. 25.

Habitat in Europa.

Magnitudo C. meridiani.

69. *C. aeneus*, antennis nigris, tibiis pallidis. *bipunctata.*
Carabus bipunctatus subaeneus, elytris punctis duobus *tus.*
 impressis. *Linn. Syst. Nat. II. 672. 33. Fn. Sv. 806.*
 Habitat in Europa.
 Minimus, vix duplo major pediculo.

68. SCARITES. *Palpi sex filiformes.*
Labium corneum, dentatum.
Antennae moniliformes.

1. *S. ater*, pedibus anticis palmato-digitatis, capite *subterraneus.*
 sulcato.

Habitat in America. *Dom. Lewin.*

Magnitudo Carabi leucophtalmi; totus ater. Caput porrectum, apice sulcis duobus exaratum. Antennae piceae, moniliformes, articulo primo longissimo. Thorax convexus, brevis, glaber, nitens, postice rotundatus. Elytra striata. Pedes antici femoribus validis, tibiis sex dentatis.

2. *S. cyaneus*, glaberrimus, antennis pedibusque nigris. *cyaneus.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Caput magnum, exsertum, cyaneum; fronte lineis duabus impressis. Maxillae exsertae, nigrae, dentatae. Antennae moniliformes, nigrae. Thorax canaliculatus, cyaneus, postice rotundatus. Elytra thorace addito capite breviora, connata, cyanea, glaberrima, basi retusa. Pedes nigri, tibiis anticis dentatis.

3. *S. piceus*, tibiis anticis palmato-digitatis. *arenarius.*

Tenebrio Fosfor. *Linn. Syst. Nat. II. 675. 7. Fn. Sv. 817.*

Habitat in Europae collibus arenosis.
 Praecedenti quadruplo minor.

4. *S. testaceus*, thorace oblongo, angulis quinque denticulatis. *cursor.*

Tenebrio Cursor. *Linn. Syst. Nat. II. 675. 8. Fn. Sv. 817.*
 Habitat in Europa.

Arabs. 5. S. niger, thorace ferrato, antennis pedibusque testaceis.
Habitat in Oriente. *Forskäbl.*

Statura et magnitudo S. cursoris, at duplo fere major.
Antennae longitudine corporis. Elytra striata.

clavicornis. 6. S. piceus, antennis clavatis.

Tenebrio minutus alatus, niger, thorace marginato,
antennis clavatis, pedibusque piccis. *Linn. Syst. Nat. II. 1675. 12.*

Habitat in Suecia.

Statura et magnitudo S. fossoris. Corpus oblongum,
piccum. Thorax laevis, elytra striata.

69. SEPIDIUM. *Palpi filiformes.*

Maxilla brevis, unidentata.

*Labium corneum, breve,
ad basin emarginatum.*

Antennae filiformes.

tricuspidatum. 1. S. thorace tricuspidato, corpore griseo.

Habitat in Arabia. *Forskäbl.*

Magnitudo media: cinereum. Antennae articulis undecim cylindricis. Thorax gibbus, carinatus, dentibus tribus validis, obtusis, quorum alter in margine anteriore obtusior caput tegit. Elytra connata, obtusa, linea media lateralique elevatis, muricatis.

cristatum. 2. S. thorace tricuspidato, cristato, corpore variegato.

Habitat in Aegypto. *Forskäbl.*

Affinis S. tricuspidato, at paulo minus. Caput planum, griseum. Thorax tricuspidatus, spina anteriore cristata fissa, niger, lineis tribus albis. Elytra albo nigroque varia, lineis duabus carinatis, postice spinosis. Pedes grisei.

70. PIMELIA. *Palpi filiformes.*

Maxilla unidentata.

Labium membranaceum,
rotundatum, subemarginatum.

Antennae filiformes.

1. *P. atra, glabra, elytris striis quatuor rufis.*

striata.

Habitat in Indiis.

Gibba, atra. Antennae nigrae, apice fuscae. Elytra connata, glabra, atra, striis quatuor obscure rufis, quae intra apicem coeunt. Pedes inermes, nigri.

2. *P. atra, corpore muricato, hispido.*

bispida.

Habitat in Arabia. *Forskäbl.*

Corpus obscure nigrum. Antennae hispidae, articulo secundo majori. Thorax rotundatus, pilosus. Elytra connata, punctis elevatis muricata, pilisque erectis hispida. Pedes inermes.

3. *P. atra, elytris connatis, muricatis, pedibus longioribus.* *longipes.*

Habitat in Aegypto. *Forskäbl.*

Thorax brevis, rotundatus, ater, glaber, canaliculatus. Elytra connata, gibba, atra, muricata. Pedes inprimis postici elongati.

4. *P. nigra, coleoptris obtusis: striis muricatis.*

muricata.

Tenebrio muricatus. *Linn. Syst. Nat. II. 676. 17.*

Mus. L. Ulr. 100.

Tenebrio atra, aptera, rotundata, elytris sulcis tribus elevatis. *Geoff. Inf. I. 352?*

Habitat in Europa australi.

Statura P. hirsutae, at paulo minor.

5. *P. atra, elytris scabris, antennis pedibusque fuscis.*

scabra.

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentium. Caput atrum, antennis filiformibus, fuscis. Thorax gibbus, ater, glaber, laevis. Elytra atra, punctis parvis numerosis elevatis, scabra. Pedes omnes obscure fusti.

6. P.

- angulata.* 6. P. elytris spinosis, linea elevata lateralii, ferrata.
Habitat in Oriente. *Forskäbl.*
Reliquis crassior, tota atra, nitens. Thorax rotundatus, lateribus scabris. Elytra connata, obtusa, spinis majoribus elevatis in tres series digestis. Inter has lineae quatuor spinarum minorum. Linea lateralis valde prominet ferrata.
- rugosa.* 7. P. thorace scabro, elytris rugosis, antice angustioribus.
Habitat in Oriente. *Forskäbl.*
Praecedentium statura, tota atra opaca. Thorax elytris angustior, rotundatus, immarginatus. Coleoptra connata, lineis tribus elevatis, et spatio interjecto rugoso. Basis elytrorum angustior.
- spinosa.* 8. P. thorace marginato, marginibus antice posticeque spinosis, elytris striis elevatis, laevibus.
Tenebrio spinosus. *Linn. Syst. Nat. II. 677. 24. Mus. Lud. Uhr. 101.*
Habitat in Europa australi, Oriente.
Diversa facies a praecedentibus. Thorax valde marginatus, antice posticeque acuminatus.
- reflexa.* 9. P. thorace marginato, marginibus reflexis, elytris muricatis: linea laterali carinata, laevi.
Habitat in Oriente. *Forskäbl.*
Statura et summa affinitas P. spinosae: tota atra. Thorax antice lunatus, lateribus valde marginatus. Elytra connata, striis duabus punctorum elevatorum et linea laterali valde carinata.
- carinata.* 10. P. nigra, thorace orbiculato, elytris lineis elevatis tribus, laevibus.
Habitat in Gallia.
Statura omnino P. spinosae: tota atra. Thorax rotundatus, lateribus gibbis. Elytra connata, striis tribus carinatis.
- collaris.* 11. P. nigra, elytris laevibus, uniangulari, thorace angustiore, capite depresso, carinato.
Tenebrio collaris apterus, niger, elytris laeviusculis, uniangulari, thorace angustiore, capite depresso, carinato. *Linn. Syst. Nat. II. 677. 21.*

Habi-

Habitat in Europa australi.

E geniculis oleum flavescent exsudat. Statura P. spinosae.

12. P. thorace rotundato, elytris glaberrimis. *glabra.*

Habitat in Oriente. *Forfkäbl.*

Similis P. rugosae, at duplo minor: tota atra, nitida.

Thorax rotundatus, laevis. Elytra connata, obtusa, glaberrima.

13. P. glabra, thorace postice angustato, elytris acuminatis. *angustata.*

Habitat in Oriente. *Forfkäbl.*

Statura P. glabrae: tota atra, glabra, nitida. Thorax rotundatus, postice angustior. Elytra connata, acuminata, subtilissime punctato-striata.

14. P. glabra, thorace orbiculato, elytris acuminatis. *orbiculata.*

Habitat in Oriente. *Forfkäbl.*

Magnitudo et statura P. angustatae, tota atra, glabra.

Thorax elytris angustior, orbiculatus. Elytra connata, glaberrima, postice acutiuscula.

71. SCAURUS. *Palpi inaequales, filiformes.*

Maxilla obconica, unidentata.

Labium truncatum, integrum.

Antennae moniliformes.

1. Scaurus.

Habitat in Aegypto. *Forfkäbl.*

atratus.

Media, tota atra, glabra, thorax suborbiculatus, planus, punctatus, capite addito longitudine fere elytrorum. Elytra connata, obtusa, striato-punctata. Dens crassus, validus, alius versus apicem femorum et alius ad basim tibiarum pedum anteriorum.

72. BLAPS. *Palpi quatuor clavati.*
Maxilla recta, bifida.
Labium membranaceum, fuscum.

Antennae apice moniliformes.

Gigas. 1. *B. nigra, thorace rotundato, elytris laevibus, obtusis.*
Tenebrio Gigas. Linn. Syst. Nat. II. 676. 14.

Habitat in Europa australi.

Simillima B. mortisagae, at paulo major. Thorax magis rotundatus, elevatus, laevissimus. Elytra obtusa, absque punctis et striis.

fulcata. 2. *B. coleoptris mucronatis, fulcatis.*

Habitat in Oriente. D. Prof. Forskäbl.

Statura et color omnino B. mortisagae, at duplo fere major. Elytra connata, mucronata, fulcis octo vel novem laevibus exarata.

mortisaga. 3. *B. atra, coleoptris mucronatis, laevibus.*

Tenebrio mortisaga aptera, thorace aequali, coleoptris laevibus, mucronatis. Linn. Syst. Nat. II. 676. 15. Fn. Sv. 822.

Tenebrio atra, aptera, coleoptris laevibus, pone acuminatis. Geoff. Inf. I. 346.

Scarabaeus major totus niger, abdome longo, elytris veluti caudatis. Raj. Inf. 90. 12.

Scarabaeus ex toto niger, minime nitens, foetidus. Lister. Scar. Angl. 388. 21.

Frisch. Inf. 13. tab. 25.

Scarabaeus impennis, tardipes. Petiv. Gazoph. tab. 24. fig. 7.

Blatta foetida. Mouff. Inf. 139.

Schaeff. Icon. tab. 37. fig. 6. et tab. 60. fig. 13.

Habitat in Europae umbrosis, suffocatis.

excavata. 4. *B. thorace postice angulato, elytris excavato-punctatis, acutiusculis.*

Petiv. Gazoph. tab. 92. fig. 14.

Aet. Angl. 271. 861. 13.

Habitat Madraspatario. Mus. Brit.

B. mor.

B. mortisagae minor et planior. Thorax laevis, ater, marginatus, postice sublineatus, angulis acutis. Elytra atra, punctis late excavatis striata.

73. TENEBRIÖ. *Palpi* quatuor inaequales, anteriores subclavati, posteriores filiformes.

Maxilla bifida.

Labium truncatum, cornutum, integrum.

Antennae moniliformes.

1. T. ater, glaber, elytris striatis, tibiis posticis serratis. *serratus.*

Habitat in Sierra Leon Africae. *Mus. Dom. Banks.*

Duplo major *T. molitori*. Antennae moniliformes, extrorsum suberassiores. Caput magnum, exsertum, atrum, basi attenuatum. Thorax ater, glaber, nitens. Elytra atra, striata. Pedes atri, femoribus canaliculatis. Tibiae posticae, incurvæ, clavatae, intus ferratae.

2. T. oblongus, piceus, elytris striatis.

Molitor.

Tenebrio molitor alatus, niger totus, femoribus antice crassioribus. *Linn. Syst. Nat.* II. 674. 2. *Fn. Sw.* 875. *Scop. carn.* 259.

Tenebrio atra, oblonga, elytris striis novem laevibus.

Geoff. Inf. I. 349. 6.

Frisch. Inf. 4. p. 1. tab. 3.

Sultz. Inf. 7. fig. 52.

Vermis farinarius. *Raj. Inf.* p. 4. larva.

Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 1.

Habitat in farina pistorum, pane sicco.

Larva alba, mollis; luscinarum gratissimus cibus.

3. T. violaceus, antennis pedibusque piceis. *Linn. Syst.* *chalybeus.*

Nat. II. 674. 3.

Habitat in Guinea.

Affinis *T. molitori*.

4. *T.*

- stratus.* 4. *T. oblongus*, ater, elytris sulcatis, acutiusculis.
Habitat in America meridionali. *Mus. Brit.*
Affinis praecedentibus: totus ater. Thorax marginatus, rotundatus, angulis anticis rotundatis, posticis acutis. Elytra crenato-striata.
- abbreviatu-* 5. *T. ovatus*, ater, elytris striatis, capite tuberculato.
tus. *Habitat* in India. *Mus. Brit.*
Statura *T. atrati*, at duplo brevior. Thorax parum marginatus, laevis, glaber, angulis rotundatis. Tuberculum parvum, elevatum, utrinque in clypeo capitum rotundatum. Ultimus antennarum articulus globosus. Elytra crenato-striata.
- cornutus.* 6. *T. thoracis marginibus crenatis angulisque prominulis*, thorace bicorni.
Habitat Smirnae. *Dom. Drury.*
Statura *T. molitoris*, at duplo major. Antennae moniliformes. Caput cornubus duobus recurvis, apice refractis, longitudine capitum; dente utrinque parvo ante oculos. Thorax submarginatus margine crenato, antice retusus, angulis prominentibus. Elytra striata, picea. Femora antica crassiora tibiis, apice lamina orbiculata, prominente.
- sanguini-* 7. *T. ater*, antennis pedibusque sanguineis.
pes. *Habitat* in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Duplo minor *T. molitore*. Caput obtusum, atrum, nitidum, antennis moniliformibus, extorsum crassioribus. Thorax ater, glaber, nitens. Elytra atra, striata. Pedes sanguinei, tibiis quatuor anticis extus ferratis.
- caraboi-* 8. *T. niger*, thorace ovali marginato, elytris striatis.
des. *Tenebrio caraboides*. *Linn. Syst. Nat. II. 677. 25.*
Fn. Sv. 825.
Platycerus fuscus, elytris striatis. *Geoff. Ins. I. 64. 5.*
Habitat in Europa.

74. HELOPS. *Palpi* quatuor; anteriores securiformes, posteriores clavati.

Labium corneum, integrum.
Antennae moniliformes.

1. *H. coerulescens*, thorace suborbiculato, elytris striatis, *coeruleus*.

Tenebrio coeruleus. *Linn. Syst. Nat.* II. 677, 19.
Mus. Lud. Ulv. 98.

List. Angl. app. 4. fig. 14.

Petiv. Gazoph. tab. 22. fig. 6.

Habitat in Europa australi.

Antennae pedesque nigrae.

2. *H. aeneus*, elytris striatis, acuminatis.

Tenebrio nigro-cuprea elytro singulo striis octo, *lanipes*.
coleoptris pone acuminatis. *Geoff. Ins.* I. 349. 5.

Tenebrio aeneus. *Scopoli Ent.* 255.

Tenebrio lanipes alatus, aeneus, elytris subbifido-mucronatis, plantis subtus hirsutis. *Linn. Mant.* I. 533.

Habitat in Germania.

Obscure aeneus. *Antennae nigrae*. Thorax quadratus. Elytra striata terminantur acumine.

3. *H. niger*, digitis ferrugineis, palpis porrectis.

serratus.

Habitat in Anglia.

Corpus oblongum, magnitudine *H. aenei*. Thorax planus, puncto baseos utrinque impresso. Elytra substriata, obtusa, paulo aeneo colore tincta.

4. *H. ater*, elytris fascia abbreviata, aurea.

equestris.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks*.

Antennae nigrae, filiformes, articulis obconicis. Palpi anteriores porrecti, securiformes. Thorax rotundatus, gibbus, pubescens, ater, immaculatus. Elytra pubescentia, laevia, atra: ante medium fascia aurea, quae tamen suturam haud attingit. Pedes nigri, inermes.

- rufipes.* 5. H. niger, elytris, antennis pedibusque ferrugineis.
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Minor H. lanipede. Caput nigrum, obscurum, antennis filiformibus, ferrugineis. Thorax niger, minime nitens, postice utrinque punctis duobus impressis. Elytra striata, ferruginea. Corpus nigrum. Pedes ferruginei.
- turidus.* 6. H. niger, pedibus fusciis.
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
Statura et magnitudo praecedentis. Antennae filiformes, fuscae. Caput et thorax obscure nigra, minime nitida, thoracis basi punto parvo utrinque impresso. Elytra striata. Pedes fuscii.
- ater.* 7. H. ater, elytris striatis.
Habitat Lipsiae.
Thorax antice rotundatus, postice truncatus. Elytra striata.
- quisqui-
lius.* 8. H. niger, antennis pedibusque ferrugineis.
Tenebrio quisquilius, niger, ore pedibus ferrugineis.
Linn. Syst. Nat. II. 676. 13. Fn. Sv. 821.
Habitat in Europae quisquiliis.
Subtus totus ferrugineus.
- glaber.* 9. H. ater, laevis.
Habitat in Europae quisquiliis.
Minor H. quisquilio, totus ater, glaber, laevissimus.
75. ERODIVS. *Palpi* quatuor filiformes.
Maxilla cornea, bifida,
truncata, obtusa.
Labium corneum, emarginatum.
Antennae moniliformes.
- gibbus.* 1. E. gibbus ater, elytris lineis elevatis tribus.
Habitat in Arabia. *Forskahl.*
Medius, valde gibbus, ater. Thorax rotundatus, ater, margine anteriore pilis flavescentibus, ciliatus. Elytra connata, obtusa, lineis tribus elevatis, laevibus. Tibiae anticae dente medio apicisque valido.

2. E. ater, elytris linea elevata, unica. *planus.*
Habitat in Arabia. Forst&ahl.
- E gibbo duplo minor, totus ater. Elytra connata,
 linea dorsali elevata. Pedes inermes.
3. E. ater, elytris laevissimis. *minutus.*
Habitat in Oriente. Forst&ahl.
 Reliquis multo minor, totus ater, glaberrimus. Tho-
 rax dorso punctis duobus impressis. Elytra connata.
 Pedes inermes.

76. MELOE. *Palpi* subfiliformes.*Maxilla* recta bifida.*Labium* corneum, emarginatum.*Antennae* moniliformes.

1. M. corpore violaceo. *Linn. Syst. Nat. II. 679. 1. Proscarabaeus.*
Fu. Sv. 826.
Meloe. Geoff. Inf. I. 377.
Scarabaeus mollis, e nigra viola nitens. Lister. Scar.
Angl. 392. 27.
Proscarabaeus. Mouff. Inf. 162. fig. med.
Proscarabaei foemina. Ionst. Inf. p. 74. tab. 14.
Vermis majalis. Clut. hemerob. 81. 73.
Frisch. Inf. 6. tab. 6. fig. 5.
Hoeffnag. Inf. 2. tab. 9.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 5.
Habitat in Europae campis apricis, arenosis.
Tactus oleum limpidissimum flavicans e poris praefertim geniculis pedum exsudat.
Ova suave orentia. Lister.

2. M. segmentis dorsalibus, abdominis rubris. *Linn. Syst. majalis,*
Nat. II. 679. 2.
Proscarabaeus alter. Frisch. Inf. 6. tab. 6. fig. 4.
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 6.
Habitat in Europa australi.
Affinis praecedenti.

77. LYTTA. *Palpi quatuor; postice clavati.**Maxilla bifida.**Labium truncatum.**Antennae filiformes.*

- vesicato-ria.* 1. L. viridis, antennis nigris.
Meloe vesicatorius alatus, viridissimus, nitens, antennis nigris. *Linn. Syst. Nat.* II. 679. 3. *Fn. Sv.* 827. *Scop. carn.* 185.
Cantharis viridi-aurata, antennis nigris. *Geoff. Inf.* I. 341. 1. tab. 6. fig. 5.
Cantharis vulgaris officinarum. *Raj. Inf.* I. 341. *Mouff. Inf.* 144.
Ionf. Inf. 76. tab. 7.
Schaeff. Icon. tab. 47. fig. 1.
Habitat in ligastro, fraxino, sambuco, syringa.
Officinalis pro Vesicatorio.
- margina-ta.* 2. L. atra, elytrorum marginibus cinerascentibus.
Habitat ad C. B. S.
Simillima praecedenti, at duplo fere minor, supra tota atra, opaca, subtus et margo elytrorum exterior pubescens, cinerea.
- vittata.* 3. L. elytris nigris: marginibus vittaque flavis.
Habitat in America. *Muf. D. Hunter.*
Statura exacte praecedentis. Caput flavescens, vertice maculis duabus nigris. Thorax niger, lineis tribus flavis. Elytra nigra, margine omni vittaque media flavis. Abdomen et pedes nigra.
- atrata.* 4. L. atra, immaculata.
Habitat in America. *Muf. D. Hunter.*
Statura omnino praecedentis, at duplo minor et tota atra.
- afra.* 5. L. nigra, thorace rufo.
Meloe afer alatus, niger, thorace rufo. *Linn. Syst. Nat.* II. 680. 10.
Habitat in Africa.
Affinis L. atratae, at thorax totus rufus.

78. MYLABRIS. *Palpi filiformes.*

Maxilla cornea, compressa, bifida.

Labium membranaceum, subemarginatum.

Antennae moniliformes.

1. M. nigra, elytris fascia media flava. *fasciata.*

Habitat in Indiis. *Dom. Torsten.*

Statura M. cichorei, at major. Caput nigrum, oculis testaceis. Thorax niger, macula utrinque marginali ferruginea. Elytra nigra, fascia media lata, lutea. Alae hyalinae, costa venisque ferrugineis.

2. M. nigra, elytris flavis, fasciis tribus nigris. *cichorei.*

Meloe cichorei alatus, niger, thorace hirsuto, elytris fasciis tribus flavis, antennis clavatis. *Linn. Syst. Nat. II. 680. 5. Mus. Lud. Ulr. 103.*

Chrysomela cichorei. Hasselqu. Itin. 410. 101.

Cantharis fasciata. Imperat. nat. 78.

Habitat in totius Orientis cichoreis.

Officinalis in China.

Variat antennis apice flavis et totis nigris.

3. M. nigra, elytris maculis sex flavis, prima arcuata. *capensis.*

Meloe capensis alatus, niger, elytris maculis sex flavis, prima arcuata, antennis clavatis. *Linn. Syst. Nat. II. 180. 7. Mus. Lud. Ulr. 104.*

Habitat ad Cap. B. Sp.

Nimis affinis M. cichorei, quamvis duplo minor.

4. M. nigra, coleoptris flavis, fascia punctoque communi fuscis. *maculata.*

Habitat in Oriente. *Forskål.*

Statura praecedentis, at quadruplo minor, tota atra, laevis. Coleoptra flava, macula communis in medio dorso et fascia postica fusca, quae tamen marginem exteriorem haud attingit.

79. CEROCOMA. *Palpi aequales, filiformes.*
Maxilla inferior linearis,
integra.

Labium inferius membranaceum, bifidum.

Antennae moniliformes,
irregulares.

Schaefferi. 1. *Cerocoma.*

Meloe Schaefferi alatus, viridis, pedibus luteis, antennis mari abbreviatis, clavatis, brevibus, irregularibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 681. 12.

Cerocoma. *Geoff. Ins.* I. p. 358. n. 1.

Schaeff. Elem. tab. 37.

— — *Icon.* tab. 53, fig. 8. 9.

Habitat in Europa australi.

Facies omnino Meloe vesicatorii, sed duplo minor: elytra flexilia, pilosa. Antennae vere moniliformes, ultimo articulo majori.

80. MORDELLA. *Palpi quatuor, anteriores clavati, posteriores filiformes.*

Maxilla bifida.

Labium membranaceum,
bifidum.

Antennae moniliformes.

ferruginea. 1. M. antennis pectinatis, rufa, pectore, ano pedibus nigris.

Habitat in India orientali. *Koenig.*

Statura omnino M. paradoxae. Antennae nigrae, pectinatae. Corpus ferrugineum, solo pectore, ano et pedibus nigris. Elytra acuminata, alae fuscae.

paradoxa. 2. M. antennis pectinatis, thoracis lateribus elytrisque testaceis. *Linn. Syst. Nat.* II. 682. 1. *Fn. Sv.* 831.

Habitat in Europa.

Reliquis major: proprii forte generis.

3. M.

3. *M. antennis pectinatis, rufa, elytris nigris.* *pectinata.*
Habitat in America. Dom. Drury.
Statura et summa affinitas M. paradoxae. Antennae
fasciculato - pectinatae, nigrae. Caput magnum,
rufum, oculis nigris. Thorax antice angustatus,
glaber, rufus, postice loco scutelli acuminatus.
Elytra attenuata, nigra, a basi ad medium litura
cineraria. Alae nigrae. Abdomen breve, gibbum,
rufum, tectum utrinque squama baseos ovata.
Pedes rufi, geniculis nigris.
- C**onveniunt haec et *M. paradoxae* et *M. ferruginea* habi-
tu et structura cum hoc genere. Differunt antennis.
Forte distinctum genus, mihi haud rite notum.
4. *M. atra, thorace ferrugineo, elytris testaceis: maculis sex macu-
tribus nigris.* *lata.*
Habitat in America. Mus. D. Hunter.
*Corpus magnum. Caput nigrum, fronte elevata, fer-
ruginosa. Antennae vix pectinatae. Thorax obscure*
ferrugineus. Elytra testacea, maculis tribus nigris,
*altera baseos, altera media et tertia apicis. Abdo-
men et pedes atra, tibiis piccis.*
5. *M. ano aculeato, corpore atro, immaculato.* *aculeata.*
Mordella aculeata atra, ano spina terminato. Linn.
Syst. Nat. II. 682. 2. Fn. Sv. 832.
Mordella atro-caudata, unicolor. Geoff. Inf. I. 353. I.
Mordella. Schaeff. Elem. tab. 84.
Sulz. Inf. tab. 7. fig. 46.
*Habitat in floribus semiflosculosis, umbellatis Euro-
pae frequens.*
6. *M. ano aculeato, nigra, elytris fasciis duabus cinereis.* *fasciata.*
Mordella atra, caudata, fasciis villoso-aureis. Geoff.
Inf. I. 354. 2.
Habitat in Europae australioris floribus.
Simillima praecedenti, cum qua etiam conjunxit
*celeb. Linné. Differt tamen elytris basi fascia-
que media villoso-cinereis, nitentibus.*
7. *M. ano aculeato, elytris nigris, punctis quatuor flavis, primo lunato.* *8 punctata.*
Habitat in America septentrionali. Mus. Dom. Banks.
R 4 Statu-

Statura omnino praecedentium. Caput fuscum. Thorax villoso - flavescens, antice punctis quatuor, postice strigis undatis, fuscis. Elytra atra, truncata, punctis quatuor flavis, quorum primum baseos lunate. Corpus griseum, ano aculeo atro.

abdominalis. 8. M. ano aculeato, nigra, thorace abdomineque fulvis. Habitat in Germania. *D. v. Hattorf.*

Statura omnino praecedentium. Caput, pectus, elytra, spina analis, pedes atra. Thorax et abdomen fulva, immaculata, nitida.

humeralis. 9. M. atra, ore, lateribus thoracis pedibusque flavis.

Mordella humeralis atra, lateribus thoracis baseosque elytrorum flavescentibus. *Linn. Syst. Nat. II. 682. 3.*
Fn. Sv. 833?

Habitat in Europae floribus.

frontalis. 10. M. atra, fronte pedibusque flavescentibus. *Linn. Syst. Nat. II. 682. 4.* *Fn. Sv. 834.*

Habitat in Europae floribus.

thoracica. 11. M. atra, capite thoraceque flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 682. 5.* *Fn. Sv. 835.*

Habitat in Europa.

flava. 12. M. flava, elytrorum apicibus nigris. *Linn. Syst. Nat. II. 682. 6.* *Fn. Sv. 836.*

Habitat in floribus umbellatorum frequens.

81. STAPHYLINVS. Palpi filiformes.

Maxilla unidentata.

Labium membranaceum,
trifidum.

Antennae moniliformes.

birtus. 1. S. hirsutus, niger, thorace abdomineque postice flavis. *Linn. Syst. Nat. II. 683. 1.* *Fn. Sv. 839.*

Staphylinus niger villosus, capite, thorace quoque pilis fulvo - aureis. *Geoff. Ins. I. 363. 7.*

Schaeff. monogr. 1754. tab. 2. fig. 12.

— — *Icon. tab. 36. fig. 6.*

Habitat in locis arenosis Europae.

z. s.

I. ELEVTERATA. *Staphylinus.* 265

2. *S. pubescens*, cinereus, nigro-nebulosus. *Linn. Syst. murinus.*
Nat. II. 683. 2. Fn. Sv. 840.
Schaeff. Icon. tab. 4. fig. II.
 Habitat in cadaveribus, fimo.
 Elytra subtus coerulea.
3. *S. pubescens*, niger, fasciis cinereis. *Linn. Syst. Nat. maxillo-*
II. 683. 3. Fn. Sv. 841.
Staphylinus ater extremo antennarum articulo lunu-
lato. Geoff. Inf. I. 360. 1. tab. 7. fig. 1.
Staphylinus major totus niger. Raj. Inf. 109. 1.
Scarabaeus majusculus niger, forcipibus infectis.
Lift. loqu. 391.
Ionst. Inf. tab. 17. fig. 1. 2. 3.
Bocc. Mus. 2. tab. 31. fig. A. A.
Schaeff. Icon. tab. 20. fig. 1.
 Habitat in Europae sylvis, vicitans rapina.
 Adultior totus ater, glaber evadit.
4. *S. ater*, nitidus, capite utrinque macula fulva. *oculatus.*
 Habitat in nova Hollandia et Zelandia. *Mus. D. Banks.*
Magnitudo S. erythropteri. Totus ater, glaber, ni-
tens; capite utrinque macula magna fulva, quae
subtus fasciam constituit.
5. *S. ater*, elytris, antennis pedibusque rufis. *Linn. Syst. erythro-*
Nat. II. 683. 4. Fn. Sv. 842. Scop. carn. 306. pterus.
Staphylinus ater, non nitens, elytris pedibusque rufis.
Geoff. Inf. I. 364. 9.
Scarabaeus rapax elytris brevibus. Frisch. Inf. 5. 49.
tab. 25.
Stroem. A&T. Nidrof. 3. p. 404. tab. 5. fig. 8.
Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 2.
— — Elem. tab. 117.
 Habitat saepius in fimo.
6. *S. ater*, capite rufo, elytris violaceis. *erythroce-*
 Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.* *phalus.*
Magnitudo S. politi. Antennae moniliformes, nigrae.
Caput magnum, rufum, ore punctoque frontali
nigris. Thorax glaber, nitidus, ater, margine an-
tico in medio rufo. Scutellum atrum. Elytra cyanea.
Abdomen et pedes atra.

- politus.* 7. S. niger, thorace elytrisque nitidis. *Linn. Syst. Nat.*
 II. 683. 5. *Fn. Sv. 843. Scop. carn. 304.*
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 12.
 Habitat in Europae cadaveribus.
 Recens odorem spargit ambrofiacum.
- margina-*
tus. 8. S. ater, thoracis lateribus pedibusque flavis.
 Habitat in Anglia: captus die 11. Maj. in horto Musei
 Britannici.
 Statura et magnitudo S. politi, at paulo minor. Totus
 ater, glaber, nitens, at thoracis latera et pedes omnes
 flavescunt.
- flavescens.* 9. S. ater, pedibus rufis, elytrorum margine flavo.
Linn. Syst. Nat. II. 684. 13. Fn. Sv. 850.
 Habitat in Europa.
 Statura praecedentis.
- obtusus.* 10. S. testaceus, elytris antice anoque nigris.
 Staphylinus obtusus testaceus, elytris antice fuscis.
Linn. Syst. Nat. II. 684. 9.
 Habitat in Germania, Anglia.
- 2 punctula-*
tus. 11. S. niger, elytris punto ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.*
 II. 685. 16. *Fn. Sv. 847.*
 Habitat in Europa.
- fusipes.* 12. S. ater, elytris pedibusque testaceis. *Linn. Syst. Nat.*
 II. 685. 23. *Fn. Sv. 857.*
 Habitat in Europa.
 Parvus, brevis et crassus, ater, nitidus, elytris pedi-
 busque testaceis.
- bypnorum.* 13. S. ater, laevis, thoracis lateribus, elytris pedibus-
 que testaceis.
 Habitat in Anglia.
 Statura S. fuscipedis, at paulo minor. Ater, glaber,
 laevis, nitens. Thoracis latera inprimis basi
 testacea. Elytra testacea, immaculata, scutello
 tamen nigro.
- merda-*
rius. 14. S. ater, thorace, elytris pedibusque rufis.
 Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*
 Parvus. Antennae ferrugineae, apice fuscae. Caput
 atrum. Thorax rufus, scutellum nigrum. Elytra
 rufa. Abdomen nigrum.

15. S. thorace rufo, elytris fuscis, puncto baseos marginaque postico albis. *atricapillus.*

Habitat in Anglia. *Mus. Dom. Banks.*

Parvus. Antennae extrorsum crassiores, apice fuscae, ultimo articulo ferrugineo. Caput atrum, nitidum. Thorax rufus, glaber, immaculatus. Elytra fusca, puncto baseos marginaque postico albis. Abdomen ferrugineum, apice fuscum.

16. S. niger, thorace, elytris pedibusque testaceis. *Linn. chrysomeloid. Syst. Nat. II. 685. 21. Fn. Sv. 855. Geoff. Inf. I. 368. 18. linus.*

Habitat in Europa.

17. S. ater, glaber, pedibus rufis. *Linn. Syst. Nat. II. rufipes. 685. 24. Fn. Sv. 858.*

Staphylinus niger, thorace marginato, laevi, pedibus rufis. *Geoff. Inf. I. 367.*

Habitat in Europa.

Variat colore omnino testaceo et nigro, pedibus testaceis.

18. S. flavus, immaculatus. *Linn. Syst. Nat. II. 685. 20. caraboides. Fn. Sv. 854.*

Habitat in Europa.

19. S. niger, thorace elytrisque rugosis. *rugosus.*

Habitat in Anglia.

Valde affinis S. piceo, at paulo major: totus niger.

Caput planum. Thorax depresso, longitudinaliter rugosus. Elytra rugosa, nigra. Pedes nigri. Variat elytris testaceis.

20. S. niger, thorace depresso, lineis elevatis tribus, *picens.* elytris piceis. *Linn. Syst. Nat. II. 686. 25.*

Habitat in Europa.

22. OXYPORVS. **Palpi** inaequales, anteriores filiformes, posteriores fecuriformes.

Labium emarginatum cum mucrone.

Antennae moniliformes.

1. O. rufus, capite, elytrorum abdominisque posticis nigris. *rufus.*

Staphylinus rufus. *Linn. Syst. Nat. II. 684. 6. Fn. Sv. 844. Staphy-*

Staphylinus flavus capite, clytris abdomineque postice nigris. Geoff. Inf. 1. 370. 22.

Staphylinus pallide rufus, clytris coerulecentibus, capite et apice abdominalis nigris. Gadd. Sat. 80. Schaeff. Icon. tab. 35. fig. 3.
Habitat in Europa.

lunulatus. 2. O. flavus, clytris nigris: basi apiceque pallidis.
Staphylinus lunulatus rufus, capite abdominalis elytro-rumque posticis nigris, femoribus totis rufis. Linn. Syst. Nat. II. 689. 7. Fn. Sv. 845.
Habitat in Europa.
Caput et abdominalis apex nigra.

flavipes. 3. O. niger, clytris tibiisque fuscis.
Staphylinus flavipes. Linn. Syst. Nat. II. 685. 22.
Fn. Sv. 856.
Habitat in Europa.

83. PAEDERVS. *Palpi inaequales, anteriores clavati, posteriores filiformes. Labium lineare, integrum. Antennae moniliformes.*

riparius. 1. P. rufus, clytris coeruleis, capite abdominalisque apice nigris.
Staphylinus riparius. Linn. Syst. Nat. II. 684. 8. Fn. Sv. 846. Geoff. Inf. 1. 369. 21.
Staphylinus gregarius. Scop. carn. 308.
Schaeff. Icon. tab. 71. fig. 3.
Habitat in Europa.

elongatus. 2. P. niger, clytris postice pedibusque fulvis.
Staphylinus elongatus. Linn. Syst. Nat. II. 685. 14.
Habitat in Europa.

