

Werk

Titel: Jo. Christ. Fabricii systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, g

Autor: Fabricius, Johann Christian

Verlag: Korte

Ort: Flensburgi

Kollektion: Zoologica

Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen

Werk Id: PPN578515547

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN578515547>

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=578515547>

LOG Id: LOG_0007

LOG Titel: II. Vlonata.

LOG Typ: chapter

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

II. V L O N A T A.

*Os palpis quatuor.**Maxilla inferior galeata.*84. FORFICVLA. *Palpi filiformes.*
Labium trifidum.
Antennae setaceae.

1. F. elytris apice albis, antennis 14 articulatis. *Linn. auricula-*
Syst. Nat. II. 686. 1. *Fn. Sv.* 860. *Geoff. Inf.* I. 375. *ria.*
Scop. carn. 312.

Scarabaeus subrufus, cauda furcata. *Lister. Scar.*
Angl. 391. 25.

Vermis auricularius. *Frisch. Inf.* 8. p. 31. tab. 15.
fig. 1. 2.

Forficula f. auricularia vulgaris. *Monff. Inf.* 171. fig. inf.

Forficula. *Ionst. Inf.* tab. 16. fig. 2.

Forficula vulgaris. *Petiv. Gazoph.* tab. 74. fig. 5.

Merian. Inf. tab. 30.

Sultz. Inf. tab. 7. fig. 50.

Schaeff. Elem. tab. 63.

Habitat in Europa.

2. F. elytris testaceis, immaculatis, antennis 16 articu- *minor.*
latis. *Linn. Syst. Nat.* II. 686. 2. *Fn. Sv.* 861.
Geoff. Inf. I. 376.

Habitat in Europa.

Antennarum apex albicat.

3. F. forcipe flexuosa, elytris punctis duobus flavis. *flexuosa.*
Habitat Cajennae. *D. Mauduit.*

Corpus magnitudine F. auriculariae, fuscum. Forceps
flexuosa, basi ferruginea.

4. F.

dentata. 4. F. antennis decem articulatis, fusca, thoracis marginibus pedibusque pallidis, forcepe basi dentata.

Habitat in insula Madera. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo F. auriculariae. Antennae fuscae, primo articulo pallido. Caput fuscum. Thorax planus, marginatus, fuscus, margine pallido. Elytra fusca, obscura. Abdominis ultimum segmentum quadridentatum. Forceps magna, arcuata, nigra, basi pallida multidentata.

parallela. 5. F. nigra, thoracis marginibus, elytris pedibusque pallidis, forcepe recta inermi.

Habitat in insula Madera. *Mus. Dom. Banks.*

Statura praecedentis, at minor. Antennae fuscae articulis 12, primo pallido. Thorax planus, depressus, niger, margine pallido. Elytra truncata, pallida. Forceps recta, acuta, inermis, apice nigra. Pedes pallidi.

Morio. 6. F. atra, antennis fascia alba.

Habitat in insula Otaheita maris pacifici. *Mus. Dom. Banks.*

Magna. Antennae longae, 18 articulae, nigrae, articulo 1, 4 et 15. albis. Thorax planus, ater, postice rotundatus. Elytra truncata, atra, immaculata. Alae hyalinae, apice atrae. Abdomen atrum, forcepe magna incurva, denticulis baseos minutissimis. Pedes nigri, plantis ferrugineis.

pallipes. 7. F. forcepe elongata, unidentata, nigra, pedibus albis.

Habitat in insulis promontorii viridis. *Mus. Dom. Banks.*

Magna, supra nigra. Antennae desunt. Thorax quadratus, postice rotundatus, niger, margine exteriori albido. Elytra fusca. Alae albae, linea apicis fusca. Forceps fere longitudine abdominis, ferruginea, unidentata, apice nigra. Pedes albi.

85. BLATTA. *Palpi filiformes.**Maxilla* inferior apice fissa.*Labium* membranaceum,
bifidum: laciniis fissis,
pinna exteriori majori.*Antennae* setaceae.

- 1.
- B. livida*
- , thoracis clypeo macula quadrata, fusca.
- gigantea.*

Linn. Syst. Nat. 11. 687. 1. *Mus. Lud. Utr.* 106.*Gronov. Zooph.* 633. tab. 16. fig. 3.*Seb. Mus.* 3. tab. 77. fig. 1. 2.

Habitat in America, Asia.

- 2.
- B. atra*
- , thoracis margine antico albo.
- Linn. Syst. Nat.*
- aegyptiaca.*

11. 687. 2. *Mus. Lud. Utr.* 107.*Gron. Zooph.* 637. tab. 15. fig. 2.Habitat in Aegypto. *Forskähl.*

- 3.
- B. livida*
- , thoracis margine antico albo.
- Linn. Syst.*
- surinamensis.*

Nat. 11. 687. 3.

Habitat Surinami.

- 4.
- B. ferruginea*
- , thoracis clypeo postice exalbido.
- Linn.*
- americana.*

Syst. Nat. 11. 687. 4.*Blatta* fusco-flavescent, elytris fulco ovato impressis,
abdomine longioribus. *Geoff. Inf.* 1. 381. 2.*Blatta* molendinaria ab insula Jamaica allata, major.*Raj. Inf.* 68.*Merian. sur.* 1. tab. I.Habitat in America, et nuper Londini incepit in
Europaque australi.

- 5.
- B. ferruginea*
- , thorace atro: annulo albo, elytris bas
-
- australiae.*

lineola alba.

Capta frequens in nave e mari pacifico et regionibus
incognitis revertente.Magnitudo et statura *B. americanae*. Caput atrum,
margine baseos albo. Thorax ater, nitens, annulo
magno albo. Margo tamen omnis ater. Elytra
ferruginea, striata, linea longitudinali alba ad mar-
ginem exteriorem baseos.

- indica.* 6. *B. grisea*, thorace atro: margine antico albo.
Habitat in India orientali. *Koenig.*
Caput atrum, ore orbitaque oculorum albis. Thorax
ater, glaber, nitens, margine antico albo. Elytra
striata, grisea, lineola bascos nigra. Abdomen
fuscum, pedes cinerei.
- nivea.* 7. *B. alba*, antennis flavis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 688. 5.
Habitat in America.
- irrorata.* 8. *B. pallida*, thorace elytrisque fusco irroratis, alis
disco nigro.
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*
Corpus medium, pallidum, fronte subferrugineo,
margine postico fusco. Thoracis clypeus rotunda-
tus, integer, pallidus, macula media punctisque
numerosis sparsis nigris. Elytra grisea, linea bascos
abbreviata punctisque parvis numerosissimis nigris.
Alae nigrae, apice pallidae.
- viridis.* 9. *B. viridis*, antennis, thoracisque linea laterali flavis,
alis albis.
Habitat in America. *Mus. Tottianum.*
Parva. Statura *B. niveae*. Oculi atri et punctum fulvum
inter oculos. Antennae corpore breviores, flavae.
Clypeus subrotundus, viridis, linea utrinque laterali
flava. Alae albae, immaculatae. Corpus viride.
- brasiliensis.* 10. *B. pallida*, abdomine atro.
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*
Paulo major *B. lapponica*. Tota pallida, abdomine
subtus atro. Antennae fuscae.
- petiveriana.* 11. *B. nigra*, elytris maculis quatuor flavescentibus.
Cassida petiveriana. *Linn. Syst. Nat.* 11. 578. 28.
Lib. Mus. 4. 95. 21.
Habitat in India.
Statura *Cassidae*, at antennae setaceae.
- orientalis.* 12. *B. ferruginea*, fusca, immaculata, elytris fulco ob-
longo. *Linn. Syst. Nat.* 11. 688. 7. *Fn. Sv.* 862.
Geoff. Inf. 1. 380. tab. 7. fig. 5.
Blatta prima seu mollis *Mouffeti.* *Raj. Inf.* 68. 1.
Blatta molendinaria. *Mouff. Inf.* 138. f. 2. 3.

Scarabaeus alter testudinatus, minor, atque alatus.

Column. ecphr. 1. p. 40. tab. 36.

Grylli. *Ionst. Inf.* tab. 13. fig. A.

Blatta lucifuga f. molendinaria. *Frisch. Inf.* 5. p. 11. tab. 3.

Sultz. Inf. tab. 7. fig. 47.

Habitat in America. Hospitatur nunc in Oriente adiacenteque Europa. Consumit panem, cibaria, calceos etc. velocissime cursitans. Foemina aptera, larvae simillima, parit ovum magnitudine dimidii abdominis subcylindricum, carina crenulata. *Linn.*

13. B. thorace flavescente, elytris testaceis, apice nigris. *variegata.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo B. lapponicae. Antennae nigrae. Caput nigrum, postice flavescens. Thoracis clypeus rotundatus, flavescens. Elytra et alae testacea, apice nigra. Pectus atrum. Abdomen atrum, margine fasciisque quatuor, marginem haud attingentibus, flavis. Pedes atrii, tibiis rufis.

14. B. flavescens, elytris nigro-maculatis. *Linn. Syst. lapponica.*

Nat. 11. 688. 8. *Fn. Sv.* 863.

Blatta flavescens, elytris ad angulum acutis, striatis, *Geoff. Inf.* 1. 381.

Schaeff. Elem. tab. 26. fig. 2.

— — *Icon.* tab. 88. fig. 2. 3.

Habitat in Europa consumens cibaria.

Thorax niger, margine flavescente.

Variat multo breviori thorace toto flavescente.

15. B. livida, thorace lineis duabus atris, parallelis. *germanica.*

Linn. Syst. Nat. 11. 688. 9.

Habitat in Europa et in regionibus Australasiae incognitae, in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Affinis B. lapponicae.

86. MANTIS. *Palpi* subaequales.*Maxilla* inferior compressa, acutissima.*Labium* bifidum: laciniis fissis; pinnis aequalibus.*Antennae* setaceae.

Gigas. 1. *M.* thorace teretiusculo, scabro, elytris brevissimis, pedibus spinosis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 689. 1. *Musf. Lud. Ulr.* 109.

Arumatia. *Marg. bras.* 251.

Bradl. nat. tab. 27. fig. 6.

Petiv. Gazoph. tab. 60. fig. 2.

Seb. Musf. 4. tab. 77. fig. 1. 2.

Habitat in Asia.

necydaloides. 2. *M.* thorace scabro, elytris ovatis, angulatis, brevissimis, alis elongatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 691. 14.

Roef. Inf. 2. tab. 19.

Habitat in Asia.

Manifeste differt a *M. gigante*. Elytra ovata, brevissima, linea media elevata, acuta, flexuosa. Alae longitudine abdominis, fuscae. Eadem videtur cum *Manti phthifica*. *Linn.*

spinosa. 3. *M.* capite thoraceque spinosis, elytris brevissimis, acutis. Habitat in Indiis.

Statura *M. Gongylodis*, at triplo minor. Antennae filiformes, longitudine corporis. Caput vertice spinis quatuor vel sex anticis longioribus, divaricatis. Thorax fuscus, scaber, antice spina utrinque duplici armatus. Elytra brevissima, acuta, fusca. Alae longitudine abdominis, convolutae, fuscae. Femora antica inermia, reliqua spinosa.

²*spinosa.* 4. *M.* thorace teretiusculo, antice bispinoso, elytris brevissimis: margine flavo.

Habitat in America. *Musf. Don. Hunter.*

Statura *M. Gigantis*, at multo minor. Antennae flavescens. Caput viride, vertice utrinque spina elevata brevi, obtusa. Thorax linearis, rotundatus, viridis,

viridis, dorso flavescente, antice spinis duabus validis, nigris. Elytra brevissima, medio gibba, viridia, margine exteriori flavo. Alae magnae rufescentes, margine exteriori viridi. Abdomen lineare, virefcens. Pedes virefccentes, spinosi.

5. *M. linearis*, nigra, elytris brevissimis, gibbis: late- *lateralis.*
ribus flavis.

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Antennae corpore longiores, setaceae, nigrae. Caput nigrum, utrinque lineolis duabus parvis, flavis. Thorax cylindricus, linearis, niger, lateribus subflavis. Elytra brevissima, in medio gibba, dente elevato, nigra, margine exteriori flavo. Alae magnae nigrae, margine flavo. Pedes nigri. Pectus pallidum.

6. *M. thorace brevissimo*, apice dilatato, femoribus antice spina terminatis, reliquis lobo. *gongylo-*
des. *Linn. Syst. Nat.*
11. 690. 4. *Mus. Lud. Ulr.* 112.

Gryllus thorace lineari, alarum longitudine: margine denticulis ciliato. *Linn. Am. acad.* 1. p. 504.

Mantis. *Aldr. Inf.* tab. 13. fig. 21.

Gaayara. *Margraf. Bras.* 246.

Roef. Inf. 11. *Gryll.* tab. 7.

Sultz. Inf. 1. tab. 8. fig. 56.

Act. Angl. 301. tab. 20. fig. 3.

Seb. Mus. 4. tab. 68. fig. 9—12.

Aub. miscell. tab. 65. fig. 2.

Habitat in Africa.

Caput vertice subulato, bifido.

7. *M. thorace marginato*, dentato, elytris albo viridique variis, margine albo punctato. *mandica.*

Habitat Alexandriae. *D. Forskahl.*

Caput flavescens, fronte cornuta. Thorax valde marginatus, margine dentato. Elytra variegata, margine crassiori, linea distincta punctorum alborum. Pedes flavescentes, fasciis obscurioribus.

- strumaria*. 8. M. thorace utrinque membranaceo, dilatato, obscuro. *Linn. Syst. Nat.* 11. 691. 13.
Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 3.
Merian. Inf. Surinam. tab. 27.
Seb. Musf. 4. tab. 69. fig. 7. 8.
 Habitat in Indiis.
- tricolor*. 9. M. thorace lateribus expanso, lobato, capite cornuto, pedibus anticis latissimis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 691. 12.
Musf. Lud. Ulr. 117.
 Habitat in India.
 Oculi in cornicula auriformia acuta desinunt. Elytra pallida, albo-maculata. Alae basi rubrae, medio fuscae, apice albae.
- cancellata*. 10. M. thorace utrinque dilatato, membranaceo, plano. Habitat in Indiis. *Musf. Brit.*
 Statura M. strumariae, at obscure fusca. Thorax haud rotundatus, at omnino planus.
- siccifolia*. 11. M. thorace denticulato, femoribus ovatis, membranaceis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 689. 3. *Musf. L. U.* 111.
Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 17.
Edw. Av. tab. 258.
 Habitat in Indiis.
 Corpus reliquis latius, depressum.
- pectinicornis*. 12. M. thorace laevi, vertice subulato, antennis pectinatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 691. 10.
Gryllus pectinicornis. *Linn. Am. acad.* 6. p. 396. 27.
 Habitat in China.
 Antennis mox distinguitur.
- irrorata*. 13. M. thorace laevi, subcarinato, elytris viridibus: punctis ferrugineis, vagis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 690. 7.
Am. acad. 6. 397. 29.
 Habitat in America.
 Elytra alaeque breviora.
- oratoria*. 14. M. thorace laevi, elytris viridibus, immaculatis. Mantis oratoria thorace laevi, elytris viridibus, alis macula nigra antice rufescentibus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 690. 6. *Musf. L. U.* 115.

Mantis. *Geoff. Inf.* 1. 399. 1. tab. 8. fig. 4.

Roef. Inf. 2. tab. 1. 2.

Mouffet. Inf. 118. fig. 3.

Aldrov. Inf. 4. tab. 3. fig. 10.

6. Mantis religiosa thorace laevi, subcarinato, elytrisque viridibus, immaculatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 690. 5.

Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 1. 2.

Schaeff. Elem. tab. 81.

Seb. Mus. 4. tab. 67. fig. 7. 8.

Habitat in Oriente, Europa australi.

In Gallia australi infantibus viam monstrare creditur: *Remmure*.

15. M. thorace subciliato, elytris virescentibus: oculo ferrugineo. *Linn. Syst. Nat.* 11. 691. 8. *Mus. Lud. Ulv.* 114. *precaria*.

Merian. Surin. tab. 66.

Seb. Mus. 4. tab. 67. fig. 3—6.

Habitat in America, Africa.

Ocellus ferrugineus, antice dimidiato albus.

16. M. thorace ciliato, elytris hyalinis: margine viridi, fronte bidentata. *hyalina*.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter*.

Caput fuscum, antennis serratis fronteque dentibus duobus, validis, approximatis, acutis. Thorax linearis, carinatus, lateribus ciliatis, fuscus. Abdomen fuscum, segmentorum marginibus atris. Elytra hyalina, margine exteriori viridi. Alae hyalinae, apice fuscae.

17. M. thorace scabro, elytris viridibus: fasciis nigris, alis fuscis: disco atro. *bidens*.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter*.

Caput fuscum, fronte dentibus duobus, acutis, approximatis. Thorax linearis, griseus, punctis elevatis nigris, scaber. Elytra viridia, fasciis duabus obliquis fuscis, apice attenuata. Alae fuscae, disco atro. Pedes fusci. Femora antice pallida, apice nigra. Tibiae secundi paris lobatae.

18. M. thorace scabro, crenato, latitudine capitis, antice ferrugineo, elytris viridibus. *ministra-lis*.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks*.

Statura M. precariae. Caput obscure flavescens, antennis fuscis. Thorax latitudine capitis carinatus, scaber, lateribus tenuissime crenatis, antice ferrugineus. Elytra viridia, margine exteriori subferrugineo. Pedes ferruginei, femoribus anticis fulvis. Abdomen fuscum, ano pallido.

urbana. 19. M. thorace integro, elytris viridibus; puncto fasciaeque ferrugineis.

Habitat in Indiis. *Mus. Brit.*

Statura M. precariae, at minor. Tota viridis, puncto ferrugineo ad basin elytrorum et fasciae in medio, quae utrinque lineola nigra terminatur.

pagana. 20. M. alis reticulatis, albis; macula laterali ferruginea. Habitat in Orleans Galliae. *D. Mallet.*

Parva. Statura M. urbanae. Antennae breves. Caput ferrugineum, oculis prominulis nigris. Thorax cylindricus, integer ferrugineus. Alae omnes albae, subhyalinae, reticulatae, macula magna laterali ferruginea.

minuta. 21. M. thorace cylindrico, flavescente, elytris hyalinis; costa virescente.

Habitat in - - - - - *Mus. Dom. Banks.*

Parva. Caput flavescens. Thorax cylindricus, muticus, flavescens. Elytra alaeque hyalina, margine exteriori virescente. Abdomen subfalcatum, virescens, dorso flavescente. Pedes virescentes.

87. ACRYDIVM. *Palpi filiformes.*

*Labium cylindricum,
apice fissum.*

Antennae filiformes.

2 puncta. 1. A. thoracis scutello abdominis longitudine.

punct. Acrydium elytris nullis, thorace producto, abdomine aequali. *Geoff. Inf.* 1. 394. 5.

Gryllus bipunctatus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 693. 7. *Fu. Sv.* 884. *Scop. carn.* 316.

Habitat in Europa.

2. A. thoracis scutello abdomine longiore. *subula-*
 Acrydium elytris nullis, thorace producto, abdomine *tum.*
 longiore. *Geoff. Inf.* 1. 395. 6.
 Gryllus subulatus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 693. 8. *Fn. Sv.* 865.
 Habitat cum praecedente.
 Praecedenti nimis affine, cujus forte varietas.

88. TRUXALIS. *Palpi* inaequales, fili-
 formes.

Galea truncata, fornicata.
Labium inferius bifidum.
Antennae ensiformes.

1. T. capite conico, corpore viridi. *nasutus.*
 Gryllus nasutus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 692. 1. *Mus.*
Lud. Ulr. 118.
 Mantis africana. *Mouff. Inf.* 119.
Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 4.
Sulz. Inf. tab. 8. fig. 57.
 2. Gryllus turritus capite corneo, antennis ensiformibus,
 alis hyalinis. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. 427.
 Habitat in Africa.
 Animalculum valde distinctum, capite porrecto,
 conico, apice antennis, basi ore instructo.
 2. T. capite prominulo, viridis, antennis compressis, *brevicor-*
 longitudine thoracis. *nis.*
 Gryllus brevicornis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 692. 2.
Amoen. acad. 6. 398. 37.
 Habitat in America.

89. ACHETA. *Palpi* filiformes.
Maxilla apice fissa.
Labium quadrifidum.
Antennae setaceae.

1. A. alis caudatis, elytris longioribus, pedibus anticis *gryllotal-*
 palmatis. *pa.*
 Gryllus gryllotalpa. *Linn. Syst. Nat.* 11. 693. 10. *Fn.*
Sv. 806. *Geoff. Inf.* 1. 387. 1. *Scop. carn.* 317.
 Gryllo-

Gryllotalpa. *Raj. Inf.* 64.

Gryllotalpa. *Ionst. Inf.* tab. 12. fig. ultima.

Catesby Carol. 1. tab. 8.

Roef. Inf. Gryll. tab. 14. 15.

Frisch. Inf. 11. tab. 5.

Sultz. Inf. tab. 9. fig. 59.

Schaeff. Icon. tab. 37. fig. 1.

Habitat in Europae, Americae borealis cultis: hor-
torum hostis.

Nidum e gleba struunt, quam aura sicca et calida
attollere perperam affirmat *Goedart* 1. p. 127.

Allicitur fimo equino, pellitur porcino. *Scopoli.*

domestica. 2. A. alis caudatis, elytro longioribus, corpore glauco.
Gryllus domesticus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 694, 12. *Fn.*
Su. 868. *Scopoli caru.* 318.

Gryllus pedibus anticis simplicibus. *Geoff. Inf.* 1. 389. 2.

Gryllus domesticus. *Raj. Inf.* 63.

Gryllus domesticus. *Mouff. Inf.* 135.

Grylli Mouffeti. *Ionst. Inf.* tab. 12.

Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 12.

Hospitatur in Europae muris domesticis, tota nocte
fridens, praesertim instante pluvia.

Vescitur sanie et liquore carniū. *Raj.* Laetatur
calore fornacum.

Blattis non cohabitari affirmat *Poda.*

Necatur pillulis ex Arsenico et radice Dauci recentis
farina tritici mixtis. Nymphaeae lacti incoctae
radicibus. *Linn.*

assimilis. 3. A. alis caudatis, elytro longioribus, abdomine stylis
duobus apice fissis.

Habitat in Jamaica.

Statura A. domesticae. Antennae pallidae. Thorax
et caput nigra, margine pallido. Elytra fusca, ro-
tundata. Abdomen nigrum. Styli duo filiiiformes,
apice bifidi, longitudine abdominis. Pedes fuscī.

brasiliens. 4. A. alis caudatis, elytris longioribus, fusca, dorso
frs, pallidiore, cauda ascendente, longitudine corporis.
Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Major A. domestica. Caput fuscum, vertice pallidiore.
Thorax supra pallescens, lateribus fuscis. Elytra
rotun-

rotundata, fusca, dorso pallidiore. Macula atra, lateralis. Alae caudatae, fuscae. Abdomen fuscum, ense ascendente flavescente, apice fusco.

5. A. alis caudatis, elytris longioribus, albis, corpore *orientalis*.
atro, capite pedibusque testaceis.

Habitat Tranquebariae. *D. Koenig.*

Minor A. domestica. Caput testaceum. Thorax rotundatus, ater. Elytra atra. Alae elytris duplo longiores, albae, apice fuscescentes. Abdomen atrum, cauda stylisque brevioribus. Pedes simplices, flavescences.

6. A. alis caudatis, elytris longioribus, nigra, elytris *capensis*.
basi flavis.

Habitat in Cap. Bon. Spei. *Mus. Dom. Banks.*

Caput atrum, punctis tribus inter oculos flavis. Thorax rotundatus, ater, immaculatus. Elytra fusca, basi flava, apice rotundata. Alae magnae, caudatae, albidae. Corpus atrum, femoribus posticis basi rufescentibus.

7. A. alis elytro brevioribus, corpore nigro, stylo lineari. *campestris*.

Gryllus campestris. Linn. Syst. Nat. 11. 695. 13. Mus.

Lud. Ulr. 124. Scopoli carn. 319.

Gryllus campestris Mouffeti. Raj. Inf. 63.

Roes. Inf. 11. Gryll. tab. 13.

Frisch. Inf. 1. tab. 1.

Schaeff. Elem. tab. 66.

Habitat in Europa australiori.

Stridet a primo die Maji ad aequinoctium, domestica facta pellit priorem. *Scopoli.*

Conjunxit *Geoffroy* hanc cum domestica, at vix jure.

8. A. alis caudatis, elytris longioribus, albis, costa fusca, *hospes*.
elytris nigris, albo maculatis.

Habitat in America. *D. Eaton.*

Statura omnino A. domesticae, at triplo minor. Antennae setaceae, corpore paulo longiores, fuscae. Caput et thorax nigra, immaculata. Elytra brevina, flexilia, nigra, stria longitudinali lineolisque transversis, abbreviatis, numerosis, albis. Alae caudatae, elytris duplo longiores, albae, margine exteriori

fulco. Abdomen nigrum. Cauda bifeta enseque recurvo, fere longitudine corporis. Pedes fusci, tibiis posticis apice spinosis.

minuta. 9. A. thorace rotundato, flavescens, alis caudatis, cauda bifeta, tibiis posticis trispinosis.

Gryllus minutus. Linn. *Syst. Nat.* 11. 694. 11.

Habitat in America.

90. LOCUSTA. *Palpi* inaequales, obtusi.
Maxilla apice tridentata.
Labium bifidum, laciniis interne seta subulata instructis.

Antennae setaceae.

citrifolia. 1. L. thorace tetragono: angulis crenatis.

Gryllus citrifolius. Linn. *Syst. Nat.* 11. 695. 16. *Mus.*

Lud. Ultr. 125. *Gronov. Zooph.* 657.

Roes. Inf. 11. *Gryll.* tab. 16. fig. 1.

Habitat in Indiis.

laurifolia. 2. L. thorace tetragono, laevi, alis lanceolatis, elytro obtusiore longioribus.

Gryllus laurifolius. Linn. *Syst. Nat.* 11. 695. 17. *Mus.*

Lud. Ultr. 126.

Locusta maxima viridis, alis latissimis. *Sloan. Jam.* 2. p. 201. tab. 236. fig. 1.

Tucurubi. *Margr. Bras.* 246.

Habitat in America, nova Hollandia. *Mus. D. Banks.*

Elytra dorso gibba.

myrtifolia. 3. L. thorace subtetragono, laevi, alis deflexis, elytro longioribus, ense brevissimo, recurvo.

Gryllus myrtifolius thorace subtetragono, laevi, alis deflexis, elytro longioribus, tibiis muticis. Linn. *Syst. Nat.* 11. 696. 18.

Habitat in America.

L. *laurifolia* duplo minor. Anus maris lamina clavata, furcata, foeminae ensis brevissimus, recurvus.

4. L.

4. L. thorace deflexo, elytris concavis, apice rotundatis, ala longioribus. *camellifolia.*

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Medius. Antennae setaceae. Caput magnum, virescens. Thorax segmentis tribus, lateribus deflexis, postice rotundatus. Elytra magna, concava, viridia, nervosa, apice rotundata. Alae magnae, virescentes. Abdomen virescens, ense adscendente, viridi, apice fusco. Pedes virides, femoribus spinosis.

5. L. thorace tetragono, laevi, elytris sublinearibus, fusco-punctatis, alis brevioribus. *rhymifolia.*

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Nimis praecedenti affinis. Thorax quadratus, virescens, linea laterali fusca, postice emarginatus. Elytra linearia, concava, punctis parvis fuscis irrorata, alis breviora, obtusiora. Alae albae, apice virescentes.

Variat colore viridi et ferrugineo.

6. L. thorace deflexo, elytris concavis, viridibus; basi oculo dorsali vitreo. *perspicillata.*

Habitat in America. *Mus. Dom. Hunter.*

Statura omnino praecedentis. Caput pallidum, antennis setaceis, fuscis. Thorax deflexus, virescens, postice rotundatus. Elytra magna, concava, viridia, nervosa, apice rotundata, basi margine interiori plano, oculo magno, vitreo. Pedes virides, spinosi. Anus dentibus sex validis, incurvis, enseque ascendente extrorsum crassiore.

7. L. thorace rotundato, elytris viridi-hyalinis, alis brevioribus, pedibus anticis spinosis. *spinipes.*

Habitat in Brasilia. *Mus. Dom. Banks.*

Parva. Antennae setaeae, longitudine corporis. Caput pallefcens, oculis valde ante verticem prominentibus. Thorax rotundatus, laevis. Elytra viridi-hyalina, obtusa, alis breviora. Corpus fuscum. Femora et tibiae anticae spinis plurimis elongatis armata.

8. L.

- maxillofa.* 8. *L. viridis*, antennis maxillisque flavis.
Habitat in America. *Dom. v. Robr.*
Caput viride, vertice elevato, subtus acuminato, apice puncto flavo. Antennae longitudine corporis et maxillae flavae. Thorax glaber, postice utrinque sinuatus. Elytra alaeque corpore duplo longiora. Femora postica subtus dentata. Tibiae flavescences.
- elongata.* 9. *L. thorace subquadrato*, laevi, elytris alisque griseis, corpore longioribus.
Gryllus elongatus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 696. 20. *Musf. Lud. Ulr.* 127.
Roef. Inf. 11. *Gryll.* tab. 18. fig. 7.
Habitat in India.
Elytra grisea, maculis fuscis. Alae immaculatae.
- specularis.* 10. *L. thorace rotundato*, elytris griseis: basi ocello dorsali vitreo, antennis longissimis.
Habitat in America. *Musf. D. Hunter.*
Magnus. Antennae setaceae, fuscae, corpore triplo longiores. Thorax rotundatus, fuscus, linea laterali atra. Elytra grisea, basi margine interiori plano, ocello magno vitreo. Alae magnae, griseae. Pedes spinosi.
- ocellata.* 11. *L. thorace rotundato*, alis ocello notatis.
Gryllus ocellatus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 696. 22. *Musf. Lud. Ulr.* 129. *Gron. Zooph.* 649.
Seb. Musf. 4. tab. 73. fig. 7. 8.
Habitat in Indiis.
- lanceolata.* 12. *L. thorace rotundato*, laevi, elytris oblongis, alae aequalibus, fronte porrecta, lanceolata: subtus unidentata.
Habitat in Sierra Leon Africae. *Musf. Dom. Banks.*
Major *L. conocephala*, et frons inter oculos prominens, capite longior, basi subtus viridis, tibiis apice acutis. Thorax postice utrinque sinuatus.
- acuminata.* 13. *L. thorace rotundato*, vertice subulato, alis virentibus, longitudine corporis.
Gryllus acuminatus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 696. 23. *Musf. Lud. Ulr.* 130.
Sloan. Jam. 2. 202. tab. 236. fig. 3.
Habitat in America.

14. L. thorace rotundato, laevi, elytris oblongis, ala *conocephala*.
brevioribus, capite conico, obtuso.

Gryllus conocephalus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 696. 19.

Habitat in Africa.

Corpus viride, capite thoraceque linea dorsali fusca.

Ensis ferrugineus.

15. L. vertice acuminato: subtus puncto ocellari nigro, *triops*.
elytris alae aequalibus.

Gryllus triops thorace rotundato, vertice acuminato,

subtus puncto ocellari nigro, alis viridibus. *Linn.*

Syst. Nat. 11. 697. 24. *Mus. Lud. Utr.* 131.

Habitat in Indiis.

16. L. viridis, thorace subtriarticulato: articulis utrin- *squarrosa*.
que tricuspidatis, alis rubris, nigro-punctatis.

Linn. Mant. 1. 533.

Drury. Inf. 1. tab. 49. fig. 1.

Habitat in Africa.

17. L. thorace spinis erectis coronato, elytris variolos- *coronata*.
concavis.

Gryllus coronatus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 697. 26.

Habitat in Indiis.

Antennae luteo griseoque variae, corpore longio-
res. Elytra grisea, punctis magnis excavatis,
fuscis. Alae fuscae.

18. L. thorace rotundato, laevi, elytris abdomine dimi- *melano-*
dio brevioribus, alis nigris. *ptera*.

Gryllus melanopterus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 697. 28.

Mus. Lud. Utr. 134.

Habitat in Indiis.

Elytra brevissima, ovata. Alae nigrae, antice mar-
gine testaceo.

19. L. thorace rotundato, laevi, elytris coriaceis, alis *coriacea*.
pallidis, antennis longissimis.

Gryllus coriaceus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 697. 30. *Mus.*

Lud. Utr. 136.

Habitat in Indiis.

Color supra flavescens.

albifrons. 20. L. thorace postice rotundato, laevi, elytris cinereo nigroque variis, capite pallido.

Habitat in Madera. *Mus. Dom. Banks.*

Corpus magnum, fuscum. Caput obtusum, pallidum, antennis longis, setaceis, fuscis. Thorax fuscus, margine pallido, postice rotundatus. Elytra longitudine alarum, obtusa, nigro cinereoque varia. Alae fuscae. Foemina abdomine ense recto, apice ferrato nigro.

Falx. 21. L. thorace laevi, postice rotundato, fusca, capite pallido, ense falcato, atro.

Habitat in Madera. *Mus. Dom. Banks.*

Caput obtusum, pallidum, maxillis apice atris. Thorax laevis, fuscus, postice rotundatus. Elytra grisea, cinereo fuscoque maculata. Abdomen fuscum, ense parvo falcato, atro. Pedes fusci.

viridissima. 22. L. alis viridibus, immaculatis, antennis longissimis.

Locusta cauda ensifera, curva. *Geoff. Inf.* 1. 397. 1.

Gryllus viridissimus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 698. 31. *Fn. Sv.* 869. *Scop. carn.* 320.

Agrigoneus. *List. Goed.* p. 301. tab. 121.

Robert. Icon. tab. 27.

Frisch. Inf. 12. tab. 2. fig. 4.

Roes. Inf. 2. Gryll. tab. 10. 11.

Schaeff. Elem. tab. 79.

Goedart. Inf. 65. tab. 40.

Zinann. Obs. tab. 7. fig. 7.

Habitat in Europae graminosis.

verrucivora. 23. L. alis viridibus, fusco-maculatis, antennis longitudine corporis.

Locusta cauda ensifera, recta. *Geoffr. Inf.* 1. 398. 2.

Gryllus verrucivorus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 698. 33.

Scopoli carn. 321.

Locusta viridis, major. *Raj. Inf.* 61.

Locusta major viridis. *Frisch. Inf.* 12. tab. 1. *Icon.* 2. f. 1.

Lenst. Inf. tab. 11. fig. 1. 2. 3.

Merian. Inf. tab. 176.

Sulz. Inf. tab. 9. fig. 61.

Roes. Inf. 2. Gryll. tab. 8.

Schaeff. Icon. tab. 62. fig. 5.

Habi-

Habitat in Europae graminosis.

Rustici huic insecto verrucas manus admovent, quas praemordet et evomit in vulnus liquorem, unde verruca contabescit. *Linn.*

24. L. thorace viridi, flavo, lineato, fronte acuminata, *varia.*
antennis longissimis.

Goedart. Inf. 11. p. 142. tab. 40.

Habitat Lipsiae.

Simillimus L. viridissimae, at quadruplo minor. Antennae corpore duplo longiores, flavescentes. Caput vertice elevato, acuto. Thorax viridis, linea dorsali flavicante, puncto utrinque baseos nigro. Elytra viridia, immaculata. Ensis longitudine corporis adscendens.

25. L. thorace spinoso, corpore aptero. *Pupa.*

Gryllus Pupus apterus, thorace spinoso, femoribus punctatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 699. 34. *Amoen. Acad.* 1. 322.

Locusta - Talpa capensis, pedibus longis. *Periv. Gazoph.* tab. 13. fig. 7.

Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 6. fig. 3.

Kundm. prompt. 118. et 184.

Habitat in Aethiopia.

Scutellum magnum, rotundatum, spinis ciliatum.

Femora postica subtus quadridentata.

91. GRYLLVS. *Labium* bifidum, ovatum,
laciniis fornicatis.
Antennae filiformes.

1. G. thorace carinato, integro, corpore aptero. *Linn. Elephas.*
Syst. Nat. 11. 699. 35.

Roef. Inf. 11. Gryll. tab. 6. fig. 2.

Habitat in Africa.

2. G. thoracis carina margineque postico elytrorumque *succinctus.*
margine dorsali flavis, gula cornuta. *Linn. Syst.*
Nat. 11. 699. 36. *Am. acad.* 6. 398. 36.

Habitat in Indiis.

Antennae luteae. Tibiae posticae, spinis luteis, apice atris.

3. G.

cristatus. 3. G. thorace cristato: carina quadrifida, alis apice fuscis.
Linn. Syst. Nat. 11. 699. 37. *Mus. Lud. Ulr.* 137.
Amoen. acad. 1. 21. tab. 17. fig. 4.

Gronov. Zooph. 658.

Gryllus ex Aegypto. *Olear. Mus.* tab. 17. fig. 5.

Gryllus arabicus. *Hassélqu. It.* 413.

Frisch. Inf. 9. tab. 1. fig. 1.

Roef. Inf. 11. Gryll. tab. 5.

Edw. Av. tab. 312.

Habitat in Arabia.

Arabis esculentus.

carinatus. 4. G. thorace cristato: carina trifida, alis fascia nigra.

Habitat in Oriente. *Forskäbl.*

G. cristato crassior. Thorax scaber, carina trifida, lobo postico acuto. Elytra virescentia. Alae concolores, fascia versus apicem atra. Femora postica utrinque carinata, scabra, lineisque elevatis reticulata. Tibiae spinosissimae.

Lunus. 5. G. thoracis segmento crista semiorbiculata, elytris nigris: fasciis albis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 693. 9.

Linn. Amoen. acad. 6. 397. 30.

Habitat in America meridionali.

Alae nigrae, immaculatae.

ferratus. 6. G. thorace cymbiformi, carinato, ferrato, postice producto, acuto.

Gryllus ferratus thorace cymbiformi, carinato, denticulato, capite acuminato, abdomine coeruleo.

Linn. Syst. Nat. 11. 693. 5. *Mus. L. U.* 121.

Gronov. Zooph. 642.

Roef. Inf. Gryll. tab. 16. fig. 2. antennas setaceas perperam depingit.

Sulz. Inf. tab. 8. fig. 58.

Habitat ad Cap. B. Sp.

miliaris. 7. G. thorace subquadrato, verrucoso, elytris punctis callosis, albis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 700. 39. *Mus. Lud. Ulr.* 142.

Habitat in America.

Nimis affinis videtur G. morbilloso, at puncta omnia rotunda, alba, regularia. Scutellum rotundatum, margine dentato.

8. G. thorace quadrato, rubro, verrucoso, elytris fuscis *morbillo-*
albo punctatis, alis rufis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 700. *fus.*
38. *Mus. Lud. Utr.* 142.

Gronov. Zooph. 179. 662.

Roef. Inf. 11. Gryll. 18. fig. 6. perperam antennas pin-
git setaceas.

Habitat ad Cap. B. Sp.

Antennae nigrae, filiformes.

9. G. thorace subcarinato, scabro, capite obtuso, femo- *haemato-*
ribus piloso-ciliatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 700. 40. *pus.*
Mus. L. Utr. 143.

Habitat in Indiis.

Elytra cinerea. Alae hyalinae, venis nigris reticulatae.

10. G. elytris viridibus, albo punctatis; apice rufescen- *pictus.*
tibus, corpore coeruleo flavoque variegato.

Habitat Cajennae. *D. Mallet.*

Statura et magnitudo G. miliaris. Antennae filiformes, coeruleae, annulis tribus flavis, longitudine thoracis. Frons elevata, submarginata. Caput coeruleum, lineis sex flavis. Thorax coeruleus, flavo-maculatus. Abdomen flavo nigroque annulatum. Elytra viridia, albo punctata, apice subrufescentia. Alae rubrae, immaculae. Pedes antici flavo coeruleoque variegati. Femora postica coerulea, striis duabus apiceque flavis. Tibiae flavae.

11. G. thorace segmentis tribus, fronte impressa, maxil- *tartari-*
lis concoloribus. *Linn. Syst. Nat.* 11. 700. 42. *Mus. cus.*
Lud. Utr. 139.

Habitat in Africa.

Affinis sequenti. Ambo elytris cinerascens fuscumaculatis.

12. G. thorace subcarinato: segmento unico, maxillis *migrato-*
coeruleis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 700. 41. *Fz. Sv.* 871. *rius.*
Scop. carn. 323.

Gryllus migratorius. *Frisch. Inf.* 9. tab. 1. fig. 8.

Roef. Inf. Gryll. tab. 24.

Edw. Av. 208. tab. 208.

Habitat in Tartaria, inde migrans variis annis in
Europam, destruens vegetabilia omnia.

variegatus. 13. G. thorace lineato, flavo, elytris viridibus, alis coeruleis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 700. 43. *Mus. Lud. Ulr.* 144.

Habitat in America.

Antennae nigrae, annulis rubris. Frons rubra, maculis atris.

vocans. 14. G. thorace carinato, elytris pallidis, maculis ocellaribus, fuscis, alis basi ferrugineis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Caput pallide testaceum, maxillis atris. Stemmata tria aurea, duo supra antennas, et tertium in medio frontis. Thorax carinatus, ferrugineus, postice acutiusculus, margine flavescente. Elytra rotundata, pallida, maculis ocellaribus numerosis, parvis, fuscis. Alae basi ferrugineae.

muscus. 15. G. thorace carinato, elytris antice nigris, fascia alba, postice griseis nigro variis.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Magnitudo G. striduli. Caput fuscum, lateribus pallescentibus. Maxillae coeruleescentes. Thorax carinatus, fuscus, postice acutiusculus. Elytra antice nigra, fascia alba, postice cinerea, maculis nigris. Tibiae posticae sanguineae, basi flavae.

tuberculosus. 16. G. thorace scabro, alis rufis, apice cinereis, femoribus posticis supra infraque carinatis.

Habitat in Jutlandiae arenosis.

Affinis G. stridulo, at duplo major. Thorax subcarinatus, punctis elevatis, scaber. Elytra fusco cinereoque nebulosa. Femora postica fusca, supra infraque valde carinata, acuta. Tibiae flavae.

stridulus. 17. G. thorace carinato, alis rubris, extimo nigris. *Linn. Syst. Nat.* 11. 701. 47. *Fn. Sv.* 872.

Acrydium elytris nebulosis, alis rubris, externe nigris. *Geoff. Inf.* 1. 393. 4.

Frisch. Inf. 9. tab. 1. fig. 2.

Roef. Inf. 2. Gryll. tab. 21. fig. 1.

Schaeff. Elem. tab. 15.

— — *Icon.* tab. 27. fig. 10. 11.

Habitat in Europae siccis arenosis.

Variat

Variat corpore nigro toto, et nigro flavoque variegato.

Setae duae parvae in abdominis penultimo segmento.

18. G. thorace lineis quatuor flavis, alis coeruleis, elytris viridibus. *Linn. Syst. Nat.* II. 700. 45. *Mus. furina-*
Lud. Ulr. 146. *mus.*

Habitat in America meridionali.

Femora basi sanguinea.

19. G. fuscus, thorace carinato, alis rubris: apice hyalinis. *Linn. Syst. Nat.* II. 701. 46. *Mus. L. U.* 147. *italicus.*
Scop. carn. 327.

Roef. Inf. II. Gryll. tab. 21. fig. 6.

Habitat in Europa australi.

20. G. testaceus, alis sanguineis, apice hyalinis, femoribus posticis nigro-punctatis. *germanicus.*

Roef. Inf. II. Gryll. tab. 21. fig. 7.

Habitat in Germaniae aquis.

Corpus majus G. italico. Thorax subcarinatus, testaceus. Elytra testacea, fusco-maculata. Femora postica transversim striata, nigroque punctata, maculaque semilunari atra utrinque ad apicem. Tibiae sanguineae.

21. G. thorace carinato, elytris costa viridi, alis nigris, basi virescentibus. *virginianus.*

Habitat in America boreali. *D. Levin.*

Parvus. Statura G. grossi. Thorax valde carinatus, obscure rufescens. Elytra obscure rufescentia, margine exteriori laete viridi.

22. G. thorace subcarinato, alis nigris: margine postico cinereo. *carolinus.*
Linn. Syst. Nat. II. 701. 49.

Locustella carolina, elytris fuscis, alis inferioribus nigris, ad extremitates luteis. *Carisb. carol.* 2. p. 89. tab. 89.

Habitat in America.

Elytra obscura, punctis fuscis irrorata. Tibiae posticae cinerae.

*coerule-
scens.* 23. *G. thorace* subcarinato, alis virefcenti - coeruleis:
fascia nigra. *Linn. Syst. Nat.* 11. 700. 44. *Mus. Lud.*
Ulr. 145.

Acrydium elytris nebulosis, alis coeruleis, extimo
nigro. *Geoff. Inf.* 1. 392. 2. *Scopol. carn.* 325.

Frisch. Inf. 9. tab. 1. fig. 3.

Sulz. Inf. tab. 9. fig. 60.

Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 6. 7.

Roef. Inf. 11. Gryll. tab. 21. fig. 4.

Habitat in Europa australi.

Alae apice cinereae.

flavus. 24. *G. thorace* carinato, alis flavis, fascia nigra, apice
cinereis.

Gryllus flavus thorace subcarinato, alis disco flavo,
fascia nigra apice hyalinis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 702. 52.

Locusta capensis alis inferioribus luteis. *Petiv. Gazoph.*
6. tab. 3. fig. 6.

Habitat in regione Pedemontana. *D. Allioni.*

Statura *G. italici*. Antennae breves, flavescentes.

Caput obtusum, nigrum, fronte lineolis duabus
flavis. Thorax carinatus, niger. Elytra fusca,
fascia una ulterave bascos albicante, apice cine-
rea. Alae basi flavae, in medio fascia lata nigra,
apice cinereae.

cyanipes. 25. *G. fuscus*, linea dorsali flava, tibiis posticis flavis,
apice cyaneis.

Habitat in America.

Corpus magnitudine *G. grossi*. Antennae flavescentes,
apice fuscae, linea dorsalis flavescent a vertice ad
medium elytrorum. Elytra alaeque nebulosae.
Tibiae posticae flavae, apice cyaneae.

rusticus. 26. *G. griseus*, elytris basi fuscis, flavo maculatis, apice
cinereo fuscoque variis.

Habitat in America.

Statura *G. grossi*. Thorax griseus, interdum linea
dorsali flava maculisque lateralibus nigris. Elytra
basi fusca, linea dorsali grisea maculisque aliquot
lateralibus flavis, apice cinerea, maculis variis fuscis.
Alae cinereae, fusco reticulatae.

27. *G.*

27. G. thorace fusco: margine punctoque utrinque ti- *lateralis.*
biisque flavis.

Habitat in America.

Statura et magnitudo G. cyanipedis. Thorax laevis, obscurus, margine et puncto supra marginem laete flavis. Elytra alaeque fuscescentes. Tibiae posticae omnino flavae.

28. G. femoribus sanguineis, elytris virefcentibus: an- *grossus.*
tennis cylindricis. *Linn. Syst. Nat. 11. 702. 58.*
Fn. Sv. 877.

Acrydium femoribus sanguineis, alis subfuscis, reticulatis. *Geoff. Inf. 1. 393.*

Frisch. Inf. 9. p. 5. tab. 4.

Habitat in Europae siccis, arenosis.

29. G. thorace cruciato, fuscus, femoribus tibiisque *captiva.*
posticis fascia alba.

Habitat in nova Hollandia. *Mus. Dom. Banks.*

Caput fuscum, lineis nigris. Thorax fuscus, cruce alba. Elytra fusca, dorso pallidiore. Pedes fusci. Femora postica compressa, nigra, fascia apicis alba. Tibiae nigrae, fascia baseos alba.

30. G. fuscus, abdomine rufo, antennis subclavatis. *rufus.*
Linn. Syst. Nat. 11. 702. 56. Fn. Sv. 876.
Scopoli Carn. 329.

Habitat in Europae arenosis.

31. G. corpore incarnato, aptero. *Linn. Syst. Nat. 11. pedestris.*
703. 60. *Fn. Sv. 878.*

Habitat in Europa.

Insectum perfectum, teste celeberrimo *Linne.*

32. G. alarum rudimentis oculo atro, oculis aureis. *perspicil-*
Linn. Syst. Nat. 11. 703. 61. Amoen. acad. 6. 398. 34. latus.

Habitat in Indiis.

Antennae filiformes, corpore breviores.

An potius larva?

