

Werk

Titel: Jo. Christ. Fabricii systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, g...

Autor: Fabricius, Johann Christian

Verlag: Korte

Ort: Flensburgi

Kollektion: Zoologica

Werk Id: PPN578515547

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN578515547> | LOG_0010

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=578515547>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

V. VNOGATA.

*Os palpis duobus.**Maxilla inferior saepius unguiculata.*130. LIBELLULA. *Labium trifidum, lacinia dorsali minutissima.*

4 maculata.

1. L. alis posticis basi omnibusque medio antico macula nigricante, abdomine depresso, tomentoso.

Libellula 4 maculata alis posticis basi omnibusque medio antico macula nigricante. *Linn. Syst. Nat.* 11. 901. 1. *Fn. Sv.* 1459.Libellula alis macula duplici marginali. *Geoff. Inf.* 2. 224. 6.Libellula maxima, abdomine brevior latioreque flavo. *Raj. Inf.* 49. 4.*Reaum. Inf.* 6. tab. 35. fig. 1. 2.

Habitat in Europa.

depress.

2. L. alis omnibus basi nigricantibus, abdomine depresso, lateribus flavescente.

Libellula depressa alis omnibus basi nigricantibus, thorace lineis duabus flavis, abdomine lanceolato, lateribus flavescente. *Linn. Syst. Nat.* 11. 902. 5. *Fn. Sv.* 1413.Libellula thorace viridi, nitido, lineis flavis, alis albis, abdomine nigro-coeruleo. *Geoff. Inf.* 2. 226. 9.Libellula maxima, abdomine brevior latioreque coeruleo. *Raj. Inf.* 49. 5.*Reaum. Inf.* 6. tab. 35. fig. 1.*Roef. Inf.* 2. *aqu.* tab. 6. fig. 4.

— — tab. 7. fig. 3.

Edw. Av. tab. 333.

Habitat ad Europae aquas.

3. L. alis hyalinis: macula baseos fasciisque duabus fuscis. *bifasciata.*

Habitat in America. *Muf. Dom. Banks.*

Statura et magnitudo praecedentis. Thorax villosus, fuscus, lineolis duabus flavis sub alis. Abdomen depressum, fuscum, lateribus flavescens. Alae hyalinae, basi macula oblonga, nigra, in qua lineola albicans: fascia in medio abbreviata, et alia apicis, fuscis.

4. L. alis basi luteis. *Linn. Syst. Nat. II. 901. 2. Fn. flaveola. Sv. 1460.*

Libellula alis albis, basi luteis, abdomine lutescente.

Geoff. Inf. 2. 225. 7.

Schaeff. Inf. tab. 4. fig. 1.

Habitat in Europa.

Variat rarius alis absque macula lutea.

5. L. flavescens, alis macula apiceque fuscis: stigmate niveo. *stigmatisans.*

Habitat in nova Hollandia. *Muf. Bankianum.*

Statura omnino praecedentis. Corpus totum flavescens, abdomine nigro, lineato. Alae aquae, macula fusca in medio marginis exterioris. Pone maculam stigma marginis crassioris niveum. Apex alae fuscus. Pedes flavescens, apice nigri.

6. L. flavescens, alis anticis apice, posticis margine aqueis: stigmate niveo. *oculata.*

Habitat in nova Hollandia. *Muf. Bankianum.*

Praecedenti nimis affinis, cujus forte mera varietas. Alae anticae flavescens usque ad stigma marginis crassioris niveum, tunc aquae: posticae flavescens, margine postico aequo.

7. L. alis albis, fronte elevata, vesiculosa, thoraceque flavis, immaculatis. *vesiculosa.*

Habitat in America.

Major. Frons elevata, vesiculosa, subpellucida. Oculi testacei. Thorax flavus, immaculatus. Abdomen cylindricum, segmentis basi obscure pallidis, apice nigris. Cauda foliolis cylindricis.

- rubicunda.* 8. L. alis tantum posticis basi nigricantibus, corpore testaceo. *Linn. Syst. Nat.* 11. 902. 4. *Fn. Sv.* 1462.
Roef. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 7. fig. 4.
Raj. Inf. 50. 8.
 Habitat in Europa.
- vulgarissima.* 9. L. thorace flavo, striis octo nigris. *Linn. Syst. Nat.* 11. 502. 6. *Fn. Sv.* 1464.
 Libellula lateribus flavis, alis albis. *Geoff. Inf.* 2. 227. 11.
Roef. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 5. fig. 3.
 Habitat in Europa.
- obscura.* 10. L. alis totis ferrugineis, corpore obscuro.
 Habitat in America. *D. Lewin.*
 Statura et magnitudo L. flaveolae. Corpus totum ferrugineo-fuscum. Abdomen cylindricum. Alae ferrugineae, puncto marginali oblongo, fusco.
- vulgata.* 11. L. alis hyalinis, immaculatis, abdomine cylindrico, rufo.
 Libellula vulgata alis hyalinis, corpore griseo, cauda simplici. *Linn. Syst. Nat.* 11. 901. 3. *Fn. Sv.* 1461.
Roef. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 8.
 Habitat in Europa.
- cancellata.* 12. L. alis basi immaculatis, abdomine, dorso lateribusque interrupte luteis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 902. 7. *Fn. Sv.* 1465.
 Habitat in Europa.
- fasciata.* 13. L. alis planis, fuscis; striga alba.
 Libellula fasciata alis planis, fuscis: fascia lineari alba.
Linn. Syst. Nat. 11. 903. 12.
Edw. Av. 174. tab. 174.
 Habitat in India.
- umbrata.* 14. L. alis planis, albis: fascia atra. *Linn. Syst. Nat.* 11. 903. 13.
 Habitat in America meridionali.
- dimidiata.* 15. L. alis planis, a basi ad medium nigris. *Linn. Syst. Nat.* 11. 903. 14.
Seb. Mus. 4. tab. 78. fig. 7. 8.
 — — — tab. 86. fig. 19.
 Habitat in America.

16. L. alis anticis testaceo-obsoletis; posticis viridibus, *chinensis*.
apice fuscis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 904. 15.

Edw. Av. 112. tab. 112.

Habitat in China.

17. L. alis planis, albis: maculis tribus atris tribus-*versicolor*.
que cinereis.

Habitat in America. *Mus. D. Hunter.*

Magna. Caput fuscum, flavo maculatum. Thorax fuscus, lineis utrinque duabus sub alis flavis. Abdomen fuscum. Alae albae, macula magna oblonga baseos atra et alia cinerea ad marginem tenuiorem. Maculae duae reliquae atrae et cinereae alternae, macula atra alam terminante.

18. L. alis purpurascentibus: fascia alba, anticis apice *americana*.
albis; posticis linea baseos alba. *Linn. Syst. Nat.* 11. 904. 16. *na.*

Habitat in India.

Corpus viride.

19. L. alis albis, corpore ferrugineo, ore puncto utrin-*ferrugi-*
que flavo. *nea.*

Habitat in America.

Statura L. umbratae. Corpus totum ferrugineum, puncto flavo utrinque ad os.

20. L. alis albis, corpore tomentoso, fusco viridique *tomentosa*.
variegato.

Habitat in America.

Parva. Frons cyanea. Thorax tomentosus, fuscus, viridi maculatus. Abdomen nigrum, cylindricum, segmentis apice utrinque puncto virescente.

21. L. alis hyalinis, thorace viridi - aeneo. *Linn. Syst. aenea*.
Nat. 11. 902. 8. *Fn. Sv.* 1466.

Libellula viridi-inaurata, alis pallidis, pedibus nigris.

Geoff. Inf. 2. 226. 10.

Raj. Inf. 49. 5.

Roef. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 5. fig. 2.

Habitat in Europa.

cyanea. 22. L. alis albis: stigmatе niveo, nigro terminato, corpore cyaneo.

Habitat in America. *Lewin.*

Corpus totum cyaneum, abdomine cylindrico. Alae omnes albae, macula parva nigra ad basin et majori marginali nivea versus apicem, quae puncto fusco terminatur.

carolina. 23. L. alis albis: posticis basi dentata, ferrugineis, corpore fusco.

Libellula carolina alis patentibus, hyalinis: posticis basi tota late ferruginea. *Linn. Syst. Nat.* II. 504. 17? *Am. acad.* 6. 411. 85?

Libellula carolina. *Drury Inf.* I. tab. 48. fig. 1.

Habitat in America.

capensis. 24. L. alis patentibus, albidis, fusco undique maculatis punctatisque. *Linn. Syst. Nat.* II. 904. 19.

Seb. Musf. 4. tab. 86. fig. 17.

Habitat ad Cap. B. Spei.

131. AESHNA. *Labium* trifidum: laciniis aequalibus; lateralibus apice fissis.

forcipata. 1. A. thorace nigro, characteribus variis flavescentibus, cauda unguiculata.

Libellula forcipata. *Linn. Syst. Nat.* II. 903. II. *Fn. Sv.* 1469.

Libellula thorace luteo, virescente, lineis nigris, abdomine nigricante, characteribus flavis. *Geoff. Inf.* 2. 228. 13.

Petiv. Musf. 84. n. 819.

Reaum. Inf. 4. tab. 10. fig. 4.

— — 6. tab. 35. fig. 5.

Habitat in Europa.

grandis. 2. A. thorace lineis quatuor flavis, corpore variegato.

Libellula grandis alis glaucescentibus, thoracis lineis quatuor flavis. *Linn. Syst. Nat.* II. 903. 9. *Fn. Sv.* 1467.

Libel-

Libellula fulva, alis flavescentibus, thoracis lateribus lineis duabus flavis, fronte flavescente, cauda, diphylla. *Geoff. Inf.* 2. 227. 12.

Libella maxima, vulgatissima, alis argenteis. *Raj. Inf.* 48. 1.

Aët. Nidr. 3. p. 412. tab. 6. fig. 9.

Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 3.

Roef. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 4. fig. 14.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 4.

Habitat in Europa.

Colores corporis pulcre variegati vita pereunt.

3. A. thorace lineis utrinque duabus flavis, alis basi *variegata*.
macula alba.

Habitat in Terra del Fuego. *Mus. Bankianum*.

Statura A. grandis. Caput fuscum, ore flavescente, puncto baseos nigro. Thorax flavescent, lateribus sub alis fuscis, lineis duabus flavis. Abdomen cylindricum, ferrugineum, segmentorum marginibus nigris. Macula alba, linea nigra divisa, utrinque in singulo segmento. Alae albae, macula parva alba ad marginem tenuiorem baseos. Macula ordinaria, fusca versus apicem.

4. A. abdomine clavato: basi gibbo, corpore fusco viridique variegato. *clavata*.

Habitat in China. *Drury*.

Caput vesiculosum, viride. Thorax viridis, nigro-lineatus. Abdomen elongatum basi, inprimis subtus gibbum, viride, strigis nigris, medio attenuatum, nigrum, maculis lateralibus flavis, apice incrassatum, atrum, ano albo. Alae albae, puncto marginali fusco. Pedes nigri.

132. AGRION. *Labium quadrifidum*.

1. A. alis erectis, coloratis.

virgo.

Libellula Virgo. *Linn. Syst. N.* 11. 904. 20. *Fn. Sv.* 1470.

4. Libellula corpore viridi-coeruleo, nitido, alis medio coeruleiscentibus: basi et apice albis, margine im-maculato. *Geoff. Inf.* 2. 221. 1.

Roef. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 9. fig. 7.

Raj. Inf. 50. n. 11.

Schaeff. Elem. tab. 78. fig. 1.

β. Libellula corpore sericeo, nitido, alis viridi-coerulescentibus, apice fuscis, margine immaculatis. *Linn. Fn. Sv.* 1. 757.

Raj. Inf. 50. n. 10.

Reaum. Inf. 6. tab. 35. fig. 7.

Leuwenb. arc. 19. tab. 19.

γ. Libellula viridi-sericea, alis subfuscis, puncto marginali albo. *Geoff. Inf.* 2. 122. 2. *Fn. Sv.* 1. 758.

Roes. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 9. fig. 6.

Raj. Inf. 51. n. 12.

δ. Libellula corpore sericeo, nitido, alis inaurato-fuscis: macula nigra. *Linn. Fn. Sv.* 1. 759.

Mouff. Inf. 68. fig. 1. 3.

Roes. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 9. fig. 5.

Raj. Inf. 50. n. 9.

Habitat in Europae fluviis frequens.

puella. 2. A. alis erectis, hyalinis.

Libellula Puella. *Linn. Syst. Nat.* 11. 905. 21. *Fn. Sv.* 1471.

α. Libellula corpore coeruleo cinereoque alterno, alis puncto marginali nigro. *Geoff. Inf.* 2. 222. 3.

Raj. Inf. 51. n. 15.

Reaum. Inf. 6. tab. 40.

Roes. Inf. 2. *aquat.* 2. tab. 10. fig. 3. 4.

Sultz. Inf. tab. 17. fig. 102.

β. Libellula corpore infra coeruleo-viridi, supra fusco, thorace fasciis fuscis coerulescentibusque alternis, puncto alarum marginali nigro. *Geoff. Inf.* 2. 223. 4.

Roes. Inf. 2. *aqu.* 2. tab. 11. fig. 7.

γ. Libellula corpore viridi, pallide incarnato, thorace fasciis tribus longitudinalibus nigris, alis puncto marginali fusco. *Geoff. Inf.* 2. 224. 5.

Habitat in pratis Europae paludosis, victitans rapina muscarum.

Varietates harum specierum fere innumerac, at copula junguntur, ideoque haud distinctae.

133. IVLVS. *Labium* crenatum, emarginatum.*Antennae* clavato - moniliformes.

1. I. pedibus utrinque 20. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1064. 1. *ovatus.*
Am. acad. 4. 253. 36. tab. 3. fig. 4.
Oniscus. Gronov. Zooph. 995. tab. 17. fig. 4. 5.
 Habitat in Oceano europaeo.
2. I. pedibus utrinque 80. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1065. 2. *crassus.*
Amoen. acad. 4. 253. 35.
 Habitat in Asia.
 Corpus pallescens, utrinque linea e punctis minutissimis nigris, Cauda acuta.
3. I. pedibus utrinque 100. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1065. 3. *terrestris.*
Fn. Sv. 2066. *Geoff. Inf.* 2. 679. 1.
Iulus quartus glaber. *Raj. Inf.* 46, 4.
Aldr. Inf. 636. fig. 4.
Frisch. Inf. 2. tab. 8. fig. 3.
Ionst. Inf. tab. 23.
Sulz. Inf. tab. 24. fig. 156.
 Habitat in Europa.
 Pedes 176 f. 88 paria numerat *Rajus*.
4. I. pedibus utrinque 30, corpore planiusculo. *complanatus.*
Iulus complanatus pedibus utrinque 30, corpore planiusculo, antennis clavatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1065.
 4. *Fn. Sv.* 2068.
Scolopendra fusca, pedibus utrinque triginta. *Geoff. Inf.* 2. 675. 3.
Scolopendra julacea. Scop. carn. 1150.
Iulus scolopendricus. Pod. Inf. 127.
 Habitat in Europa, Anglia.
5. I. pedibus utrinque 36, ano tridentato. *tridentatus.*
 Habitat in America. *Drury.*
 I. fabuloso multo crassior. Segmenta corporis 18 grisea, puncto dorsali ferrugineo. Anus tridentatus, dente intermedio majori, acutiori. Pedes basi denticulis duobus.

- fabulosus*. 6. I. pedibus utrinque 120. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1065. 5.
Fn. Sv. 2067. *Geoff. Inf.* 2. 679. 2.
 Iulo glabro affinis, lividis albisque circulis. *Raj.*
Inf. 47.
Schaeff. Elem. tab. 73.
 Habitat in Europae corylo.
 I. terrestri duplo major.
- stigma*. 7. I. pedibus utrinque 30, corpore atro: segmentis alternis utrinque puncto calloso, albo.
 Habitat Tranquebariae. *Koenig*.
 Duplo major I. complanato. Corpus antennis pedibusque atrum. Segmenta alterna utrinque stigmatibus calloso, elevato, albo. Cauda acuta, alba.
- carnifex*. 8. I. pedibus utrinque 94, capite, cauda, linea dorsali pedibusque sanguineis.
 Habitat Tranquebariae. *Koenig*.
 Statura I. fabulosi, at paulo major. Cauda acuminata.
- Indus*. 9. I. pedibus utrinque 115. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1065. 6.
Mus. Ad. Fr. 1. 90. *Mus. Lud. Ulr.* 462.
Gronov. Zooph. 1008.
Seb. Mus. 1. tab. 81. fig. 5.
Petiv. Gazoph. tab. 74. fig. 3.
 Habitat in Indiis.
 Corpus ferrugineum, pedibus luteis.
- fuscus*. 10. I. pedibus utrinque 124. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1065. 7.
Amoen. acad. 4. 253. 34.
Seb. Mus. 2. tab. 24. fig. 4. 5.
 Habitat in Indiis.
- maximus*. 11. I. pedibus utrinque 134. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1066. 8.
 Vermis terrestri. *Marg. bras.* 255.
List. It. 1699. tab. 5.
 Habitat in America.
 Praecedenti affinis.

134. SCOLOPENDRA.

Palpi filiformes, inter maxillas connati.

Labium dentatum, fissum.

Antennae setaceae.

1. *S. pedibus utrinque 12, corpore ovali, cauda penicillo albo.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 1062. 1. *Fn. Sv.* 2063. *Geoff. Inf.* 2. 677. 6. tab. 22. fig. 4. *lagura.*
Iulus Lagurus. *Scop. carn.* 1152.
Aët. par. miss. 1. p. 532. tab. 17. fig. 4 — 10.
 Habitat in Europa sub muscis.
2. *S. pedibus utrinque 14 elongatis, thorace scutellato.* *coleoptrata.*
Scolopendra coleoptrata pedibus utrinque 14, thorace coleoptrato. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1062. 2.
 Habitat in Europa australi.
3. *S. pedibus utrinque 15.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 1062. 3. *forficata.*
Fn. Sv. 2064. *Geoff. Inf.* 2. 674. 1.
Sultz. Inf. tab. 24. fig. 155.
Schaeff. Elem. tab. 3. fig. 1.
 Habitat in Europa, America.
4. *S. pedibus utrinque 17.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 1063. 4. *gigantea.*
Scolopendra maxima pedibus 36. *Brown. lam.* 426. tab. 42. fig. 4.
 Habitat in America.
 Affinis sequenti, at multo major.
5. *S. pedibus utrinque 20, oculis octo.* *Linn. Syst. Nat.* 11. 1068. 5. *morsitans.*
Amoen. acad. 1. 325. 506.
Olear. Mus. tab. 12. fig. 5.
Petiv. Gazoph. tab. 13. fig. 3.
Bradl. nat. tab. 25. fig. 4.
Seb. Mus. 1. tab. 81. fig. 3. 4.
 — — 2. tab. 25. fig. 3. 4.
Frisch. Inf. 2. tab. 2. fig. 7.
Catesb. Carol. 3. p. 2. tab. 2.
 Habitat in Indiis.

ferruginea. 6. S. pedibus utrinque 22. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1068. 6.
Habitat in Africa.
Corpus ferrugineum, pedibus luteis.

Gabrielis. 7. S. pedibus utrinque 148. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1063. 7.
Habitat in Italia.
Statura S. electricae, at quadruplo major, tota depressa, flavescentes.

electricae. 8. S. pedibus utrinque 70, corpore lineari. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1068. 8. *En. Sv.* 2065. *Geoff. Inf.* 2. 676. 2.
Aldr. Inf. 636. fig. 8.
Frisch. Inf. 2. tab. 8. fig. 1.
Raj. Inf. 45.
Habitat in Europa, in tenebris electrica s. lucens per se.

phosphorea. 9. S. pedibus utrinque 76. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1064. 9.
Habitat in Asia, noctu instar Lampyridis ignita, ex alto coelo decidua in navem, in mari indico et aethiopico 100 milliaribus a continente. *Linn.*

Occidentalis. 10. S. pedibus utrinque 123. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1064. 10.
List. It. 1699. tab. 6.
Habitat in America.
Corpus ferrugineum. Antennae articulis 14.

marina. 11. S. pedibus - - -, corpore pallido: linea dorsali rufa. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1064. 11. *It. Wgoth.* 191.
Norweg. Roedaat. *Stroem. Sundm.* 1.
Habitat in Oceano atlantico.
Clupearum Harengarum esca, unde abdomen piscium rufescit et corpus brevi pubescit. *Stroem.* l. c.

135. TROMBIDIUM. Palpi incurvi, apice acutissimi, os tegentes.
Labium concavum, maxillas recipiens.

tinctorium. 1. T. abdomine rubro, hirsuto, postice obtuso, tibiis anterioribus pallidioribus.
Acarus tinctorius. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1025. 20.
Habitat in Guinea.
Corpus undique hirsutissimum, rubrum.

2. T. abdomine sanguineo, depresso, tomentoso, postice retuso, terrestris. *holosericeum.*
Acarus holosericeus. Linn. Syst. Nat. 11. 1025. 22. Fn. Sv. 1979.
Acarus terrestris ruber, abdomine depresso. Geoff. Inf. 2. 624. 7.
List. Aran. fig. 38.
Roes. Inf. 4. tab. 38.
Blank. Inf. tab. 14. fig. 1.
 Habitat in Europae, Americae siccis.
3. T. abdomine sanguineo, depresso, tomentoso, postice obtuso, aquaticus. *aquaticum.*
Acarus aquaticus. Linn. Syst. N. 11. 1025. 21. Fn. Sv. 1978.
Acarus aquaticus ruber, abdomine depresso. Geoff. Inf. 2. 625. 8.
Frisch. Inf. 8. tab. 3.
Roes. Inf. 3. tab. 25.
Sultz. Inf. tab. 22. fig. 147.
 Habitat in Europae aquis dulcibus, velociter natans, ova rubra in nepis ponens.

136. ARANEA. *Palpi incurvi, maris clavati.*
Labium breve, apice rotundatum.

* *Oculis* ::::

1. A. abdomine longo, argenteo, virescente, pedibus longitudinaliter extensis. *extensa.*
Linn. Syst. Nat. 11. 1033. 22. Fn. Sv. 2011.
Geoff. Inf. 2. 642. 3.
Raj. Inf. 19. 3.
List. aran. fig. 3.
 Habitat in uliginosis, sylvaticis.
 Caput, thorax et pedes rufescentia. Pedes semper extensi, anteriores longissimi, tertii paris breves.
2. A. abdomine globofo, gibbo, ambitu sexdentato. *cancriformis.*
Aranca cancriformis abdomine semiorbiculato, ambitu sexdentato. Linn. Syst. Nat. 11. 1037. 45.
Aranus cancriformis campestris, reticulum spirale nectens. Sloan. Iam. 2. 197. tab. 235. fig. 4.
 Aranea

Aranea nigra cancriformis. *Brown. Iam.* 419. tab. 44. fig. 5. *Slabber. obs. microsc.* tab. 1.

Habitat in America.

Media, nigra, abdomine magno ferrugineo, punctis nigris impresso.

latens. 3. *A. atra*, abdomine cinerascens: linea dorsali atra, interrupta.

Habitat in Anglia, latitans sub parvo reticulo in foliorum pagina superiori.

Parva. Caput et thorax atra, pubescentia. Abdomen basi gibbum, ovatum, tomento cinereo vestitum, linea dorsali atra, postice latiori, interrupta. Pedes atri.

maetans. 4. *A. abdomine ovato*, atro: linea dorsali coccinea.

Habitat in America. *Lewin.*

Parva. Thorax et pedes obscure fusci. Abdomen ovatum, atrum, linea dorsali coccinea.

Aliam vidimus simillimam, at paulo majorem, abdomine punctis duorum parium anoque coccineis.

Nigrita. 5. *A. atra*, abdomine subtus punctis duobus testaceis.

Habitat Dresdae.

Media. Corpus atrum, nitidum, glabrum. Puncta duo testacea, subtus ad basin abdominis. Pedes apice pallidi.

* * *Oculis*

globosa. 6. *A. nigra*, abdominis lateribus sanguineis.

Habitat in pratis Lipsiensibus.

Corpus parvum, nigrum. Abdomen globosum, lateribus sanguineis, dorso nigro, in medio fascia interrupta, alba.

*** *Oculis*

borrida. 7. *A. abdomine subtriangulari*, apice truncato, retuso, pedibus quatuor anticis longioribus.

Habitat in Lipsiae hortis.

Major: singularis structurae: Latera frontis parum elevata. Corpus fuscum. Thoracis dorsum argentum cingitur linea alba. Abdomen triangulare, basi angustum, apice multo latius, truncatum et valde retusum.

retusum. Anus sub abdomine elevatus, albus. Latera abdominis rugosa. Pedes quatuor anteriores duplo longiores, fusci, tibiis albo annulatis, postici virescentes.

8. A. abdomine ovato, fusco: maculis nigris quinque subcontiguis, anterioribus majoribus. *domestica.*
Linn. Syst. Nat. 11. 1031. 9. *Fn. Sv.* 2000.

Aranea Derhamii. *Scop. carn.* 1104.

Raj. Inf. 27. 17.

List. aran. 59. fig. 17.

Clerk. aran. 76. tab. 2. fig. 9.

Habitat in Europae fenestris et domibus.

9. A. virescens, abdomine albo: ano rufescente.

Habitat Lipsiae.

Caput, thorax et pedes virescentes. Oculi inprimis laterales elevati. Abdomen ovatum, album, ano rugoso, rufescente. Linea longitudinalis abbreviata et duae obliquae laterales rufae, quae in medio abdominis fere coeunt.

*tricuspi-
data.*

**** *Oculis*

10. A. abdomine albo, postice fusco: ambitu sex-dentato. *argentata.*

Habitat in Indiis.

Magna. Thorax argentatus, subpubescens. Abdomen subovatum, antice album, postice fuscum, punctis duobus albis. Margo utrinque dentibus tribus validis armatus. Pedes pallidi, fusco annulati.

***** *Oculis*

11. A. argentea, abdomine fasciis flavescens, pedibus fusco annulatis. *fasciata.*

Habitat in insula Madera. *Mus. Bankianum.*

Magna. Caput et thorax argentea, immaculata. Abdomen argenteum, fasciis quinque flavescens, fusco terminatis. Pedes octo testacei, annulis plurimis fuscis.

- angulata.* 12. A. abdomine ovato, antice lateribus angulato, acuto, thoracis centro excavato. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1031. 8. *Fn. Sv.* 1999.
Clerk. aran. Suec. tab. 1. fig. 1.
 Habitat in arboribus, rete perpendiculari.
 Variat colore.
- diadema.* 13. A. abdomine subglobofo, rubro-fusco: cruce albo-punctata. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1030. 1. *Fn. Sv.* 1993.
Aranea Linnaei. Scop. carn. 1077.
Mouff. Inf. 233. fig. 1.
Aldr. Inf. 608. fig. 9.
Ionst. Inf. tab. 18. fig. 17. 19. 20.
Raj. Inf. 18. 2.
List. aran. fig. 2.
Frisch. Inf. 7. tab. 4.
Clerk. aran. tab. 21. fig. 2.
Schaeff. Elem. tab. 21. fig. 2.
 — — *Icon.* tab. 19. fig. 9.
 Habitat in Europae arboribus.
- marmorea.* 14. A. fusca, abdomine ovato, fusco alboque variegato.
Clerk. aran. tab. 1. fig. 2.
 Habitat in Europa, nidum in fruticibus et graminibus struens, attractis insectorum cadaveribus.
 Praecedenti valde affinis. Corpus magnum, fuscum. Abdomen glabrum, variegatum. Pedes fusci, geniculis nigris.
- 4 punctata.* 15. A. abdominis dorso plano, nigro: punctis excavatis quatuor.
Aranea 4 punctata abdomine oblongo, nigro: punctis excavatis quatuor. Linn. Syst. Nat. 11. 1034. 28.
Fn. Sv. 2014. *It. oel.* 34.
 Habitat in Europae domibus.
- militaris.* 16. A. spinis dorsalibus quatuor, posticis longioribus patentibus.
 Habitat in America. *v. Robr.*
 Statura omnino A. spinosae. Spinac duae anticae abdominis erectae, nigrae. Anus sub abdomine conicus.

17. A. spinis dorsalibus octonis: posticis duabus patentibus, abdomine subtus conico. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1037. 47. *spinosa.*
Habitat in America.
Media, obscure fusca.
18. A. spinis dorsalibus sex, posticis patentibus. *atuleata.*
Habitat in America. *Mus. Bankianum.*
Caput et thorax brunnea s. obscure ferruginea, immaculata, laevia. Abdomen antice fuscum, spinis duabus dorsalibus elongatis, erectis; postice impressum, flavescens, spinis quatuor anterioribus lateralibus brevissimis, posticis porrectis, divergentibus, conicis, brunneis, apice atris. Abdomen subtus fuscum, rugosum, ano conico, prominulo, truncato, annulato. Pedes ferruginei.
19. A. abdomine globoso, ambitu quadridentato. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1037. 45. *tetracantha.*
Habitat in Americae insulis.
Caput et thorax ferruginea. Abdomen basi punctis nigris impressum.
20. A. abdomine utrinque fornicato, bispinoso: posterioribus longioribus. *fornicata.*
Habitat in nova Hollandia. *Mus. Bankianum.*
Media. Caput et thorax nigra, immaculata. Pectus flavescens. Abdomen lateribus valde dilatatis, fornicatis, spinis duabus ferrugineis, anteriore ad basin acuta, brevi, posteriore validissima, porrecta, acuta. Margo posticus itidem spinis duabus aequalibus, subulatis, ferrugineis. Color abdominis testaceus, basi apiceque obscurioribus maculis annularibus elevatis, fuscis. Pedes fusci.
21. A. abdomine ovato, fusco: linea exalbida, pinnata. *labyrinthica.*
Linn. Syst. Nat. 11. 1031. 12. *Fn. Sv.* 2003.
Clerk. aran. 79. tab. 2. fig. 8.
Raj. Inf. 27. 18.
List. aran. 60. fig. 18.
Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 8.
Habitat in terra, tela horizontali cum puteo cylindrico. *Linn.*

- aquatica.* 22. *A. fusca*, abdomine ovato, cinereo: dorso fusco, punctis duobus impressis.
Aranea aquatica livida, abdomine ovato: linea transversa punctisque duobus excavatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 1036. 39. *Fn. Sv.* 2020.
Aranea aquatica, tota fusca. *Geoff. Inf.* 2. 644. 7?
Clerk. aran. 143. tab. 6. fig. 8.
 Habitat in Europae aquis dulcibus, urinatoria. Hybernatur in cochleis, quas rete artificioso claudit.
 Major. Maxillae prominentes, validae, atrae, unguibus sanguineis.
- triguttata.* 23. *A. flavescens*, abdomine nigro: maculis tribus albis. Capta tempore autumnali in foliis Viburni Alsatiae. *Prof. Hermann.*
 Parva. Caput et thorax flavescencia, immaculata. Abdomen ovatum, postice acutiusculum, subholosericeum, nigrum, in medio punctis tribus albis, quae fere fasciam constituunt. Pedes flavi, tertii paris brevissimi.
- scorpiformis.* 24. *A. nigra*, abdomine albicante: lineis duabus nigris, pedibus quatuor anticis longissimis.
 Habitat in Lipsiae hortis, laterigrada.
 Parva, nigra. Frons parum rufescit. Abdomen ovatum, glabrum, albicans lineolis duabus, sinuatis, abbreviatis, nigris. Pedes quatuor antiqui reliquis duplo longiores, nigri, albo annulati. Postici brevissimi, virides.
- sex punctata.* 25. *A. abdomine oblongo: punctorum excavatorum paribus tribus.* *Linn. Syst. Nat.* II. 1033. 24. *Fn. Sv.* 2013.
 Habitat in Europae sylvis.
- carnifex.* 26. *A. ferruginea*, abdomine cinereo: linea dorsali fusca. Habitat in Anglia.
 Media. Caput ferrugineum, maxillis atris. Thorax ferrugineus, laevis, glaber, margine parum flavescens. Abdomen subrotundum, cinereum, linea dorsali lata, fusca. Subtus utrinque macula basæo flava. Pedes pallidi.

***** *Oculus* ∴.

27. A. abdomine oblongo, tibiis, excepto tertio pari, *clavipes*.
clavatis, villosis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1034. 24.

Aranea oblonga, luteo-variegata, pedibus longissimis, articulis inferioribus tumidis, hirsutis. *Brown.*

Iam. 419. tab. 44. fig. 4.

Habitat in America.

Abdomen flavum, albo punctatum.

28. A. abdomine ovato, ferrugineo-fusco. *Linn. Syst. saccata*.
Nat. 11. 1036. 40. *Fn. Sv.* 2021.

List. aran. 82. fig. 28.

Frisch. Inf. 8. tab. 2.

Clerk. aran. tab. 4. fig. 5.

Habitat in Europae hortis, ovorum saccum circumferens.

Pedes lividi, annulis fuscis confertis, inaequalibus.

29. A. abdomine ovato, fusco: basi punctis duobus albis. *fumigata*.
Linn. Syst. Nat. 11. 1032. 16. *Fn. Sv.* 2006.

Clerk. aran. tab. 5. fig. 6.

Habitat in campis ante larvarum nidum incubans, quas unam post alteramprehendit et exfugit.

***** *Oculus* ∴ ∴

30. A. nigra, linea laterali alba.

fimbriata.

Aranea fimbriata abdomine oblongo, nigro: linea utrinque laterali alba. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1033. 23.
Fn. Sv. 2012.

Aranea tota cinereo-villosa, thoracis linea triplici alba. *Geoff. Inf.* 2. 650. 15.

Clerk. aran. tab. 5. fig. 9.

Habitat in Europae paludibus caespitosis.

31. A. atra, thorace linea dorsali alba.

dorsalis.

Habitat in Anglia.

Parva, atra. Thorax compressus, linea dorsali alba.

Abdomen ovatum, atrum, basi parum albicans.

Pedes lividi.

scenica. 32. A. saliens, nigra: striis tribus semicircularibus, albis.
Linn. Syst. Nat. 11. 1035. *Fn. Sv.* 2017.

Aranea saliens, nigra, abdomine utrinque lineis tribus albis, ad angulum acutum coeuntibus. *Geoff. Inf.* 2. 650. 16.

List. aran. fig. 31.

Raj. Inf. 37. 31.

Bradl. nat. tab. 24. fig. 5.

Clerk. aran. tab. 5. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 11.

Habitat in Europae parietibus.

pubescens. 33. A. abdomine ovato, fusco: maculis quatuor cinereis, posticis majoribus.

Habitat Lipsiae.

Media. Corpus pubescens, fuscum, cinereo variegatum. Abdomen ovatum, dorso fusco, maculis quatuor cinereis distinctis, posticis majoribus. Palpi pilosi. Oculi secundi paris minutissimi.

Tarantula. 34. A. abdominis dorso maculis trigonis nigris, pedibus nigro maculatis.

Aranea Tarantula subtus atra, pedibus subtus atro fasciatis. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1035. 35.

Tarantola. *Bocc. Mus.* 1. 101. tab. 2.

Albin. aran. 64. tab. 38.

Bradl. nat. tab. 24. fig. 10.

Olear. Mus. 21. tab. 12. fig. 4.

Habitat in Europa australi.

***** Oculis ::::

avicularia. 35. A. thorace orbiculato, convexo: centro transverse excavato. *Linn. Syst. Nat.* 11. 1034. 31. *Mus. Lud. Ulr.* 428.

Linn. Amoen. acad. 1. 323.

Laet. amer. tab. 570

Worm Mus. tab. 244.

Seb. Mus. 1. tab. 69. fig. 2. 3.

Olear. Mus. tab. 17. fig. 3.

Merian. fur. tab. 18.

Roef. Inf. 3. tab. 11.

Habitat in America, insidiatur aviculis, insectis.

*** *** *Oculus tantum senis* . : .

36. A. abdomine virescente: lateribus flavis. *senoculata*.
 Aranea senoculata oculis tantum senis. *Linn. Syst. Nat.*
 II. 1034. 30. *Fn. Sv.* 2036.
Lister. avan. 74. fig. 24.
Raj. Inf. 32. 24.

Habitat in Germaniae hortis.

Caput, thorax et pedes pallide ferruginea. Pedes tertii paris breviores, reliqui aequales. Abdomen virescens, linea laterali flavicante, punctis quinque nigris. Puncta quatuor nigra, dorso impressa et infra haec maculae quatuor pallidae, obsoletae. Anus sanguineus.

37. A. pallida, abdomine argenteo: lineis ramosis, nigris. *lusca*.
 Habitat Tranquebariae. *Koenig*.
 Caput et thorax pallide testacea. Abdomen oblongum, argenteum, linea dorsali ramosa, et laterali majori trifurca, nigris. Anus prominens, conicus, niger. Pedes longiusculi, pallide testacei.

† *Oculus* - - -

38. A. atra, abdomine fascia baseos flava, pectore *cruentata*.
 sanguineo.
 Habitat ad Rio Janeiro Brasiliae. *Mus. Dom. Banks*.
 Magna, atra. Thorax immaculatus. Abdomen ovatum, supra fascia baseos flava, subtus maculis decem flavescens. Pectus sanguineum. Pedes nigri.

39. A. thorace orbiculato, glabro, atro, abdomine ova- *venatoria*.
 to, fusco, pubescente.

Aranea venatoria subhirsuta, thorace orbiculato, convexo, abdomine ovato, magnitudine thoracis.

Linn. Syst. Nat. II. 1035. 33.

Gronov. Zooph. 2. 217.

Merian. Sur. tab. 18.

Sloan. Iam. 2. 181. tab. 235. fig. 1. 2.

Brown. Iam. 420. tab. 44. fig. 2.

Habitat in America. Nidum fruit cylindricum, tenacem, longitudine pedis, superne operculo claudendum.

137. PHALANGIVM. *Palpi porrecti, incurvi.**Maxilla superior, chelifera.**grossipes.* 1. *P. corpore minuto, cylindrico, humeris tuberculatis, pedibus longissimis. Linn. Syst. Nat. 11. 1027. 1.**Phalangium marinum. Stroem. Sondm. 208. tab. 1. fig. 16.**Habitat in mari Norwegico: tardissimum, Mytilorum testas penetrat et exhaurit.**epilio.* 2. *P. abdomine ovato, subtus albo. Linn. Syst. Nat. 11. 1027. 2. Fn. Sv. 1992.**Araneus rufus, non cristatus. Raj. Inf. 40. 35.**Goed. Inf. 2. tab. 49.**Mouff. Inf. 234. fig. 4.**Hoeffn. Inf. 2. tab. 9.**Bradl. nat. tab. 24. fig. 2.**Clerk. aran. tab. 6. fig. 10. 3.**Sultz. Inf. tab. 22. fig. 140.**Habitat in Europa, America, nocte vagatur.**cornutum.* 3. *P. abdomine depresso, maxilla conica ascendente, palpis pediformibus.**Phalangium cornutum abdomine depresso, rostro bicorni, palpis pediformibus. Linn. Syst. Nat. 11. 1028. 3.**Phalangium. Geoff. Inf. 2. 629. 1. tab. 20. fig. 6.**Araneus cinereus, cristatus. Raj. Inf. 39. 35.**Schoeff. Elem. 13. fig. 9.**— — Icon. tab. 39. fig. 13.**Habitat in Europa, Anglia.**bimaculatum.* 4. *P. abdomine atro: maculis duabus albis. Habitat in Anglia. Capt. die VI. Maj.**Triplo minus praecedentibus. Corpus ovatum, atrum, maculis duabus oblongis, albis ad basin abdominis. Linea submarginalis tenuissima, alba, abdomen cingit. Pedes elongati, atri.*5. *P.*

5. P. chelis ramosis, ano setifero. *Linn. Syst. Nat.* 11. *caudatum*.
1029. 8. *Mus. Lud. Ulr.* 426.

Scorpio. *Gronov. Zooph.* 952.

Seb. Mus. 1. tab. 70. fig. 7. 8.

Habitat in India orientali.

6. P. brachiis dentatis, pedibus primis longissimis fili-
formibus, thorace reniformi. *Linn. Syst. Nat.* 11.
1029. 9. *Mus. Lud. Ulr.* 427.

Phalangium palpis longissimis, crassis. *Gronov.*
Zooph. 935.

Tarantula fusca major, pedibus anterioribus crassio-
ribus, aculeatis et unguiculatis, fere cheliformibus,
proximis longissimis et tenuissimis. *Brown. Iam.*
409. tab. 11. fig. 3.

Cancellus araneoides. *Pet. pteriog.* tab. 20. fig. 12.

Habitat in Carolina, Iamaica.

Ultimae duae species habitu ab hoc genere diffe-
runt. An proprii generis?

