

Werk

Titel: Jo. Christ. Fabricii systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, g...

Autor: Fabricius, Johann Christian

Verlag: Korte

Ort: Flensburgi

Kollektion: Zoologica

Werk Id: PPN578515547

PURL: <http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN578515547> | LOG_0014

OPAC: <http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=578515547>

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

APPENDIX.

7-8. LVCANVS viridi-aeneus, maxillis tridentatis. *virescens.*
Habitat in America. *Drury.*

Triplo major L. caraboidi. Maxillae exsertae, capite breviores, tridentatae. Caput virescens, canaliculatum. Thorax et elytra viridia, obscure nitida, laevia, glabra. Corpus subtus obscurius.

17-18. SCARABAEVS scutellatus, thorace bicorni, corpore ferrugineo. *coryphaeus.*

Habitat in Cap. B. Spei. *Lee.*

Magnitudo et statura S. vernalis. Caput planum, ferrugineum, clypeo apice bicorni; cornubus brevibus, recurvis, apice nigris; postice mucro elevatus, brevissimus, niger. Thorax ferrugineus, antice retusus, cornubus duobus approximatis brevibus, apice nigris; postice gibber obtusum. Elytra substriata, ferruginea. Pedes ferruginei.

39-40. SCARABAEVS scutellatus, thorace inermi, capitis cornu emarginato, tibiis posticis brevissimis, apice spinosis. *Hylax.*

Habitat in Africa. *Lee.*

Medius. Caput parvum, nigrum, cornu brevi, erecto, compresso, late emarginato. Thorax elevatus, rotundatus, postice canaliculatus. Elytra laevia, rufa. Corpus subtus hirtum, obscure rufum. Femora incrassata, rufa. Tibiae posticae brevissimae, apice spinosae. Ungues magni, arcuati.

110-111. SCARABAEVS exscutellatus, muticus, clypeo sexdentato, thorace elytrisque nigris: maculis elevatis atris, nitidis. *miliaris.*

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Parvus. Statura S. Koenigii. Capitis clypeus rotundatus, sexdentatus. Thorax rotundatus, obscurus, maculis majoribus elevatis, atris, nitidulis. Punctum parvum utrinque impressum. Elytra obscura, maculis parvis, elevatis, atris, nitidis.

- horridus.* 2-3. TROX ater, thorace elytrisque spinosis.
Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*
Statura T. fabulosi. Totus ater. Thorax marginatus, ciliatus spinisque plurimis erectis, brevibus. Elytra striis quinque e spinis erectis, brevibus. Margo elytrorum ciliatus.
- proboscidea.* 31-32. MELOLONTA clypeo porrecto, subreflexo, nigra, hirta, elytris testaceis: margine nigro.
Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*
Clypeus valde porrectus, integer. Caput et thorax nigra, villo cinereo hirta. Elytra testacea, margine exteriori nigro.
- crassipes.* 31-32. MELOLONTA atra, albo maculata, pedibus posticis elongatis, crassissimis.
Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*
Caput nigrum, clypeo subemarginato. Thorax rotundatus, ater, margine punctisque aliquot minutissimis, albis. Elytra atra, albo maculata. Abdomen album. Pedes attri, postici elongati, incrassati, digito incurvo intus dentato, ungue arcuato.
- rupicola.* 27-28. MELOLONTA villosa, virescens, capite nigro.
Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Bankianum.*
Parva. Caput nigrum. Thorax et elytra pubescentia, virescentia. Corpus subtus cinereum.
- Ursus.* 39-40. MELOLONTA atra, hirsutissima, pedibus quatuor anticis testaceis.
Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*
Statura praecedentium, at duplo minor. Clypeus porrectus, apice emarginatus. Corpus atrum, pilis longioribus nigris hirsutissimum. Pedes quatuor antiqui testacei, femoribus nigris.
- signata.* 14-15. CETONIA thorace nigro: margine albo, elytris testaceis: futura margineque nigris.
Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Bankianum.*
Magnitudo C. capensis. Caput atrum, clypeo subemarginato. Thorax glaber, laevis, niger, futura dorsa-

dorsali basi ferruginea margineque laterali albo. Scutellum atrum. Elytra testacea, sutura, margine exteriori, lineola bascos calloque apicis nigris. Margo posticus parum albicat. Subtus hirta, sterno brevi, obtuso.

- 16-17. CETONIA fusco-viridis, thorace elytrisque *sinuata*.
margine punctisque duobus flavis.

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Caput nigrum, antennis piceis clypeoque emarginato. Thorax obscure viridis, margine late flavo, puncto medio nigro. Puncta duo flava in medio dorsii. Scutellum triangulum utrinque puncto bascos flavo. Elytra obscure viridia, margine sinuato, flavo, puncto apicis nigro. Puncta duo dorsalia flava in singulo elytro. Subtus atra, sterno rotundato.

- 26-27. CETONIA viridi-aenea, hirta, elytris testaceis: vitta media nigra suturaque aenea. *vittata*.

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Media. Caput viridi-aeneum, cinereo-villosum, clypeo emarginato. Thorax aeneus, villosus. Scutellum breve, aeneum. Elytra glabra, laevia, testacea, vitta media margineque exteriori nigris. Sutura aenea. Subtus aenea, hirta.

- 34-35. CETONIA nigra, elytris viridibus, nitidis, *haemorrhoidalis*.
thoracis margine anoque rufis.

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. D. Hunter.*

Parva. Caput nigrum, clypeo emarginato. Thorax glaber, rufus, linea dorsali lata, nigra. Scutellum parvum, triangulare, nigrum. Elytra substriata, viridia, nitida. Anus rufus prominet. Corpus nigrum. Pedes nigri.

- 37-38. CETONIA glabra, atra, elytris macula laterali *lugubris*.
anoque albis.

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Clypeus rotundatus, integer. Caput et thorax atra, immaculata. Elytra punctata, atra, macula magna laterali alba. Anus prominet macula alba. Abdomen utrinque macula lineaque punctorum albis.

viridulus. 5-6. TRICHIVS viridis, pubescens, ano albo, bimaculato.

Habitat in India. *Musf. D. Hunter.*

Corpus totum viride, nitens pilisque cinereis pubescens. Puncta alba minutissima in elytris. Ultimam abdominis segmentum prominet maculis duabus majoribus albis. Abdomen subtus utrinque lineola transversa alba.

lineatus. 8. TRICHIVS pubescens, thorace fulvo, nigro lineato, elytris testaceis: futura fulva.

Habitat in Cap. B. Sp. *Musf. Banks.*

Statura T. Deltae. Caput nigrum. Antennae piceae, fasciculo medio pilorum nigrorum. Thorax fulvus, lineis tribus postice fere coeuntibus nigris. Scutellum triangulum nigrum, puncto medio fulvo. Elytra testacea, futura late fulva. Anus fulvus. Pedes subtestacei.

bimaculata. 50-51. CHRYSOMELA oblonga, atra, elytris testaceis: macula atra.

Habitat in America. *Drury.*

Statura et magnitudo C. fasciatae. Antennae moniliformes, extrorsum crassiores, nigrae. Caput et thorax atra, immaculata. Scutellum atrum. Elytra laevia, testacea, macula magna media atra. Abdomen atrum, ano testaceo. Pedes atri.

fasciata. 50-51. CHRYSOMELA oblonga, atra, elytris fasciis tribus flavis.

Habitat in America. *Drury.*

Magna. Antennae moniliformes, nigrae, basi pallidae. Caput atrum, margine postico pallido. Thorax laevis, ater, immaculatus. Elytra laevia, atra, fascia basalis altera in medio et tertia ante apicem latis, flavis. Abdomen atrum, ano flavo. Pedes atri, femoribus apice tibiisque flavis.

uficollis. 51-53. CHRYSOMELA oblonga, viridi-aenea, thorace pedibusque rufis.

Habitat in Anglia. *Lee.*

Statu-

Statura C. betulae. Antennae rufae, apice fuscac.
Caput viride-aeneum, ore rufo. Thorax rufus,
immaculatus. Elytra viridia, nitida, immaculata.
Corpus viride. Pedes rufi.

28-29. CRYPTOCEPHALVS ater, elytris macula *bipustula-*
apicis rufa. *tus.*

Habitat in Helvetia. *Lee.*

Nimis affinis C. 4 pustulato: totus ater. Elytra striata,
macula magna apicis rufa, margine tamen ipso te-
nuissime nigro.

-- I. ALTICA thorace ferrugineo, elytris atris: macu- 8 *guttata.*
lis quatuor flavis.

Habitat in America. *Drury.*

Conjungit Alticas Chrysomelis. Magna. Antennae fili-
formes, fuscae. Caput atrum, punctis tribus flavis.
Thorax ferrugineus, nitidus, immaculatus. Elytra
laevia, nitida, atra, maculis quatuor flavis: dua-
bus bascos minoribus. Pedes atri, femoribus postici-
cis incrassatis.

-- I. ALTICA oblonga, flava, thorace nigro punctato, *thoracica.*
elytris violaceis.

Habitat in America. *Lee.*

Magnitudo C. betulae. Caput flavum, oculis nigris.
Thorax flavus, punctis sex nigris. Elytra glabra,
laevia, violacea, margine inprimis bascos flavo.
Pedes nigri, femoribus flavis, posticis incrassatis,
obscurioribus.

-- I. ALTICA ferruginea, thorace elytrorumque ma- *biguttata.*
culis duabus albis.

Habitat in America. *Drury.*

Magnitudo A. octoguttatae. Antennae filiformes, ni-
grae. Caput ferrugineum, fronte alba. Thorax
albus, nitidus, immaculatus. Elytra ferruginea,
maculis duabus magnis albis. Pedes ferruginei,
femoribus posticis incrassatis.

marginata. -- 1. ALTICA flavescens, elytris viridibus: margine pallido.

Habitat in America. *Drury.*

Maxima in hoc genere. Antennae filiformes, nigrae. Caput et thorax flavescencia, interdum maculata, interdum immaculata. Elytra viridia, nitida, margine exteriori pallido. Corpus flavescens, tibiis fuscis. Femora postica incrassata.

testaceus. 1-2. EROTYLVUS testaceus, antennis tibiisque nigris.

Habitat in America. *Drury.*

Statura E. gigantei, at paulo minor. Corpus gibbum, totum testaceum, oculis, antennis tibiisque nigris.

longimanus. 2-3. CVRCVLIO longirostris, nigricans, elytris ferrugineis, rostro emarginato, pedibus anticis longioribus.

Habitat ad Cap. B. Sp. *Lee.*

Magnitudo fere 6 palmarum. Rostrum cylindricum, apice emarginatum. Antennae clava truncata. Thorax in altero sexu niger, in altero rufus, macula nigra, glaber, laevis. Elytra abbreviata, striata, ferruginea. Pedes antici elongati. Tibiae incurvae.

obesus. 135-136. CVRCVLIO brevirostris, ater, thorace spinoso, inaequali, elytris rubris: punctis nigris, confertis.

Habitat ad Cap. B. Sp.

Statura omnino C. globosi, at paulo major et elytra rufa, punctis nigris numerosissimis, confertis.

rubifer. 141-142. CVRCVLIO brevirostris, cinereus, thorace scabro, elytris spinis elevatis, sanguineis.

Habitat ad Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Affinitas summa sequentis, at thorax magis canaliculatus et elytrorum spinæ sanguineae, nitidae.

- 141-142. CVRCVLIO brevirostris, thorace scabro, *globifer.*
elytris spinosis, postice acuminatis.

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Magnitudo C. capensis. Rostrum apice incrassatum, laeve. Thorax rotundatus, punctis plurimis elevatis, obtusis, atris. Elytra atra, spinis plurimis elevatis, atris. Elytra postice acuminata. Pedes nigri.

- 2-3. CLERVS niger, fronte cinerascens, elytris maculis tribus albis. *sexguttatus.*

Habitat in America. *Drury.*

Statura omnino C. formicarii. Frons cinerascens. Thorax rotundatus, caput excipiens, niger, fascia postica obsoleta, cinerea. Elytra laevia, nigra, punctis tribus albis, anteriore baseos minore.

- 12-13. LAMIA thorace spinoso, nigra, elytris maculis quatuor flavis, subocellaribus, antennis longis. *Oculator.*

Habitat ad Cap. B. Spei.

Magna. Antennae laeves, corpore duplo longiores. Caput nigrum, immaculatum. Thorax rotundatus, spinosus, niger, antice posticeque strigis duabus flavis, tenuissimis, impressis. Elytra substriata, maculis quatuor flavis, annulo albo cinctis, quarum prima baseos rotundata, major, secunda ad marginem anteriorem orbiculata, tertia in medio transversalis, quarta versus apicem orbiculata.

- 1-2. STENOCORVS thorace subspinoso, cyaneus, *cyaneus.*
elytris basi flavis.

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Statura S. meridiani. Antennae breves, cyaneae, articulis clavatis. Thorax antice angustatus, postice subspinosus. Elytra antice flava, postice cyanea. Corpus cyaneum.

clavicornis. 6-7. SAPERDA thorace rotundato, viridis, elytris maculis tribus flavis.

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Statura et magnitudo S. cylindricae. Caput viride, antennis fuscis, corpore longioribus, extrorsum crassioribus. Thorax rotundatus, viridis, immaculatus. Elytra laevia, viridia, maculis tribus flavis, quarum prima totam basin occupat, reliquae duae marginales.

longipes. 6-7. SAPERDA thorace subgloboso, violacea, antennis longioribus, femoribus clavatis.

Habitat in Cap. B. Spei.

Statura S. oculatae. Antennae corpore duplo longiores, apice cinerae. Corpus violaceum, immaculatum. Pedes elongati, femoribus clavatis.

pectinata. 5-6. LAMPYRIS atra, clypei lateribus basi exteriori elytrorum abdominisque apice albis, antennis pectinatis.

Cantharis pectinata atra, clypei lateribus basique exteriori elytrorum luteis, antennis pectinatis. *Linn. Syst. Nat.* II. 649. 17?

Habitat in America.

Certe hujus generis. Antennae pectinatae, longitudine fere corporis.

flabellicornis. -- 1. ELATER fuscus, antennarum fasciculo flabelliformi. *Linn. Syst. Nat.* II. 651. 1.

Habitat in India.

Corpus maximum, totum fuscum. Fasciculus antennarum e lamellis octo magnis, nigris.

fuscus. 2-3. ELATER thorace ocellis binis atris, corpore nigro, immaculato.

Habitat in America. *Drury.*

Affinis E. oculato, at duplo fere minor. Ocelli thoracis absque iride et corpus immaculatum.

1-2. BV.

- 1-2. *BVPRESTIS* elytris acuminatis, viridi-aeneis, *bicolor*.
macula flava, pectore abdomineque flavis.

Habitat in America. *Drury*.

Magna. Antennae ferratae, nigrae. Caput viride-aeneum, oculis testaceis. Thorax viridi-aeneus, utrinque macula baseos flava. Elytra viridi-aenea, macula media flava, apice ad futuram acuminata. Pectus, gula et abdomen flava. Pedes aenei.

- 3-4. *CICINDELA* nigra, elytris macula media flava. *triflis*.

Habitat - - - *Drury*.

Magna, tota obscure nigra, elytris in medio macula flava, lunata.

- 13-14. *CICINDELA* nitida, ore, antennis pedibusque *virginica*.
testaceis. *Linn. Syst. Nat.* 11, 657. 5.

Habitat in Carolina.

- 6-7. *DYTISCVS* elytris flavis: fasciis duabus puncto- *fasciatus*.
que apicis nigris.

Habitat in Indiae aquis. *Mus. D. Hunter*.

Statura ovata *D. fulcati*. Caput flavum, immaculatum. Thorax flavus, linea dorsali nigra, quae basi apice-que extenditur. Puncta duo parva dorsalia rubra. Elytra laevia, flava, futura nigra. Fascia nigra, lata in medio, altera angustior, dentata versus apicem et punctum distinctum in apice. Corpus nigrum.

- 8-9. *DYTISCVS* ater, laevis, elytris vitta marginali *vittatus*.
flava: macula baseos atra.

Habitat in Indiae aquis. *Mus. D. Hunter*.

Medius. Caput atrum, ore flavescente. Thorax ater, margine flavo. Elytra laevia, atra, vitta marginali flava, apicem tamen haud attingens.

- 36-37. *CARABVS* rufus, elytris nigris: punctis sex *sexpustu-*
rubris. *latus*.

Habitat in India orientali. *Edler*.

Magnitudo C. crepitantis. Caput et thorax rufa. Antennae rufae. Elytra striata, nigra, punctis tribus rufis, quorum ultimum in apice lunatum. Abdomen rufum, margine nigro. Pedes rufi.

nitidula. 1-2. *LYTTA* viridi-aenea, elytris testaceis.

Habitat in Anglia.

Minor L. vesicatoria. Antennae moniliformes, nigrae. Caput, thorax et elytra viridi-aenea, nitida. Elytra testacea, immaculata.

immaculata. 2-3. *MYLABRIS* atra, elytris testaceis, immaculatis.

Habitat in India.

Statura M. Cichorii: tota atra, elytris solis testaceis, immaculatis.

monstrosa. 1-2. *ACHETA* elytris alisque caudato-convolutis.

Gryllus monstrosus. *Drury. Inf.* 2. tab. 42. fig. 1.

Habitat in India.

gramini-folia. 5-6. *LOCVSTA* thorace tetragono, elytris filiformibus, fuscis, ala brevioribus, capite acuminato.

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Parva. Antennae corpore breviores, setaceae. Caput et thorax fusca, inter antennis acuminata. Elytra et alae filiformia, fusca, immaculata. Abdomen virescens, ense recto, viridi, apice fusco.

spinulosa. 26. *LOCVSTA* thorace spinis muricato cinctoque, corpore aptero.

Gryllus spinulosus. *Linn. Syst. Nat.* 11.703. 59. *Amoen. acad.* 6. 398. 35.

Edw. Av. 2. 161. tab. 285. fig. 3. 4. 5.

Habitat in Indiis.

Antennae longitudine corporis. Abdomen nigrum, maculis testaceis. Ensis recurvus.

- 6-7. GRILLVS viridis, elytris maculis duabus albis, abdomine vesiculoso: utrinque maculis tribus albis. *inanis.*

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Magnus. Antennae breves, virides. Caput scabrum, viride, utrinque sub antennis denticulis duobus brevissimis. Thorax viridis, margine tenuissime albo: antice denticuli duo breves nigri, altero in ipso margine, altero ante medium; in medio ruga maxima; postice porrectus, inflatus, carinatus. Elytra viridia, maculis duabus albis. Abdomen maximum, inflatum, inane, viride, utrinque maculis tribus albis.

- 6-7. GRILLVS viridis, albo maculatus, scutello carinato, utrinque dentato, abdomine vesiculoso, variegato. *papillofus.*

Habitat in Cap. B. Sp. *Mus. Banks.*

Praecedenti triplo minor. Caput viride, orbita oculorum alba. Stigmata tria rubra inter oculos et supra haec denticuli duo brevissimi. Antennae breves, virides. Thorax scaber, viridis, albo maculatus; antice dente brevi, elevato, obtuso; in medio ruga magna impressa; postice productus, carinatus. Elytra cinerea, viridi-reticulata. Abdomen vesiculosum, inflatum, virescens, maculis albis variegatum.

- 6-7. GRILLVS viridis, calloso punctatus, abdomine *variolosus.* vesiculoso, albo-variegato.

Gryllus variolosus calloso punctatus, thoracis carina subtridentata, antennis brevibus, fronte verrucosa. *Lin. Syst. Nat. 11. 693. 4. Mus. Lud. Ulr. 120.*

Habitat in Cap. B. Spei.

Antennae breves, rufescentes. Elytra reticulata, punctis albis.

Pedator. 44-45. ICHNEVMON luteus, abdominis segmentis utrinque puncto atro, antennis aculeoque nigris.

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Magnitudo I. compunctoris. Caput flavum, antennis verticeque nigris. Thorax flavus, punctis tribus anticis duobusque sub scutello nigris. Abdomen flavum, segmentis utrinque puncto nigro, sexto et ultimo immaculatis. Alae hyalinae. Aculeus ater. Pedes flavi, geniculis posticis puncto nigro.

villosa. 40-41. APIS atra, thorace abdomineque cinereo-hirtis, ventre lana atra.

Habitat in India orientali. *D. Edler.*

Statura A. centuncularis. Caput atrum, antennis cylindricis, brevibus. Thorax niger, basi lana cinerea tectus. Abdomen atrum, nitidum, primo segmento cinereo-hirto. Alae fuscae.

smaragdina. 1-2. FORMICA viridis, thorace flavo sublineato.

Habitat in India. *Edler.*

Magna, viridis. Antennae apice subrufescentes. Thorax crassus, elevatus, viridis, flavo sublineatus. Squama petiolaris, brevis, emarginata. Abdomen rotundatum, glabrum, viride. Alae magnae, albae, nervis ferrugineis.

Gnoma. 152-53. PAPILIO D. C. alis integris, rotundatis, albis: anticis puncto atro; subtus omnibus puncto argenteo.

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Statura et magnitudo P. Monuste. Alae anticae albae, puncto medio atro maculisque marginalibus fuscis: subtus glaucae, puncto medio argenteo annulo ferrugineo cincto. Posticae supra albae, immaculatae, subtus glaucae, puncto medio argenteo, annulo ferrugineo.

- 178-79. PAPILIO D. F. alis integris, subfuscis: sub- *Gripus.*
tus striga punctorum alborum.

Habitat in India. *Mus. Dr. Hunter.*

Statura P. Cassiae. Corpus nigrum, palpis ferrugineis, apice nigris. Alae anticae ferrugineo-fuscae, fascia apicis flava: subtus fuscae, apice flavae strigae e punctis septem albis. Posticae supra obscurae fuscae, immacolatae, subtus fuscae, striga e punctis 7 majoribus albis.

- 202-3. PAPILIO D. F. alis integerrimis, fuscis: anticis utrinque ocello; pupilla gemina, posticis supra ocellis quatuor, subtus sex. *Baldus.*

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Parvus. Alae omnes fuscae, anticis ocello magno, atro, iride ferruginea pupillaeque duplici argentea. Subtus fusco cinereoque undatae, ocello vivaciore. Posticae supra fuscae, ocellis quatuor atris, iride ferruginea pupillaeque simplici argentea; lateralibus minutissimis; subtus fusco cinereoque undatae, ocellis sex per paria approximatis.

- 321-22. PAPILIO P. R. alis tricaudatis, coerulescentibus, apice nigris: subtus aureis; atomis nigris. *Actaeon.*

Habitat - - - *Drury.*

Magnitudo P. Cupidinis. Alae anticae supra cyaneae, apice maculaque media nigris. Posticae cyaneae, margine nigro. Caudae tres, interiore brevissima, nigrae margine aureo: subtus viridi-aureae, atomis nigris.

- 327-28. PAPILIO P. R. alis caudatis, fulvis, nigro maculatis: subtus cinereis, punctis aureis. *Harpax.*

Habitat in America.

Medius. Antennae clavatae, nigrae, punctis lateralibus fasciaque ante clavam latiore albis. Clava apice ferruginea. Alae supra fulvae, maculis sparsis

sparsis nigris, subtus obscure cinereae, maculis plurimis gibbis aureis. Cauda ferruginea, apice alba.

afilifor- 2-3. SPHINX alis eroso-dentatis: anticis cinereis:
mis. fascia obscuriore; puncto nigro, posticis rubris:
margine nigro.

Habitat in India. *Edler.*

Magnitudo Afili. Antennae cinereae, apice albae. Corpus cinereum, thorace antice virescente. Alae anticae eroso-dentatae, cinereae, fascia media lata, obscuriore puncto nigro. Posticae rubrae, margine nigro. Subtus omnes virescentes, fascia alba.

8 *macu-* 3-4. SESIA alis atris: maculis duabus anticarum flavis,
lata. posticarum albis.

Habitat in India. *Mus. D. Hunter.*

Parva. Antennae nigrae. Caput nigrum, orbita oculorum albida. Thorax niger, punctis duobus anticis habenisque albidis. Abdomen barbatum, nigrum, maculis duabus dorsalibus anteanum albidis. Pedes nigri, tibiis quatuor anticis ferrugineis. Alae anticae atrae, maculis duabus magnis flavis; posticae atrae, maculis duabus magnis albis.

Androma- 10-11. ZYGAEANA atra, alis hyalinis: margine fascia-
cha. que nigris, ano sanguineo.

Habitat in America. *Drury.*

Magnitudo Z. Cassandrae. Antennae nigrae, subpectinatae, medio crassiores. Caput atrum, palpis apice subtus albis. Thorax hirtus, ater, antice punctis duobus albis. Abdomen hirtum, atrum, ano sanguineo. Alae omnes hyalinae, margine omni et in anticis fascia media atris.

In altero sexu fascia ad basin abdominis sanguinea.

- 16-17. ZYGAENA alis oblongis, atris: posticis sub-*flabellicornis*.
caudatis, basi virescentibus.

Habitat in America meridionali. *Dr. Hunter.*

Magna. Antennae pectinatae, cyaneae. Caput sanguineum, ore margineque postico fuscis. Abdomen rufum, lineis quatuor macularum nigrarum. Alae oblongae, nigrae, anticae immaculae, posticae subcaudatae, basi virescentes.

- 55-56. BOMBYX alis deflexis, exustis: plaga albida, *dictaea*.
inferioribus albis.

Phalaena dictaea. *Linn. Syst. Nat.* 11. 826. 60.

Habitat in Europae populo nigra, betula alba.

- 55-56. BOMBYX alis deflexis: anticis nebulosis, dorso *dromedaria*.
dentatis: litura baseos anique flavescens.

Phalaena dromedarius. *Linn. Syst. Nat.* 11. 827. 62.

Ammiral. Inf. tab. 14.

Habitat in alno, betula, corylo.

- 9-10. PHALAENA pectinicornis, alis angulato-caudatis, albis: strigis undatis, fuscis, supra duabus, *strigaria*.
subtus unica.

Habitat in India orientali. *Dom. Edler.*

Magnitudo et statura P. sambucariae. Antennae pectinatae, breves. Alae supra omnes albae, strigis duabus undatis, obsoletis, fuscis; posteriore latiore. Cauda brevis, obtusa, maculis duabus atris. Subtus omnes albae, striga suturatiore nigra.

- 7-8. TETTIGONIA atra, thorace, elytris alisque *maculata*.
flavo maculatis.

Cicada maculata. *Drury. Inf.* 2. tab. 37. fig. 1.

Habitat in China.

hyalina. 24-25. *CICADA* fusca: elytris fascia abbreviata marginique postico hyalinis.

Habitat in India orientali. *Edler.*


Parva. Corpus totum ferrugineo-fuscum. Elytra lata, ferrugineo-fusca, in medio fascia lata abbreviata, hyalina. Pone fasciam puncta duo parva hyalina et margo posticus in medio interruptus, hyalinus. Alae fuscae, immaculatae.

sexguttatus. 7-8. *REDUVIUS* thorace subspinoso, niger, elytris maculis tribus albis.

Habitat in India orientali. *Edler.*

Magnitudo *R. annulati*. Caput nigrum. Thorax subspinosus, niger, postice maculis quatuor ferrugineis; lateralibus minoribus. Elytra nigra, maculis tribus albis. Abdomen nigrum, lateribus testaceo maculatis. Pedes nigri, annulis testaceis.





~~Leipzig~~

